

리치플러스정

[원료약품 및 분량] 1정중

- 유효성분
수산화마그네슘(KP)-----450mg
우르소데옥시콜산(KP)-----5mg
노회엑스(EP)(히드록시안트라센유도체(으)로서 10밀리그램)-----50mg
피리독신염산염(KP)-----5mg
판토텐산칼슘(KP)-----5mg
벤포티아민(KP)-----1mg
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물:소, 사용부위:우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탭크, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스2910

[성 상] 흰색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

- 변비
- 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

[용법·용량]

만 15세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 3회 식전(식간 또는 식후)에 복용한다.
만 11세 이상 ~ 만 15세 미만 : 1회 1정, 1일 2회 식전(식간 또는 식후)에 복용한다.
복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
 - 2) 장폐색(창자마힘) 환자
 - 3) 만 7세 이하의 어린이
 - 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galatose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.
제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 3) 신장장애 환자
 - 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약을 복용함으로써 발진 · 충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
 - 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우
 - 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것
 - 3) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
 - 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)
[사용기간] 제조일로부터 36 개월
[포장정보] 300 정/병
[제 조 자] 미래바이오제약 / 경기도 안성시 공단2로 104