

빠른 속쓰림 완화

파미딘® 플러스정

일반의약품

제품정보 QR코드

파미딘® 수산화마그네슘
침정산염소



이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 약학 개과 보관하십시오.

【원료약품의 분량】1정 중 유효성분:

파모티딘(USP)10mg, 수산화마그네슘(KP)165mg, 침정탄산칼슘(KP)800mg, 첨가제(타르색소): 청색2호, 청색2호, 황색203호, 기타첨가제: 스테아르산마그네슘, 오파드라이녹색(03S41083), 유수산화물, 옥수수전분, 자차한도히드록시프로필셀룰로오스, 클로이드성인산화규소

【성상】 연두색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】 위산과다 및 속쓰림과 관련된 가슴앓이의 경감

【용법·용량】 성인 및 만 15세 이상의 환자: 이 약 1일 1회 1정을 복용하십시오. 24시간 안에 2정 이량을 복용하지 마십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 않습니다.

- 1) 이 약은 유탄을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
- 2) 이 성분 및 다른 H2 수용체 결합제에 과민증이 있는 경우 사용하지 않습니다.
- 3) 복용할 어려움을 느낀다면 사용하지 않습니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 원인 불명의 체중 감소가 있는 환자: 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
- 2) 복통이 지속되고 있는 환자: 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
- 3) 신장 질환자: 혈중 칼슘 농도를 측정하십시오.
- 4) 다른 약제를 복용중인 환자는 이 약을 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오. 저산제는 다른 제형약품과 상호작용을 일으킬 수 있습니다.

3. 부작용

- 1) 과민증: 드물게 아나필락시스 반응이 나타날 수 있습니다.
- 2) 간경: 드물게 효소이상성이 나타날 수 있습니다.
- 3) 소화기: 때때로 구역과 설사가 나타날 수 있고, 드물게 변비, 식욕부진, 복부불쾌감, 고창, 구토, 구갈 등이 나타나는 경우가 있습니다.
- 4) 피부: 드물게 발진, 가려움증, 발진이 나타날 수 있고, 예외적으로 다른 히스타민-H2결합제와 마찬가지로 표피박리가 나타날 수 있습니다.
- 5) 기타: 때때로 두통이 나타날 수 있고, 드물게 피로, 황달, 간염, 백관신경종성 부종, 관절통, 근육경련 등이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적주의

- 1) 2주간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 2) 2주인을 초과하여 연속하여 투여하지 않습니다.
- 3) 정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 4) 혈액투석환자에게 이 약과 인산염 결합제를 병용할 경우 인산혈중 효능 상실 위험이 발생할 수 있습니다.

5. 상호작용

1) 본제에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용을 일으킬 수 있습니다.

① 아세트산, 미토프로콜, 프로스타콜, 클로로민, 싸이클린계 항생제, 디클루나실, 디곡신, 이연산염, 핵소메나딘, 철염, 글루코루코논계 항생제, 토피나이드, 글루코코르티코이드, 인도메타신, 게토코나솔, 탄소트랄, 페노치아제계 항진정제, 페니실린, 인산염, 티록신약물의 소화 흡수 감소) 등과 병용시에는 가능하면 2시간 이상의 간격을 두고 투여합니다.

② 살리실산: 뇨의 알칼리화로 살리실산의 신 배설이 증가됩니다.

③ 본제를 다른 위장약과 병용하지 않습니다: 본제를 다른 위장약과 병용하면 작용이 강하게 발현되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.

6. 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에 대한 투여

① 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에 대한 투여: 동물 실험에서 수산화마그네슘의 사용과 기형과의 연구는 실시되지 않았고, 파모티딘 투여의 사용으로 기형이 유발되었다는 보고는 없었습니다. 기형 투여와 태반 칼슘의 연용으로 골화 이상이 보고되었고, 이 성분에 계속 노출된 임신부에 있어서 모든 위험을 배제하지는 못하므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게 투여하지 않는 것이 좋습니다.

② 수유부에 대한 투여: 히스타민-H2결합제는 모유중으로 이행됩니다. 수유부를 통하여 소아가 섭취하는 약 물량은 1% 정도로 낮고, 약동학적 자료들은 이를 뒷받침합니다. 그러나 수유부의 복용과 관련된 소아의 내성은 장기치료와 복용량이 증가하는 경우에 대해서는 알려지지 않았으므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 좋습니다.

7. 소아에 대한 투여: 15세 미만의 소아에게 투여 시 의사와 상의하십시오.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선이나, 고온을 피하고, 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용을 피하고, 품질을 보호, 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

【주의】

- 1) 개봉 후에는 타제용기의 혼합 및 혼용(섞어 씹어)되지 않도록 주의하십시오.
- 2) 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
- 3) 제품 개봉시 또는 취급시 포장재물기, 케이스에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

【저장방법】 밀폐용기에 넣어 실온(10~30℃)에 보관하십시오.

【포장정보】 10정/상자(10정/PTP)

구입시 유효기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준)적격소 제조 (주)동서상트 101

제조의회사 :



충청남도 천안시 서북구 성거읍 망항로 797-48
소비자상담실 : 080-6776-080(수신지부담)

소 비 자 중 심 경 영
공정거래위원회 | 한국소비자원

제조자: (주)인트로바이오파마
경기도 평택시 사탄면 마두길 104-12 (PTP 포장 및 전공정)

제조자: (주)한국파미드제약
경기도 안산시 단원구 산단로83번길 127 (PTP포장)

* 제품 사용 후 이상반응(부작용)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(044-8228)에 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
이 첨부문서 작성일(2021.06.21) 이후 변경된 내용은 종근당 인터넷 홈페이지(www.dkgpharm.com)나 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인 할 수 있습니다.