

위식도 역류성 치료제

에소坦정 20/800mg

(에소오메프라졸/탄산수소나트륨)

【원료약품 분량】1정중

- 유효성분: 에소오메프라졸마그네슘삼수화물(EP).....22.26mg (에소오메프라졸로서 20mg) 탄산수소나트륨(KP).....800mg
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 산화마그네슘, 스테아릴푸마르 산나트륨, 아르기닌, 오파드라이분홍색(AMB II 88A540035), 전분글리콜산나트륨, 코보비돈, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】

연분홍색 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】

위식도 역류질환(GERD)

- －미란성 역류식도염의 치료
- －식도염 환자의 재발방지를 위한 장기간 유지요법
- －식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상 치료요법

【용법·용량】

이 약은 식사하기 적어도 1시간 전 공복에 복용한다. 이 약을 복용할 때는 적어도 반 컵 이상의 물과 함께 그대로 삼킨다. 물 이외의 다른 음료수와 복용하지 않는다. 이 약은 씹거나 부수어서는 안된다. 이 약 20/800mg, 40/800mg은 에소오메프라졸을 각각 20, 40mg 함유하고 있으나, 이 약 20/800mg 2정과 40/800mg 1정의 탄산수소나트륨의 양은 동일하지 않으므로 주의한다.

- 성인
 - 위식도 역류성 질환(GERD),
 - －미란성 역류식도염의 치료: 4주 동안 1일 1회, 1회 40/800mg을 투여한다. 식도염이 치료되지 않거나 증상이 계속되는 환자의 경우 4주 더 복용한다.
 - －식도염 환자의 재발 방지를 위한 장기간 유지요법: 1일 1회, 1회 20/800mg
 - －식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상치료요법
 - 1일 1회, 1회 20/800mg, 4주후에도 증상 조절이 되지 않을 경우 추가 진료가 필요하다.
 - 일단 증상이 완화되면 그 후 연속되는 증상은 1일 1회, 1회 20/800mg을 투여하여 조절한다.
 - 성인에서, 1일 1회, 1회 20/800mg을 필요시마다 투여할 수 있다. 비스테로이드소염진통제 투여로 위궤양 및 십이지장궤양의 발현 위험이 높은 환자에게는 연속되는 증상 조절을 위해 필요시마다 투여하는 것을 권장하지 않는다.
- 간기능장애
 - 경증~중증도의 간장애 환자에서 용량을 조절할 필요는 없다. 중증 간장애환자의 경우 이 약 20/800mg 용량을 초과해서는 안된다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 이 약, 이 약의 구성성분 또는 벤즈이미다졸류에 과민반응 및 그 병력이 있는 환자
 - 아타자나비르 및 펠피나비르를 투여 중인 환자(상호작용항 참조)
 - 수유부
 - 필피비린 함유제제를 투여중인 환자(상호작용항 참조)
 - 심근경색 및 그 병력이 있는 환자(－아르기닌 함유 제제)
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 간장애환자
 - 고령자
 - 심한 소화관궤양 환자
 - 산장애 환자
 - 심기능장애, 폐기능장애 환자
 - 저혈로르성알카리증등의 전해질실조 환자
 - 비터 중후군, 저칼륨혈증, 저칼슘혈증, 산-염기 균형 장애를 가진 환자 (이 약은 탄산수소 나트륨을 함유하고 있으므로 주의하여 투여한다.)
 - 나트륨 섭취 제한을 필요로 하는 환자(고나트륨혈증, 부종, 임신중독증, 방광결석, 고혈압환자 등)
- 이상반응
 - 에소오메프라졸
 - (1) 다음의 이상반응이 에소오메프라졸에 대한 임상시험과 시판 후 조사에서 확인 또는 의심되었다. 용량 상관성은 없었다. 이상반응을 빈도내에 따라 분류하였다(자주) >1/100, (<1/10 : 때때로) >1/1,000, (<1/100 : 드물게) >1/10,000, (<1/1,000 : 매우 드물게 (<1/10,000), - 혈액 및 림프계: 드물게 백혈구감소증, 저혈소판증, 매우 드물게 무과립구증, 범혈구감소증 - 면역계: 드물게 발열, 혈관부종, 아나필락시스 반응/쇼크 등과 같은 과민반응 - 대사/영양: 때때로 말초 부종, 드물게 저나트륨혈증, 매우 드물게 저마그네슘혈증 (중증의 저마그네슘혈증은 저칼슘혈증을 유발할 수도 있다. 저마그네슘혈증은 또한 저칼륨혈증을 유발할 수 있다.) - 정신계: 때때로 불면, 드물게 초조, 정신 혼란, 우울, 매우 드물게 공격성, 환각 - 신경계: 자주 두통, 때때로 어지럼(dizziness), 지각이상, 졸음, 드물게 미각장애 - 시각: 드물게 호린시력 - 청각 및 미로계: 때때로 어지럼(vertigo) - 호흡기계: 드물게 기관지염 - 위장관계: 취창명, 자주 복통, 변비, 설사, 복부팽만감, 구역·구토, 때때로 구강진주증, 드물게 구내염, 위장관 칸디다증, 매우 드물게 현미경적 결장염 - 간담도계: 때때로 간효소 증가, 드물게 황달을 동반하거나 동반하지 않는 간염, 매우 드물게 간부전, 기존 간질환이 있는 환자에서 뇌병증 - 피부 및 피하조직: 때때로 피부부, 가려움, 발진, 두드러기, 드물게 탈모, 광각수선, 매우 드물게 다형홍반, 피부점막만종후군(스티븐스-존슨증후군), 독성피부괴사증(리델증후군) - 근골격계: 골절 드물게 관절통, 근육통, 매우 드물게 근육쇠약 - 신장 및 뇨기계: 매우 드물게 간질신장염 - 생식계: 매우 드물게 여성형유방 - 전신: 매우 투여부의 : 드물게 무력증, 발한증가 - 감염: 클로스트리듬 디피실레시 설사(인도발염) - 기타: 클로스트리듬 디피실레시증(리델증후군)
 - 근골격계: 골절 드물게 관절통, 근육통, 매우 드물게 근육쇠약
 - 신장 및 뇨기계: 매우 드물게 간질신장염
 - 생식계: 매우 드물게 여성형유방
 - 전신: 매우 투여부의 : 드물게 무력증, 발한증가
 - 감염: 클로스트리듬 디피실레시 설사(인도발염)
 - (2) 이외에 다음의 이상반응이 1% 미만의 발생률로 에소오메프라졸과

관련이 있거나 또는 관련 가능성이 있는 것으로 보고되었다.

- －전신: 복부팽만, 일레르기 반응, 등통, 흉통, 흉골하흉통, 안면부종, 안면홍조, 피로, 발열, 인플루엔자유사장애, 일반부종, 다리부종, 권태, 통증, 경직, 무력증, 말초부종
- －심혈관계: 흉조, 고혈압, 빈맥
- －내분비계: 갑상샘증
- －소화기계: 대장과민증, 변비약학, 소화불량, 연하곤란, 위장관형성 장애, 상복부통증, 트림, 식도장애, 장염배변, 위장염, 위장관출혈, 딸꾹질, 흑색변, 구강장애, 인두장애, 작작장애, 위장관 증상, 혈중카로틴증가, 허장애, 허부종, 궤양성 구내염, 구토
- －청각: 귀앓이, 이명
- －혈액계: 빈혈, 자색소빈혈, 자궁경부암피절병증,코피, 백혈구증가증, 백혈구감소증, 혈소판감소증
- －간: 빌리루빈혈증, 간기능 이상, ALT 증가, AST 증가
- －대사/영양: 당뇨, 고요산혈증, 저나트륨혈증, ALP증가, 구갈, 비타민 B12결핍, 체중증가, 체중감소
- －근골격계: 관절염약학, 관절병증, 경련, 섬유근육통증후군, 탈장, 류마티스성 다발성근육통, 관절통
- －정신신장계: 식욕부진, 무감동, 식욕증가, 혼란, 우울약학, 과다근육긴장증, 초조, 감각저하, 발가부진, 불면증, 편두통, 편두통약학, 수면장애, 떨림, 어지럼(dizziness, vertigo), 시야결손, 지각이상, 졸음
- －생식계: 월경통, 월경장애, 질염
- －호흡기계: 천식약학, 기침, 호흡곤란, 후두부종, 인두염, 비염, 부비동염
- －피부/부속기관: 여드름, 항문가려움, 발진, 홍반발진, 피부근전발진, 혈관부종, 피부부, 가려움, 두드러기, 발한증가
- －투사감각: 중이염, 이상후각, 미각상실, 미각도착
- －뇨기계: 소변이상, 양부빈뇨, 방광염, 배뇨곤란, 진균감염, 혈뇨, 배뇨후수, 칸디다증, 생식기 칸디다증, 당뇨
- －시각: 결막염, 시각이상
- －내시경 상에서 발견된 이상반응: 십이지장염, 식도염, 식도혈착, 식도궤양, 식도장막류, 위궤양, 위염, 양성폴립 또는 결절, 바레트식도(Bartlett's esophagus), 점막변색, 탈장
- 다음은 프로토펙프억제제의 시판 후 조사를 통해 보고된 이상반응이다. 이 이상반응은 보통적 다수의 인구집단에서 자발적으로 보고된 것이기 때문에, 항상 발생률을 신색성 있게 예측하거나 약물 투여와의 인과관계를 확립할 수 있지는 않다.
 - －면역계: 전신홍반루푸스
 - －피부 및 피하조직계: 피부홍반루푸스
 - －위장관계: 위저산 용종
 - 형문근용해: 형문근용해가 나타날 수 있으나 신중하게 관찰하고 근육통, 무력증, 크레아티닌키나제(크레아틴인산활효소) 상승, 혈중 및 소변 미오글로빈 상승을 포함하는 증상이 나타난 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 취해야한다.
- 탄산수소나트륨
 - 대사이상: 알카리증, 나트륨 축적에 의한 부종 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 휴약등 적절한 처치를 한다.
 - 소화기계: 때때로 위부팽만, 트림 드물게 위산의 반동성 분비 등이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 이 약으로 인해 약성종양의 증상이 완화되거나 진단이 지연될 수 있으므로 약성 종양이 의심되는 경도 증상(의도하지 않은 현저한 체중 감소, 재발성 구토, 삼킴곤란, 토혈, 흑색변 등)이 있으면서 위궤양이 있거나 의심되는 경우 약성이 의심을 확인하고 투여해야 한다.
 - 이 약으로 장기간 치료할 경우(특히 1년 이상) 환자는 정기적으로 검사를 받아야 한다.
 - 이 약을 필요시 투여하는 환자에게는 증상의 변화가 있을 때 의사와 상담하도록 주의시킨다. 이 약을 필요시 투여하도록 처방받은 경우 이 약의 혈중농도 변동으로 인한 다른 약물과의 상호작용을 고려해야 한다.
 - 프로토펙프억제제로 인해 위내 산도가 감소하면 위장관에 보통 존재하는 세균의 수가 감소한다. 이 약으로 치료할 때 살모넬라, 캄필로박터, 클로스트리듬 디피실레와 같은 세균에 의한 위장관의 감염 위험이 약간 증가할수 있다. 이것은 클로스트리듬 디피실레균성 설사 위험성 증가와 연관이 있으며 특히 입원환자에서 이러한 위험성이 증가되었다는 여러 관찰연구 결과가 보고되었다. 이러한 진단은 설사증세가 개선되지 않았을 때 고려되어야 한다. 클로스트리디움 디피실레균성 설사는 거의 모든 항균제 사용 중 보고되고 있다.
 - 일부 해외 역학연구에서 프로토펙프억제제(Proton Pump Inhibitor) 치료가 고관절, 손목 및 척추 골절의 위험성 증가와 관련이 있을 가능성이 있다고 보고되었다. 골절의 위험은 권장용량을 상하하는 고용량을 투여한 환자와 1년 이상의 장기사용 환자에서 증가되었다. 오메프라졸 및 에소오메프라졸과 골다공증성 골절 간의 인과관계가 밝혀진 것은 아니다. 골다공증 및 골다공증성 골절 예방에 진행될 위험이 있는 환자는 경우 최선의 임상 지침에 따라 적절한 임상적 모니터링이 권고된다.
 - 3개월 이상 프로토펙프억제제(Proton Pump Inhibitor) 치료를 받은 환자들에게서 저마그네슘혈증이 드물게 보고되었으며, 1년 이상 치료를 받은 경우에 가장 많이 나타났다. 대부분의 환자들에게 저마그네슘혈증의 치료로서 마그네슘보충 및 프로토펙프억제제(Proton Pump Inhibitor) 투여 중단이 필요하다. 장기간 치료가 필요하거나 디곡신 또는 저마그네슘혈증을 유발하는 약물에, 이노제제를 병용투여 하는 환자들은 치료 시작을 포함한 주기적 마그네슘 수치 모니터링이 필요하다. 중대한 이상반응은 감각, 부정맥, 발작을 포함한다.
 - 이 약의 투여로 인한 위내 산도의 감소는 혈청 크로모그라닌 A(serum chromogranin A, CgA)의 농도를 증가시킨다. 따라서 이 약을 투여 중인 사람은 신경내분비종양 진단검사에서 위양성 결과를 야기할 수 있다. CgA검사 전 최소 14일 전에는 이 약의 투여를 일시적으로 중단해야 하며, 검사치기 참고 검사항을 초과한 경우 재검사 시행을 고려하도록 한다. 반복적으로 검사를 실시할 경우(예, 모니터링), 실험실간 참고 범위가 다르므로 농도의 측정은 동일한 실험실에서 실시하여 한다.
 - 메토트렉세이트: 프로토펙프억제제와 메토트렉세이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토트렉세이트의 사용상의 주의사항항 참조)를 병용하는 경우 메토트렉세이트 그리고/또는 그 대사체의 혈청 농도가 상승 및 지속되어 메토트렉세이트의 독성이 나타날 수 있다는 문헌보고가 있었다. 고용량의 메토트렉세이트를 사용하는 경우, 프로토펙프억제제 의 일시적인 투여 중단을 고려할 수 있다(상호작용항 참조).
 - 치료시 경과를 충분히 관찰하고 증상에 따라 이 약을 최소용량 및 적절한 치료기간으로 투여하여야 한다.
 - 피부 및 전신홍반루푸스: 프로토펙프억제제를 복용한 환자에서

피부홍반루푸스(Cutaneous lupus erythematosus, CL)와 전신홍반루푸스(Systemic lupus erythematosus, SLE)가 보고되었다. 이러한 사례들은 새로 발생하거나 기존의 자기면역질환의 약화로 발생하였다. 프로토펙프억제제로 유발되는 홍반루푸스 사례는 대부분 피부홍반루푸스였다. 프로토펙프억제제를 복용한 환자에서 보고된 피부홍반루푸스의 가장 흔한 형태는 아급성피부홍반루푸스이며, 영어부터 노인에 이르기까지 지속적인 약물 치료 후 수주에서 수년 이내에 발생하였다. 일반적으로 조직학적 결과는 장기침습이 없는 상태로 관찰되었다. 프로토펙프억제제를 복용한 환자에서 전신홍반루푸스는 피부홍반루푸스보다 덜 흔하게 보고되었다. 프로토펙프억제제 관련 전신홍반루푸스는 보통 비약물유발성전신홍반루푸스보다 더 가벼운 증세를 보인다. 전신홍반루푸스는 주로 젊은층의 성인부터 노인에 이르기까지 초기 약물 치료 후 수일에서 수년 이내에 발생한다. 대다수의 환자는 발진이 나타났으나, 관절통과 혈구감소증도 보고되었다. 의학적으로 지시된 것 보다 더 오랫동안 프로토펙프억제제를 투여하지 않는다. 만약 이 약을 복용한 환자에서 피부홍반루푸스 또는 전신홍반루푸스와 일치하는 증상이나 징후가 나타나는 경우, 약을 복용을 중단하고 적절한 전문의에게 환자 평가를 의뢰한다. 대부분의 환자들은 4~12주 내에 프로토펙프억제제 중단만을 통하여 개선되었다. 혈청학적 검사(예, 항핵항체(Antinuclear antibody, ANA)에서 양성으로 나타날 수 있으며, 높은 혈청학적 검사결과와 임상 증상보다 해결되는데 시간이 더 소요될 수 있다.

- 올혈청상부전, 부종 또는 나트륨 정제 뿐만 아니라 간뇨증 또는 무뇨증이 있는 환자에는 주의하여 투여한다.
- 이 약에 포함된 탄산수소나트륨은 완충성이 있으나 장기 투여로 알카리증(혈뇨, 구토, 출혈, 탈수증)이 일어날 수 있으므로 주의하여 투여한다.
- 위저산 용종(Fundic gland polyps): 프로토펙프억제제 사용은 위저산 용종의 위험 증가와 관련이 있으며 특히 1년 이상 장기간 사용 시 위험이 증가한다. 프로토펙프억제제를 사용하는 환자 중 위저산 용종이 발생한 대부분의 환자들은 무증상이었으며 내시경 검사를 통해 우연히 발견하였다. 프로토펙프억제제는 치료하고자 하는 증상에 맞게 적당 기간 사용해야 한다.
- 상호작용
 - 에소오메프라졸
 - 이 약 투여 중 위내 산도 감소로 인해 위 산도에 의해 흡수 기전이 영향을 받는 약물의 흡수가 증가 또는 감소될 수 있다. 다른 산 분비 억제제나 제산제와 마찬가지로 이 약 투여 중에는 케토코나졸과 이트라코나졸 및 엘로티닌의 흡수가 감소될 수 있고 디곡신의 흡수가 증가할수 있다. 건강한 지원자들에서 오메프라졸(하루에 20mg)과 디곡신의 동시투여는 디곡신의 생체이용률을 10%정도 증가시켰다(10명의 지원자중 2명은 30%까지 증가). 에소오메프라졸은 오메프라졸의 이성질체이다. 따라서 이 약을 디곡신과 병용투여시 환자의 상태는 모니터링 되어야 한다.
 - 에소오메프라졸은 CYP2C19와 CYP3A4에 의해 대사된다. 그리고 에소오메프라졸은 이 약의 주 대사효소인 CYP2C19를 저해한다. 디아제팜, 시탈로프람, 이미프라민, 클로미프라민, 페니토인, 와르파린 등과 같이 CYP2C19에 의해 대사되는 약물과 병용 시 이들 약물의 혈청 농도가 증가될 수 있으므로 이들 약물의 감량이 필요할 수 있다. CYP2C19 기질인 디아제팜과 에소오메프라졸 30mg의 병용투여로 디아제팜의 청소율이 45% 감소되었다. 간질환자에게 페니토인과 에소오메프라졸 40mg의 병용투여로 페니토인의 혈청농도 최저치와 13% 증가되었다. 이 약을 투여하기 시작하거나 중단할 때 페니토인의 혈청 농도를 모니터링하도록 한다. 오메프라졸(1일 1회 40mg 투여)은 브리코나졸(CYP2C19 기질)의 Cmax와 AUC7를 각각 15% 및 41% 증가시켰다. 임상시험에서 와르파린을 투여하고 있는 환자에게 에소오메프라졸 40mg을 병용투여하였을 때 응고 시간은 정상 범위에 포함되었다. 그러나 시판 후 조사에서 두 약물을 병용투여하는 동안 임상적으로 유의한 INR과 프로트롬빈 시간의 상승이 몇 건 보고되었으며 이는 비정상적출혈과 심지어 사망까지 초래할 수 있다. 그러므로 와르파린 또는 다른 쿠마린 유도체와 이 약과의 병용투여를 시작하거나 중단할 때 모니터링이 필요하다.
 - 에소오메프라졸은 CYP2C19과 CYP3A4에 의해 대사된다. 에소오메프라졸과 CYP3A4 저해제인 클레르트로마ixin(500mg 1 일 2회 투여)을 동시에 투여하면 이 약의 AUC가 2배로 증가된다. 이 약과 CYP2C19, CYP3A4 저해제와의 병용투여는 이 약의 노출을 두 배 이상 증가시킬 수 있다. CYP2C19, CYP3A4 억제제인 브리코나졸은 오메프라졸의 AUC7를 280%까지 증가시켰다. 이 때문에 이 약의 용량을 조절할 필요는 없다. 그러나 중증의 간기능 장애환자와 장기간의 치료가 필요한 환자에서는 용량조절을 고려하여야 한다.
 - CYP2C19나 CYP3A4 혹은 두가지 모두를(예, 리람피신과 세틴트존스위트) 유도한다고 알려진 약물들은 에소오메프라졸 대사를 증가시킴으로써 에소오메프라졸 혈청 농도를 감소시킬 수도 있다. 이 약과 리람피신 또는 세틴트존스위트의 병용투여를 피한다.
 - 에소오메프라졸 뿐만 아니라, 오메프라졸도 CYP2C19의 억제제로써 작용한다. 교차연구에서 건강한 지원자에게 40mg의 오메프라졸을 투여한 경우 실로스타졸의 Cmax와 AUC가 각각 18%와 26% 증가 하였고 실로스타졸의 혈청 대사체 중 하나의 Cmax와 AUC는 각각 29%와 69% 증가하였다.
 - 건강한 지원자에게 오메프라졸(40mg 1일 1회 투여)과 아타자나비르 300mg(리토나비르 100mg을 병용투여했을때 아타자나비르의 노출이 감소했다(AUC, Cmax, Cmin이 약 75% 감소). 아타자나비르 400mg 투여 시에는 오메프라졸의 아타자나비르 노출에 대한 영향을 생쇄시킬 수 없다. 이 약을 포함한 프로토펙프억제제들은 아타자나비르와 병용투여할 수 없다.
 - 오메프라졸은 몇 개의 항 바이러스제제와 상호작용이 있는 것으로 보고되었다. 이 보고된 상호작용 의 임상적 중요성과 기전은 밝혀지지 않았다. 오메프라졸 투여시의 위내 산도 감소는 한 바이러스제제의 흡수를 변화시킬 수 있다. 가능한 상호작용의 또 다른 기전은 CYP2C190이며, 아타자나비르 및 펠피나비르와 같은 항바이러스 제제에서는 오메프라졸과 병용투여시 혈청수치 감소가 보고되었으며 병용투여는 권장되지 않는다. 그 외 시퀴나비르와 같은 항바이러스 제제에서는 혈청수치 증가가 관찰되었다. 오메프라졸과 병용투여시 혈청수치가 변하지 않는 항바이러스 제제 또한 존재한다. 오메프라졸과 에소오메프라졸은 유사한 약력학/약동학적 특성을 갖고 있으므로 아타자나비르 및 펠피나비르와 같은 항바이러스제제 약물과 병용투여해서는 안된다.
 - 건강한 지원자에게 시사프리드와 에소오메프라졸 40mg을 병용투여했을 때 시사프리드의 AUC가 32% 증가되고 배설 반감기가 31% 연장되었으며, 최고 혈청 농도의 유의한 증가는 없었다. 이러한 상호작용으로 심장 전기생리에 대한 시사프리드의 영향이 변경되지 않았다. 즉, 시사프리드 단독 투여에 의한 QTc 간격의 근소한 연장 외에 이 약과 시사프리드의 병용투여에 의해 더 이상 QTc 간격이 연장되지는 않았다.
 - 에소오메프라졸은 아목시실린 또는 퀴니딘의 약물동력학에 임상적으로 유의한 영향을 미치지 않았다.
 - 에소오메프라졸과 나프록센 또는 로페카시브의 병용투여를 단기간 평가한 시험에 의하면 임상적으로 연관있는 약동학적 상호작용이 나타나지 않았다.
 - 건강한 지원자로부터의 연구결과로부터 클로피도그렐(초기용량 300mg/유지용량1일 75mg)과 에소오메프라졸(경구투여 1일 40mg)은 약동학/약력학적인 상호작용이 있는 것으로 보여졌으며,

이것은 평균 14% 정도 혈소판 응집을 감소시키는 것으로 보여졌으며 클로피도그렐의 혈청 대사체의 노출을 평균 40% 정도 감소시키는 것으로 나타났다. 이 결과에 근거하여 에소오메프라졸과 클로피도그렐는 병용투여하지 않도록 한다.

(12) 이상반응 사례 보고, 집단약동학 연구(population pharmacokinetic studies) 및 후향적 연구 등에서 메토트렉세이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토트렉세이트의 사용상의 주의사항 참조)와 프로토펙프억제제를 병용하는 경우 메토트렉세이트 그리고/또는 그 대사체인 히드록시메토트렉세이트의 혈청 농도가 상승 및 유지되어 메토트렉세이트의 독성이 나타날 수 있다고 보고되었다. 그러나 고용량의 메토트렉세이트와 프로토펙프억제제에 대한 정식 약물상호작용연구는 수행되지 않았다(일반적용 주의항 참조).

(13) 이 약과 타크로리무스를 병용하면 타크로리무스의 혈청치가 증가할 수 있다.

(14) 이 약과 릴피바린의 병용 시 릴피바린의 혈청농도가 감소할 수 있으므로(위장 pH 증가) 병용투여해서는 안된다. 이는 릴피바린의 치료효과를 저하시킬 수 있다.

2) 탄산수소나트륨

(1) 이 약의 소변내,체액의 pH 상승에 의해 병용약물의 흡수,배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.

(2) 다량의 우유, 칼슘제제와 병용 시 우유 알칼리 증후군(고칼슘혈증, 고칼소혈증, 알카리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

6. 입부에 대한 투여

에소오메프라졸의 입산 중 노출에 대한 데이터는 제한되어 있다. 동물실험 결과 배/태자 발달과 관련하여 작간점의 유해작용은 나타나지 않았다. 라세미체 혼합물의 동물실험 결과 임신, 분만 또는 분만 후 발달에 대한 작간점의 유해작용도 나타나지 않았다. 그러나 이 약을 입부에 처방시 주의해야 한다.

7. 수유부에 대한 투여

에소오메프라졸이 사람의 모유 중으로 이행하는지 여부는 알려져 있지 않다. 수유부를 대상으로 한 시험은 실시되지 않았으므로 이 약을 수유 중 투여해서는 안된다.

8. 과량 투여시의 처치.

계획된 과량투여(에소오메프라졸 240mg/day용량의 제한된 경험)와 관련하여 나타나는 증상들은 일시적이다. 에소오메프라졸 80mg을 1회 투여한 경우 별다른 문제가 없었다. 특이적인 해독제는 알려져 있지 않다. 에소오메프라졸은 단백질결함율이 아주 높기 때문에 투석되지 않는다. 따라서 과량투여시 대증요법 및 일반 유지 요법을 사용하여야 한다.

9. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

10. 약약품동등성시험 정보*

가. 시험할 에소리옴플러스정20/800mg(에소오메프라졸마그네슘삼수화물, 탄산수소나트륨(주)씨티씨바이오)와 대조약 에소듀오정20/800mg (주)웅진강릉)을 2x4 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구 투여하여 32명의 혈청 에소오메프라졸을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC, Cmax)를 로그변환하여 통계처리 하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰구간이 log0.8에서 log1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구 분	비교평가항목		참고평가항목		
	AUC _{0-10h} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)	
대 조 약	에소듀오정 20/800mg [주)웅진강릉]	1244 ±784	1045 ±525	0.50 (0.33~3.00)	1.13 ±0.40
시 험 약	에소리옴플러스정 20/800mg [주)씨티씨바이오]	1269 ±802	973 ±431	0.50 (0.17~2.00)	1.13 ±0.38
90% 신뢰구간* (기주: log 0.8~log 1.25)		Log0.9615~ log1.1421	log0.8614~ log1.1859	—	—

(AUC, Cmax, t1/2: 평균값±표준편차, Tmax: 중앙값(범위), n=32)
AUC: 투약시간부터 최종혈청농도 측정시간 까지의
혈청농도-시간곡선하면적
Cmax: 최고혈청농도
Tmax: 최고혈청농도 도달시간
t1/2: 말단 소실 반감기
* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

*1. 이 약은 (주)씨티씨바이오 에소리옴플러스정20/800mg과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정을 (주)씨티씨바이오에 위탁 제조하였음.

【저장방법】 기밀봉기. 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 28정

【제조자】 (주)씨티씨바이오
경기도 안산시 단원구 강촌로 228-16

【제조의뢰자】 (주)한국파마
경기도 화성시 향남읍 제막공단3길 87

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템 (nedrug.mfds.go.kr)을 참고하십시오.

※ 부작용 보고 및 피해 구제 신청: 한국약품안전관리원(☎1644-6223)/피해구제 상담(☎14-3330)

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나, 변질·변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 정부에서 고시한 소비자 피해보상규정에 의거 정당한 소비자의 피해에 대해 보상해 드립니다.

※ 이 청부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.koreapharma.co.kr) 또는 (☎02-558-1277)에서 확인할 수 있습니다.

건강한 미래 아름다운 동행

KP 한국피마
KOREA PHARMA
www.koreapharma.co.kr
경기도 화성시 향남읍 제막공단3길 87

제출문의처 02)558-1277
(마케팅팀부)
최초개창년월일 2021.06.23
XOT→2101