[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

〔전문의약품〕

선택적 세로토닌 재흡수 억제제

파로자트®씨알정 12.5밀리그램
파로자트®씨알정 25밀리그램

(파록세틴염산염수화물)

Paroxat CR Tab. 12.5, 25mg (Paroxetine Hydrochloride Hydrate)

선택적 세로토닌 재흡수 억제제
파로자트씨알정 12.5밀리그램
파로자트씨알정 25밀리그램
(파록세틴염산염수화물)

35mm

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

■ **파로자트씨알정12.5밀리그램**
- 유효성분: 파록세틴염산염수화물(Paroxetine Hydrochloride Hydrate)(EP) ---------- 14.25mg
  (파록세틴으로서 12.5mg)
- 첨가제(타르색소) : 황색 203호, 황색 5호
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 젖)
- 기타첨가제: 글리세랄디베헤네이트, 메타아크릴산 · 아크릴산에틸공중합체, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 시트르산트리에틸, 에틸셀룰로오스분산액, 오파드라이노란색(03B620020), 콜로이드성이산화규소, 탈크, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스

■ **파로자트씨알정25밀리그램**
- 유효성분: 파록세틴염산염수화물(Paroxetine Hydrochloride Hydrate)(EP) ---------- 28.5mg
  (파록세틴으로서 25mg)
- 첨가제(타르색소) : 적색 40호, 황색 5호
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 젖)
- 기타첨가제: 글리세랄디베헤네이트, 메타아크릴산 · 아크릴산에틸공중합체, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 시트르산트리에틸, 에틸셀룰로오스분산액, 오파드라이분홍색(03B440038), 콜로이드성이산화규소, 탈크, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스

【성 상】
■ **파로자트씨알정12.5밀리그램**: 노란색의 원형 장용성 필름코팅정제
■ **파로자트씨알정25밀리그램**: 분홍색의 원형 장용성 필름코팅정제

【효능 · 효과】
1. 주요우울증
2. 광장공포증을 수반하거나 하지 않는 공황장애
3. 사회불안장애/사회공포증
4. 월경전 불쾌장애

【용법 · 용량】
이 약은 식사와 관계없이 1일 1회 주로 오전에 복용해야 한다.
이 약은 씹거나 분쇄하지 말고 그대로 삼켜서 복용해야 한다.

1. 주요우울증
 1) 시작용량 :
 초기 권장용량은 파록세틴으로서 1일 25 mg이며, 주요우울증 치료에 대한 이 약의 효과를 증명하기 위한 임상시험에서, 피험자에게 25 ~ 62.5 mg을 투여하였다. 다른 주요우울증 치료제와 마찬가지로, 충분한 효과는 지연되어 나타날 수 있다. 25 mg에 반응하지 않는 일부 환자에게는 12.5 mg씩 증량하여 최대 1일 62.5 mg까지 투여할 수 있다. 투여용량을 변경할 때는 최소 1주 간격을 두어야 한다.
 2) 유지요법 :
 주요우울증의 급성 발현에는 수개월 혹은 그 이상의 지속적인 약리학적 치료기간이 필요하다. 증상 경감을 위해 필요한 항우울제의 용량과 안정성대를 유지하는데 필요한 용량이 동일한지는 알려져 있지 않다. 파록세틴 일반정제의 효능에 대한 체계적인 평가는 평균 30 mg(상대 생물학적 이용률에 기초하였을 때 이 약 37.5 mg에 해당)을 1년간 투여했을 때, 효과가 유지됨다는 것을 보여주었다.
2. 공황장애
 1) 시작용량 :
 시작 용량은 파록세틴으로서 1일 12.5 mg으로 하며, 매주 12.5 mg씩 증량한다. 이 약의 효능을 증명하기 위한 임상시험에서는 1일 12.5 ~ 75 mg을 투여하였다. 1일 투여량은 75 mg을 초과하지 않도록 한다.
 2) 유지요법 :
 파록세틴 일반정제의 효능이 장기간 유지되는 것은 재발 방지를 위한 3개월 임상에서 증명되었다. 이 임상에서, 파록세틴 일반정제를 복용한 공황장애 환자들의 재발율은 위약복용 환자에 비해 낮았다. 공황장애는 만성 질환이므로 효과가 있는 환자에 대해서는 치료를 지속하는 것이 바람직하다. 이 약으로서 용량은 환자에 대한 최소 유효 용량이 되도록 조절해야 하며, 환자들을 주기적으로 재평가 하여 지속적인 치료의 필요성을 결정해야 한다.
3. 사회불안장애/사회공포증
 1) 시작용량 :
 권장 시작 용량은 파록세틴으로서 1일 12.5 mg이다. 사회 불안 장애 치료에 대한 이 약의 효과를 증명하기 위한 임상시험에서는 1일 12.5 ~ 37.5 mg을 투여하였다. 1일 투여량은 75 mg을 초과하지 않도록 한다.
 2) 유지요법 :
 이 약을 일마나 장기간 복용해야 하는지에 대한 유용한 근거는 없다. 사회불안 장애에 대한 위약대조 임상시험에서 이 약의 효과는 12주 이상에서는 평가되지 않았지만, 사회 불안 장애는 만성 질환으로 인식되고 있으므로, 반응이 있는 환자에 대해서는 치료를 지속하는 것이 바람직하다. 용량은 환자에 대한 최소 유효 용량이 되도록 조절해야 하며, 환자들을 주기적으로 재평가 하여 지속적인 치료의 필요성을 결정하여야 한다.
4. 월경전 불쾌장애
 1) 시작용량 :
 이 약은 의사의 평가에 따라 월경 주기 전체 동안 또는 월경 주기의 황체기에만 제한적으로 투여 할 수 있다. 권장 시작 용량은 파록세틴으로서 1일 12.5 mg이다. 임상 시험에서, 1일 12.5 mg과 25 mg 모두 효과가 있었다. 용량 변경은 최소 1주일의 간격을 두어야 한다.
 2) 유지요법 :
 위약 대조시험에서 이 약의 효과는 3회의 월경 주기를 초과한 기간에 대해서는 체계적으로 평가되지 않았다. 그러나 폐경이 시작되어 증상이 없어지기 전까지는 나이가 들어감에 따라 증상이 악화되는 것이 일반적인 보고이다. 그러므로 반응이 있는 환자에 대해서는 치료를 지속하는 것이 바람직하다. 환자들을 주기적으로 재평가하여 지속적인 치료의 필요성을 결정해야 한다.
 ○ 고령자 및 중증 신/간부전 환자 : 고령자 및 중증 신/간부전 환자에 대한 이 약의 권장 시작용량은 파록세틴으로서 1일 12.5 mg이다. 필요시 증량 가능하며, 1일 50 mg을 초과하지 않도록 한다.
 ○ 정신질환 치료를 하기 위한 MAO저해제 전환 관련
 정신질환 치료를 위한 MAO저해제 투약을 중단하고 동 제제 치료를 시작할 경우 적어도 14일 이상 간격을 두어야 한다. 반대로, 정신질환 치료를 위해 MAO저해제 투여를 시작하려면 동 제제 투약 중단 후 적어도 14일이 경과해야 한다.
 ○ 리네졸리드 또는 메칠렌블루와 같은 다른 MAO저해제
 리네졸리드 또는 정맥주사용 메칠렌블루제를 투여받는 환자는 세로토닌 증후군 위험성 증가 때문에 동 제제 투여를 시작하서는 안된다. 임원을 포함한, 다른 응재적시술들, 더 긴급한 정신질환적 상태 치료를 필요로 하는 환자의 경우는 투약을 고려해야 한다.
 이미 동 제제를 투여받는 환자에게 리네졸리드 또는 정맥주사용 메칠렌블루 제제를 긴급히 투여할 필요가 있을 수 있으며, 리네졸리드나 정맥주사용 메칠렌블루 제제에 대한 대체약물이 없고 특정환자에서 리네졸리드 또는 정맥주사용 메칠렌블루 제제 치료의 유익성이 세로토닌 증후군 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 동 제제를 즉시 중단하고 리네졸리드 또는 정맥주사용 메칠렌블루 제제를 투여할 수 있다. 환자는 리네졸리드 또는 정맥주사용 메칠렌블루 제제를 투여한 지 2주 또는 마지막 투여 후 24시간 중 먼저 오는 시점에서 세로토닌 증후군 증상을 모니터링해야 한다. 리네졸리드 또는 정맥주사용 메칠렌블루 제제 마지막 투여로부터 24시간 후 동 제제 치료를 다시 시작할 수 있다.
 비정맥투여(경구용제 또는 국소주사)로 메칠렌블루 제제 투여 또는 동 제제를 1mg/kg 이하 정맥주사한 경우에 대한 위험성은 명확하지 않다. 그럼에도 불구하고 임상상의는 이러한 사용에 대한 세로토닌 증후군의 옹급 증상 가능성을 인지해야 한다.
 ○ 이 약의 투약 중지
 파록세틴 일반정제의 투약 중지와 관련된 증상들이 보고되었다. 투여를 중지할 때는 어떤 적응증에 대해 처방되었는지에 관계없이 이들 증상들을 모니터링 해야 한다. 갑작스런 중단보다는 점차적인 감량이 권장된다. 만약 이 약의 감량이나 투약 중지로 재이환 시 심한 증상들이 나타난다면 이전에 복용하던 용량을 재투여하는 것을 고려하여야 한다. 그 후에, 의사는 더 점차적인 비율로 용량 감소를 지속할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
 · 자살성향 및 항우울제
 주안우울증이나 다른 정신과적 질환을 가진 소아, 청소년 및 젊은 성인(18 ~ 24세)에 대한 단기간의 연구에서 항우울제가 위약에 비해 자살 충동과 행동(자살성향)의 위험도를 증가시킨다는 보고가 있다. 소아, 청소년 또는 젊은 성인에게 이 약이나 다른 항우울제 투여를 고려중인 의사는 임상적인 필요성이 위험성보다 높은지 항상 신중하게 고려해야만 한다. 단기간의 연구에서 25세 이상의 성인에서는 위약과 비교하였을 때 항우울제가 자살성향의 위험도를 증가시키지 않았고, 65세 이상의 성인에서는 위약에 비해 항우울제에서 이러한 위험이 감소하였다. 우울증 및 다른 정신과적 질환 자체가 자살 위험 증가의 관련이 있다. 항우울제로 치료를 시작한 모든 연령의 환자는 적절히 모니터링 되어야 하며 잠재적 악화, 자살성향 또는 적개심, 공격성, 부노 등 다른 비정상적인 행동의 변화가 있는지 주의 깊게 관찰되어야 한다. 환자와 가족이나 보호자 또한 환자를 주의 깊게 관찰하고 필요한 경우 의사와 연락하도록 지도한다. 이 약은 소아 및 청소년에서의 사용은 승인되지 않았다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
 2) MAO 억제제 복용 환자
 : 정신질환 치료를 위해 이 약과 MAO 저해제를 병용투여하거나 이 약 투여 중단 후 14일 이내에 MAO저해제를 투여하는 것은 세로토닌 증후군 위험성을 증가시키기 때문에 금기이다. 정신질환 치료를 위해 MAO저해제 투여 중단 후 14일 이내에 이 약을 투여하는 것 또한 금기이다. (옴법 · 용량 항 및 5. 일반적주의 항 참조)
 리네졸리드 또는 정맥주사용 메칠렌블루 제제와 같은 MAO저해제를 투여받는 환자에게 이 약 투여를 시작하는 것 또한 세로토닌 증후군 위험성 증가 때문에 금기이다.(옴법 · 용량 항 및 5. 일반적주의 항 참조)
 3) 티오리다진 복용 환자
 4) 피모지드 복용 환자
 5) 세로토닌 전구체(L-트립토판, 트립탄 계열) 복용 환자
 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 1) 신경이완제를 복용하고 있는 환자(신경이완제악성증후군이 나타날 수 있다.)
 2) 경구용 항응고제를 복용하고 있는 환자
 3) 간질 환자
 4) 심장질환자
 5) 당뇨병 환자(당뇨병 환자에게 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI)를 투여할 때는 우울증의 개선으로 기인할 수 있는 혈당 조절 변화가 나타날 수 있으므로 인슐린이나 경구용 혈당 저하약의 용량 조절이 필요할 수 있다.)
 6) 조증 또는 그 병력이 있는 환자(조증 상태에 있는 환자는 이 약의 투여를 중지해야 한다.)
 7) 출혈의 경향이 있는 환자, 출혈성 질환의 병력이 있거나 소인을 가진 환자 및 출혈의 위험성을 높일 수 있는 약물(예, 클로자핀과 같은 비정형의 항정신병약, 페노티아진, 대부분의 삼환계 항우울약, 아스피린, 비스테로이드성 항염증약(NSAIDs), COX-2 억제제)을 병용투여 받는 환자
 8) 혈관 녀내성 환자(동공확대를 일으킬 수 있다.)
 9) 중증 간질에 및 신장에 환자
 10) 자살충동 또는 자살기도의 병력이 있거나, 자살충동이 있는 환자(자살염려, 자살기도가 나타날 수 있다.)
 11) 뇌의 기질적장애 또는 정신질환의 요인이 있는 환자(정신증상을 악화시킬 수 있다.)
 12) 충동성이 높은 병존장애 환자(정신증상을 악화시킬 수 있다.)
 13) 고령자
 14) 이 약은 황색5호(선셋엘로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. (황색5호 함유제제에 한함)

4. 이상반응
 1) 아래 기록된 이상반응 중 일부는 치료를 계속할 경우 이상반응의 강도와 빈도가 감소할 수 있으며, 일반적으로 투여를 중단해야 할 정도에까지 이르지는 않는다. 빈도 평가 : 매우 흔하게(≥1/10), 흔하게(≥1/100, <1/10), 흔하지 않게(≥1/1,000, <1/100), 드물게(≥1/10,000 및 <1/1,000), 매우 드물게(<1/10,000)

순환기계
– 흔하지 않게: 동성빈맥, 고혈압이나 불안장애 환자에서 이 약 투여 후 혈압의 일시적인 상승 또는 강소, 기립저혈압
– 드물게: 서맥
대사 및 영양
– 흔하게: 콜레스테롤 수치 증가, 식욕감소
– 드물게: 저나트륨혈증
저나트륨혈증은 주로 고령자에서 보고되었는데 때때로 항이뇨호르몬분비이상증후군(SIADH)에서 기인되기도 한다. 저나트륨혈증은 이 약의 투여를 중지하면 일반적으로 원상태로 돌아온다.
눈
– 흔하지 않게: 흐린 시력
– 흔하지 않게: 동공확대
– 매우 드물게: 급성 녹내장
소화기계
– 매우 흔하게: 구역
– 흔하게: 변비, 설사, 구토, 구갈
– 매우 드물게: 위장관 출혈
전신 및 투여부위
– 흔하게: 체중 증가, 무력증
– 매우 드물게: 말초부종
간-담도계
– 드물게: 간효소의 증가
– 매우 드물게: 간질환(간염, 때때로 황달 또는 간부전과 관련이 있음)에 대한 시판 후 보고가 있었다. 만약 간기능 검사 결과 지속적인 증가가 관찰된다면 파록세틴의 투여 중지를 고려하여야 한다.
신경계
– 흔하게: 어지러움, 진전, 두통
– 흔하지 않게: 추체외로장애(운동장애 이상이 있는 환자나 신경이완제를 복용하는 환자에서 구강-안면 근육긴장 이상 포함)
– 드물게: 정좌불능증, 경련 및 하지불능증후군(RLS)
– 매우 드물게: 세로토닌 증후군(초조, 흔돈, 발한, 환각, 과다반사, 간대성 근경련, 진전성 빈맥 및 진전을 포함)
정신계
– 흔하게: 졸림, 불면, 초조, 비정상적인 꿈(악몽 포함)
– 흔하지 않게: 흔돈, 환각
– 드물게: 초조, 불안, 이인증, 공황발작
– 빈도불명: 자살 관념 및 자살 행동, 청소년 및 젊은 성인(18~24세)에서의 자살성향 증가
이러한 증상들은 기저 질환으로 인한 것일 수 있다.
신장 및 비뇨기계
– 흔하지 않게: 요저류, 요실금
생식기계 및 유방
– 매우 흔하게: 성기능 장애
– 드물게: 고프로락틴혈증/유즙분비파다, 월경장애(월경과다, 자궁출혈 및 무월경 포함)
– 매우 드물게: 지속 발기증
피부 및 피하조직
– 흔하게: 발한
– 흔하지 않게: 피부 발진, 가려움
– 매우 드물게: 중증 피부 이상반응(다형홍반, 피부점막안증후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성 표피괴사증(테인 증후군) 포함), 두드러기, 광민감반응
혈액 및 림프계
– 흔하지 않게: 피부 및 점막의 비정상적 출혈
– 매우 드물게: 혈소판 감소증
– 빈도불명: 범혈구 감소, 무과립구증, 백혈구 감소
면역계
– 매우 드물게: 중증의 알레르기 반응(아나필락시스양 반응, 혈관부종 포함)
내분비계
– 매우 드물게: 항이뇨호르몬부적절분비증후군
호흡기계
– 흔하게: 하품
귀 및 미로
– 빈도불명: 귀울림
근골격계
– 드물게: 관절통, 근육통

2) 파록세틴 투여 중단시 나타나는 증상들
 (1) 성인 : 성인을 대상으로 한 임상시험에서 치료 중단시 위약 투여환자의 20%에서, 이 약 투여환자의 30%에서 이상반응이 발생하였다. 투여중지에 따른 증상은 약물 남용이 유발하는 중독성 또는 의존성과 같지 않다. 파록세틴의 투여중단시 어지러움, 감각장애(감각이상과 전기충격 감각, 귀울림 포함), 수면장애(격렬한 꿈 포함), 초조 또는 불안, 구역, 진전, 흔돈, 발한, 두통, 설사, 심계항진, 감정적 불안정, 과민성, 시력장애 등의 증상이 때때로 보고되었다. 대부분의 환자에서 이러한 증상은 경증내지 중등도이지만 일부 환자에서는 그 정도가 중증일 수 있다. 이러한 이상반응들은 대개 투여 중단 후 초기 몇일 이내에 발생하지만 부주의하게 1회 복용을 놓친 일부 환자들에서 이와 같은 증상이 매우 드물게 보고되었다. 일반적으로 이러한 증상은 자기제한적이며 대개 2주 이내에 소실되지만 일부 환자에서 연장될 수 있다(2 ~ 3개월 이상).
 (2) 소아 및 청소년 : 소아 및 청소년을 대상으로 한 임상시험에서 치료 중단시 위약 투여환자의 24%에서, 이 약 투여환자의 32%에서 이상반응이 보고되었다. 이 약의 투여중지 후 최소 2% 이상의 피험자에서 발생하였고 위약에 비해 최소 2배 이상 발생한 이상반응은 다음과 같다 : 감정적 불안정(자살 생각 및 자살 시도, 감정의 기복, 울음), 신경질, 어지러움, 구역, 복통
3) 소아를 대상으로 한 임상연구에서 최소 2% 이상의 피험자에서 발생하였고 위약에 비해 최소 2배 이상 발생한 이상반응은 다음과 같다 : 식욕감소, 진전, 발한, 운동과다증, 적개심, 초조, 감정적 불안정(울음, 감정의 기복, 자해, 자살 생각 및 자살 시도 등을 포함. 자살 생각 및 자살 시도 등은 주요 우울증을 갖고 있는 청소년에 대한 임상시험에서 주로 관찰되었다.), 적개심은 주로 강박장애를 갖고 있는 소아에서 나타났으며 특히 12세 미만의 소아에서 발생하였다.
4) 단계적 감량 요법(1일 용량을 매주 10 mg/day씩 감량하여 1주에 10 mg/일 용량이 될 때까지)을 사용한 파록세틴 임상연구에서, 파록세틴의 감량기간 또는 중단시 최소 2% 이상의 피험자에서 발생하였고 위약에 비해 최소 2배 이상 발생한 이상반응은 다음과 같다 : 신경질, 어지러움, 구역, 감정적 불안정 및 복통
5) 파록세틴 일반정제의 국내 시판 후 조사결과(조사증례수 : 7,641명)
 (1) 국내 시판 후 조사 결과 보고된 이상반응(이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다) : 경직, 두통, 배뇨곤란, 배뇨장애, 부종, 성욕감소, 소화불량증, 이명, 월경부종, 신경증, 위장관장애, 조종, 체중감소, 체중증가, 피로, 흥통
 (2) 이 약 투여 전 합병증이 있거나 항불안제, 항우울제, 항정신병제 등 병용약물이 있거나 간질에가 있는 환자군에서의 이상반응 발현 증례율이 그렇지 않은 환자군에서 보다 통계적으로 유의하게 높게 나타났다.

5. 일반적 주의
 1) 발작 : 파록세틴을 복용한 환자의 0.1% 미만에서 발작이 나타났다. 환자에게 발작이 나타나는 경우에는 이 약의 투여를 중지해야 한다.
 2) 전기경련요법(ECT) : 전기경련요법과 병행하여 이 약을 투여한 임상경험은 거의 없다. 그러나 SSRI 투여 환자에서 지연된 전기경련요법-유발 발작 및 2차 발작이 드물게 보고되었다.
 3) 자살/자살관념 및 정신과 질환
 (1) 주요우울증 환자(성인, 소아)는 항우울제의 투여 여부와 관계없이 질환의 뚜렷한 호전이 있을 때까지 우울증상의 악화 및/또는 자살 충동 및 행동(자살성향), 비정상적인 행동변화의 발현을 경험할 수 있다.
 (2) 자살은 우울증 및 어떤 다른 정신과적 질환의 알려진 위험요소이며, 이러한 질환들은 그 자체가 자살의 가장 강력한 예측인자이다. 그러나 항우울제가 치료 초기 단계 동안 어떠한 환자들에 있어서는 우울증상의 악화 및 자살성향의 발현을 유도할 수도 있다는 우려가 장기간 지속되어 왔다. 항우울제(SSRI 및 기타)의 위약대조, 단기간 임상시험의 통합 분석은 이러한 약물들이 주요 우울증 및 다른 정신과적 질환을 가진 소아, 청소년 및 젊은 성인(18 ~ 24세)에서 자살 생각 및 행동(자살성향)의 위험도를 증가시킨다는 것을 나타내었다. 단기간의 연구에서는 25세 이상의 성인에서 위약과 비교하였을 때 항우울제가 자살성향 위험 증가를 나타내지 않았다. 65세 이상의 성인에서는 위약에 비해 항우울제에서 이러한 위험이 감소하였다.
 (3) 주요우울증, 강박장애 또는 다른 정신과적 질환을 가진 소아 및 청소년을 대상으로 한 위약 대조 임상시험의 통합 분석은 4,400명 이상 환자에서의 9개 항우울제에 관한 총 24건의 단기간 임상시험을 포함하였다. 주요우울증 및 다른 정신과적 질환을 가진 성인을 대상으로 한 위약 대조 임상시험 통합분석은 77,000명 이상 환자에서의 11개 항우울제에 관한 총 295건의 단기간(시험 기간의 중앙값 2개월) 임상시험을 포함하였다. 약물간에 자살성향의 위험도에 있어서는 상당한 차이가 있었으나, 연구된 대부분의 모든 약물에서 젊은 성인에서의 자살성향 증가 경향이 있었다. 다른 적응증들간에 자살성향의 절대적 위험도에 있어서 차이가 있었으며, 주요우울증에서 가장 발생수가 높았다. 그러나 위험도의 차이(항우울제 vs. 위약)는 연령층 내에서, 그리고 적응증 간에 상대적으로 안정하였다. 이러한 위험도의 차이(치료받은 환자 1,000명 당 자살성향 발생수에 있어서 항우울제-위약간의 차이)를 아래 표 1에 나타내었다.

표 1.

연령대	치료받은 환자 1,000명당 자살성향 발생수에 있어서 항우울제-위약 간의 차이
	위약에 비해 증가
<18	14예 많음
18~24	5예 많음
	위약에 비해 감소
25~64	1예 적음
≥65	6예 적음

 (4) 어떠한 소아 임상시험에서도 자살은 발생하지 않았다. 성인에서의 임상시험에서는 자살이 발생하였으나, 그 수는 자살에 대한 약물의 영향에 대해 어떤 결론을 내릴 만큼 충분하지 않았다. 자살성향의 위험이 약물의 징기간(즉, 여러 달 이상) 사용에까지 확장될 수 있는지에 대해서는 알려져 있지 않다. 그러나 우울증을 가진 성인을 대상으로 한 위약 대조의 지속적인 임상시험으로부터 항우울제의 사용이 우울증의 재발을 지연시킬 수 있다는 충분한 근거가 있다.
 (5) 모든 환자들은 이 약의 투여 기간 동안, 특히 투여 초기 혹은 용량의 변경(증량 또는 감량) 시 임상적 악화(새로운 증상의 발생 포함) 및 자살성향, 자해, 적개심 등의 발현에 대하여 관찰되어야 한다. 환자들(및 보호자들)은 환자 상태의 악화(새로운 증상의 발생 포함) 및/또는 자살성향/행동의 발현 또는 자해 생각의 모니터링 필요성 및 이러한 증상의 발현 시 의학적 지문의 필요성을 주지하여야 한다. 자살의 위험성이 회복의 초기 단계에서 증가할 수 있다는 것은 모든 항우울제 치료법의 일반적인 임상 경험이다.
 (6) 항우울제 사용 환자에서 불안, 초조, 공황 발작, 불면, 흥분, 적대감, 공격성, 충동성, 정좌불능증(정신운동성 안절부절증), 경조증, 조증이 나타날 수 있는데, 이러한 증상과 우울증 악화 및 자살 충동발현의 연관성은 확실하지 않으나 자살성향 발현의 전구증상일 수 있으므로 주의한다. 그러고 가족 및 보호자에게 이러한 증상이나 자살성향에 대해 매일 모니터링하여 증상 발현 시 즉시 의사에게 알리도록 지도한다. 특히 자살 충동또는 자살 행동의 병력이 있는 젊은 성인 환자와 투여 개시 전에 자살성향이 유의하게 나타났던 환자들은 자살 충동 또는 자살 시도의 위험성이 더 크므로 투여 기간 동안 주의 깊게 모니터링하여야 한다. 초조, 정좌불능증 또는 조증과 같은 일부 증상들의 발현은 원질환의 상태 또는 약물요법과 관련될 수 있다는 것이 인지되어야 한다.
 (7) 우울증상의 일상적인 악화(새로운 증상의 발생 포함), 자살 충동/행동의 발현 또는 우울증의 악화 및 자살성향의 전구증상일 가능성이 있는 증상(증증이기나 감작스러운 증상, 환자에게 원래 나타나 것이 아닌 증상)이 나타나면 이 약의 투여중단을 포함한 투여 계획의 변경을 고려해야 한다.
 (8) 이 약이 처방될 수 있는 다른 정신과적 상태 역시 자살적 행동의 위험 증가의 연관될 수 있다. 또한 이러한 상태는 주요우울증의 동반질환일 수 있다. 다른 정신질환을 가진 환자를 치료할 때에도 주요 우울증 환자를 치료할 때와 동일한 예방조치가 취해져야 한다.
 (9) 정좌불능증: 드물게 이 약 또는 다른 SSRIs의 투여는 불안증 및 대개 주관적 고통과 관련되어 왔거나 있거나 있을 수 없는 상태와 같은 정신운동 초조 및 안절부절증의 내적 감각의 특성을 나타내는 정좌불능증의 발생과 관련이 있다. 이는 대부분 투여 초기 몇 주 이내에 발생하는 경향이 있다.
 (10) 양극성 장애: 주요 우울삽화는 양극성 장애의 최초 징후일 수 있다. 대조 임상시험에서 증명되지는 않았으나 양극성 장애의 위험이 있는 환자에서 우울 삽화기간에 항우울제를 단독 사용 시 흔재 또는 조증 삽화를 촉진할 가능성을 증가시킬 수 있다. 따라서 항우울제 투여 전 자살, 양극성 장애 또는 우울증의 가족력을 포함한 자세한 정신과적 병력에 대해 확인하여 양극성 장애의 위험성이 있는지 적절히 선별하여야 한다. 이 약은 양극성 우울증 치료에 대한 사용은 승인되지 않았음을 주지해야 한다.
 (11) 경련: SSRIs를 포함한 일부 항우울제의 노출에 따른 경련 위험에 관한 역학 연구에서 골절과의 연관성이 보고되었다. 이 위험은 투여 도중에 발생하며, 치료 초기 단계에서 가장 크다. 이 약을 투여받고 있는 환자의 간호사 교육의 가능성이 고려되어야 한다.
 (12) 세로토닌 증후군: 동 제제를 포함한 세로토닌-노르에피네프린 재흡수 억제제 (SNRIs) 및 세로토닌 선택적 재흡수 억제제(SSRIs)를 단독으로 투여했을 뿐만 아니라 특히 다른 세로토닌 작동성 약물들(트립탄 계열 약물, 삼환계 항우울제, 펜타닐, 리튬, 트라마돌, 트리립탄, 부스피론, 세인트존스워트(St. John's Wort) 포함) 및 세로토닌 전구체 제제와 같은 약물들과 동 제제를 병용 투여하는 것이 임상적으로 유익성이 있다면 환자들은, 특히 치료개시 중 및 용량을 증가할 때, 잠재적으로 증가된 세로토닌 증후군 위험성에 대하여 인식해야 한다. 동 제제 및 세로토닌 작동성 약물들을 병용 투여했을 때 위에서 언급한 이상반응이 발생한다면 즉시 투여를 중단하고 보조적인 대증요법을 시작해야 한다.
 (13) 갑작스러운 투여 중단으로 어지러움, 수면장애, 불안 등과 같은 금단 증상을 경험할 위험이 있으므로 처방의사와의 상담 없이 환자나 보호자가 일방적으로 이 약의 투여를 중단해서는 안된다. 투여를 중단하는 경우에는 수주나 수개월에 거쳐 점진적으로 용량을 감량할 것이 권장된다.
 (14) 일상경험에 의하면 파록세틴은 인지기능이나 정신운동 기능의 손상과는 관련이 없는 것으로 나타났다. 그러나 모든 정신작용 약물과 마찬가지로 환자들에게 운전 능력이나 기계조작능력에 대한 주의를 주어야 한다.
 (15) 파록세틴의 투여로 인해 피부와 점막 출혈(반상출혈, 자반, 위장관 및 부인과 출혈 포함)이 보고되었다.

6. 상호작용
 1) MAO 억제제: 옴법 · 용량 항, 사용상의 주의사항 중 2. 다음 환자에는 투여하지 말 것 항 및 5. 일반적 주의 항을 참조한다.
 2) 알코올: 비록 이 약이 알코올에 의한 정신 및 운동 기능 손상을 증가시키지 않는다 할지라도, 이 약과 알코올의 병용은 바람직하지 않다.
 3) 세로토닌 유사약물: 옴법 · 용량 항, 사용상의 주의사항 중 2. 다음 환자에는 투여하지 말 것 항 및 5. 일반적 주의 항을 참조한다.
 4) 리튬: 리튬으로 안정된 우울증 환자를 대상으로 한 임상시험에서 이 약과 리튬 간의 약동학적 상호작용은 증명되지 않았으나, 사용경험이 제한적이므로, 이 약과 리튬을 병용 투여 시 특별한 주의를 기울여야 한다. 리튬의 농도를 모니터링하여야 한다.
 5) 약물대사효소 유도제/억제제: 이 약의 대사와 약물동태는 약물대사효소 억제제나 유도제에 의해 영향을 받을 수 있다. 예를 들어, 약물대사효소 억제제로 알려진 시메티딘은 파록세틴의 생물학적 이용률을 증가시킬 수 있다. 파록세틴을 약물대사효소 억제제와 함께 투여하는 경우에는 더 적은 용량의 투여를 고려해 보아야 한다. 약물대사 효소 유도제(카르바마제핀, 리팜피신, 페노바르비탈, 페니토인)와 함께 투여하는 경우에는 용량의 조절이 필요하지 않다. 이후의 용량 조절은 임상효과(내약성 및 유효성)에 따라 이루어져야 한다.
 6) 할로페리돌/아밀로바르비톤/옥사제팜: 한정된 수의 건강한 피험자를 대상으로 한 임상시험에서 이 약은 병용 투여한 할로페리돌, 아밀로바르비톤, 또는 옥사제팜에 의해 유발된 진정작용과 졸음을 증가시키지 않았다.
 7) 항경련제(페니토인, 카르바마제핀, 발프로산나트륨): 이 약과 페니토인의 병용 투여로 이 약의 혈중농도가 감소되고 이상반응이 증가될 수 있다. 이들 약물을 복용하고 있을 때 이 약의 초기 용량 조절은 필요하지 않고 이후 투여량은 임상효과에 따라 조절한다. 이 약을 다른 항경련제와 병용 투여할 경우 이상반응의 발생이 증가될 수 있다. 병용 투여는 간질 환자에서의 약동학 및 약력학 프로파일에 어떠한 영향을 미치지 않는 것으로 보인다.
 8) 와르파린(Warfarin)/경구용 항응고제: 이 약과 와르파린 사이의 약물동력학적 상호작용에 의해 프로트롬빈 시간이 변하지 않은 경우에도 출혈이 증가될 수 있다. 그러므로 경구용 항응고제를 복용하는 환자에게는 이 약을 매우 신중히 투여해야 한다.
 9) 프로시클리딘: 이 약을 매일 복용하면 프로시클리딘의 혈장 농도가 유의성 있게 증가된다. 만약 항콜린 효과가 나타나면 프로시클리딘의 용량을 감소하여야 한다.
 10) CYP2D6에 의해 대사되는 약물: 다른 SSRIs를 포함한 다른 항우울제와 마찬가지로 이 약은 간의 CYP450 효소 CYP2D6를 저해하므로 이 효소에 의해 대사되는 삼환계 항우울제(이미프라민류, 노르트리틸린, 이미프라민, 데시프라민, 클로미프라민), 페노티아진계 신경이완제(페르페나진, 티오리다진), 리스페리돈, 아토목세틴, type 1C 항부정맥제(프로파페논, 플레카이니드), 베타 아드레날린성 차단제인 메토프로롤과 병용 시 이 약물들의 혈중농도가 증가할 수 있다. 특히, 이 약은 티오리다진의 혈장 농도를 높일 수 있으므로, 티오리다진과 함께 투여하서는 안된다. 티오리다진의 단독 투여는 토르사드 드 포인트(torsades de points)와 같은 심각한 심실 부정맥과 관련된 QT간격 연장 또는 돌연사를 유발할 수 있다. 또한, 단회 저용량 피모지드(2mg)를 이 약과 병용 투여한 연구에서 피모지드의 농도 증가가 관찰되었다. 이는 알려진 파록세틴의 CYP2D6 억제 특성에 의한 것이다. 피모지드의 좁은 치료지수 및 QT 간격 연장 유발 가능성으로 인해, 이 약은 피모지드와 병용 투여해서는 안된다.
 11) CYP3A4에 의해 대사되는 약물: 파록세틴과 CYP3A4의 기질인 테르페나딘의 항정상태에서의 병용 투여와 관련된 in vivo 상호작용 연구에서 파록세틴이 테르페나딘의 약동학에 영향을 주지 않는다는 것이 증명되었다. 유사한 in vivo 상호작용 연구에서는 파록세틴이 알프라졸람의 약동학에 영향을 주지 않으며, 알프라졸람도 파록세틴의 약동학에 영향을 주지 않는다는 것이 증명되었다. 따라서 파록세틴과 테르페나딘, 알프라졸람 및 CYP3A4의 기질인 다른 약물들의 병용 투여가 위험을 초래할 것으로 예상되지 않는다.
 12) 음식/제산제/디곡신/프로프라논롤: 음식물, 제산제, 디곡신 및 프로프라논롤은 이 약의 흡수와 약동학에 영향을 미치지 않거나 (투여 용량 계획에서의 변화를 초래하지 않는 정도로) 미약한 영향을 미치는 것으로 나타났다.
 13) 포샘프레나비어/리토나비어: 이 약과 포샘프레나비어/리토나비어의 병용 투여는 이 약의 혈장 농도를 유의하게 감소시켰다. 용량 조절은 임상 효과(내약성 및 유효성)에 따라 이루어져야 한다.
 14) 티목시콘은 CYP2D6에 의해 종요한 활성 대사체인 엔독시펜으로 대사되며, 엔독시펜은 티목시콘의 유효성에 유의하게 기여한다. 파록세틴에 의한 CYP2D6의 비가역적 억제는 엔독시펜의 혈장 농도 감소를 유발한다. 티목시콘을 투여할 때에는, CYP2D6 억제 작용이 없거나 적은 항우울제로의 대체 투여를 고려해야 한