

입속 질환엔~

이바파 정



【원료약품 및 분량】 1정 중

유효성분: L-시스테인(LP)	40mg
d-비오틴(USP)	165ug
니코틴아미드(KP)	20mg
비타민B12(비타민B12(KP))	6.68mg
아스코르브산(KP)	30mg
피리독신염산염(KP)	33.33mg

첨가제(동물유래성분): 무수우유(소, 우유)

기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 합성아산화규소, 맵실드분홍색(29P772), 맵실드분홍색(93V280)

【성 상】 분홍색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

○ 다음 경우의 비타민 B2, B6, C 보충

- 육류피로
- 임신 수유기
- 병중 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

○ 다음 증상의 완화

- 구각염(입교각염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 습진, 피부염

【용법·용량】

만 8세 이상 어린이 및 성인: 1회 1정, 1일 3회 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 3) 콩 또는 병중에 과민증이 있는 환자
- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

- 1) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고지단백혈증, 당뇨병성 고지단백혈증 및 혈장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 성당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
: 구역, 식욕부진, 복부(배부)팽만감
- 2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 3) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 4) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 용량을 잘 지킬 것
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 정검할 것을 권장한다. 이 정검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정중용 지질제를 동시에 투여하고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 포장단위 20정/피티파(10정/피티파x2), 100정/피티파(10정/피티파x2x5), 200정/피티파(10정/피티파x2x10)

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

- 올바른 복용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우는 의사·약사와 상담하십시오.
- 본 의약품은 '우수의약품제조관리기준(KGMP)'에 따라 엄격하게 품질관리를 실시한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 제품은 구입한 장소에서 교환하여 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- 의약품을 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다.
- 기타 자세한 사항이나 문의의 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 소비자 상담실(070-8822-7755)로 문의하시기 바랍니다.
- 이 설명서 작성(개정)일 이후 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

【제조자】 (주)시어스제약 / 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 32

(주)시어스제약