

리버플로우연질캡슐

(멀크시슬열매건조엑스)

멀크시슬열매건조엑스 350 mg(실리마린으로서 196 mg)

일반의약품

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고,
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1,140mg) 중

유효성분 : 멀크시슬열매건조엑스(생규)(실리마린으로서 196mg) 350.000mg

첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 비결정성소르비톨 액, 산화티탄, 아자경화유, 에틸바닐린, 젤라틴, 치자청색소, 붕기름, 황남

[성상] 황갈색의 유상 내용물을 함유한 파란색의 장방형 연질캡슐

[용법용량]

1일 1회, 1회 1캡슐

[효능효과]

다음 질환의 보조치료: 독성간질환, 만성간염, 간경변

[포장단위] 60캡슐(10캡슐/PTP*6), 120캡슐((10캡슐/PTP*6)*2)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[소비자상담실] 031-662-1395

[판매원] (주)셀로맥스(경기도 용인시 기흥구 구성로 357 용인테크노밸리 D동 710호)

[제조회자] 경방신약(주)(인천광역시 남동구 남동대로 394)

[제조자] (주)알피바이오(경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7)

※ 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 주의해 주십시오

※ 구입시 유효기간 또는 사용기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 심한 담도(담관, 쓸개길) 폐쇄 환자
- 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 임신, 수유부
- 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것

- 1) 드물게 위통 또는 설사
- 2) 알레르기 반응

4. 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아)보관할 것
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

설명서 작성일자 : 2021.09.13

개정번호 : 2109-01