

제산성분 함유 듀얼액션 위장약

듀얼파모정

[제품명] 듀얼파모정

[원료약품 및 분량] 1정 중

- 유효성분: 파모티딘(USP) 10mg, 수산화마그네슘(KP) 165mg, 침강탄산칼슘(KP) 800mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)
- 첨가제(타르색소): 청색1호, 청색2호, 황색203호
- 기타첨가제: 스테아르산마그네슘, 오파드라이 녹색(03B41083), 옥수수전분, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 클로라이드형 이산화규소

[성상] 연두색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과] 위산과다 및 속쓰림과 관련된 가슴앓이의 경감

[용법·용량] 성인 및 만 15세 이상의 환자: 이 약 1일 1회 1정을 복용한다. 24시간 안에 2정 이상을 복용하지 마십시오.

※ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 2) 이 성분 및 다른 H2 수용체 길항제(대항제)에 과민증이 있는 경우 사용하지 말 것
- 3) 복용에 어려움을 느낀다면 사용하지 말 것

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 원인 불명의 체중 감소가 있는 환자: 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다.
- 2) 복통(배앓음)이 지속되고 있는 환자: 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다.
- 3) 신장(콩팥) 질환자: 혈중 칼슘 농도를 측정할 것
- 4) 다른 약제를 복용중인 환자는 이 약을 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것
제산제는 다른 처방약물과 상호작용을 일으킬 수 있다.

3. 부작용

- 1) 과민증: 드물게 아나필락시스 반응이 나타날 수 있다.
- 2) 간장: 드물게 효소이상이나 나타날 수 있다.
- 3) 소화기: 때때로 구역과 설사가 나타날 수 있고, 드물게 변비, 식욕부진, 복부불쾌감, 고창, 구토, 구갈 등이 나타나는 경우가 있다.
- 4) 피부: 드물게 발진, 가려움증, 담마진(두드러기)이 나타날 수 있고, 예외적으로 다른 히스 타민-H₂ 길항제와 마찬가지로 표피박리가 나타날 수 있다.
- 5) 기타: 때때로 두통이 나타날 수 있고, 드물게 피로, 황달, 간염, 맥관신경증상 부종, 관절통, 근육경련 등이 나타날 수 있다.

4. 일반적주의

- 1) 2주간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것
- 2) 2주간을 초과하여 연용(계속 복용)하지 말 것
- 3) 정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것
- 4) 혈액투석환자에게 이 약과 인산염 결합체를 병용할 경우 탄산칼슘 효능 손실 위험이 발생할 수 있다.

5. 상호작용

- 1) 본제(이 약)에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용을 일으킬 수 있다.
: 아테놀롤, 메토프로롤, 프로프라놀롤, 클로로린, 싸이클린계 항생제, 디클루니살, 디곡신, 이인산염, 펙소페나딘, 철(염), 플루오르퀴놀론계 항생제, 불화나트륨, 글 루코코르티코이드, 인도메타신, 케토코나졸, 란소프라졸, 페노치아젠계 항천간제, 페니실라민, 인산염, 티록신(약물의 소화 흡수 감소) 등과 병용시에는 가능한 2시간 이상의 간격을 두고 투여한다.
- 살리실산: 노의 알칼리화로 살리실산의 신 배설이 증가된다.
- 2) 본제(이 약)를 다른 위장약과 병용하지 마십시오: 본제(이 약)를 다른 위장약과 병용하면 작용이 강하게 발현되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있다.

6. 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에 대한 투여
동물 실험에서 수산화 마그네슘의 사용과 기형과의 연구는 실시되지 않았고, 파 모티딘 투여의 사용으로 기형이 유발되었다는 보고는 없었다. 과량 투여와 탄산 칼슘의 연용(계속 복용)으로 골화이상이나 보고되었고, 이 성분에 계속 노출된 임신부에 있어서 모든 위험을 배제하지는 못하므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부 인에게 투여하지 않는 것이 좋다.
- 2) 수유부에 대한 투여
히스타민-H₂길항제는 모유중으로 이행된다. 수유부를 통하여 소아가 섭취하는 약 물량은 1% 정도로 낮고, 약동학적 자료 들은 이를 뒷받침한다. 그러나 수유부의 복 용과 관련된 소아의 내성은 장기치료와 복용량이 증가하는 경우에 대해서는 알려 지지 않았으므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 좋다.

7. 소아에 대한 투여: 15세 미만의 소아에게 투여 시 의사와 상의할 것.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선이나, 고온을 피하고, 습기가 적고 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호, 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것

[포장단위] 100정/병, 10정/피티피(10정/PTPX1), 20정/피티피(10정/PTPX2)

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 의약품은 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 피해를 보상해드립니다.

※ 영 유아의 손에 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

※ 본 내용은 최신 정보 및 허가 정보의 변경에 따라 계속 수정됩니다. 작성일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 클로버서비스(080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

[소비자상담실] 080-024-0030(수신자 부담 클로버서비스)

[제조회사] 광동제약(주) 경기도 평택시 산단로 114

[제조자1] (주)인트로바이오파마 경기도 평택시 서탄면 마두길 104-12

[제조자2] (주)한국파비스제약 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 127

[작성일] 2021.07.13