

뉴먼트 엠지파워 연질캡슐

마그네슘 500mg 함유 (1일 복용량) 근육경련·혈액순환 개선제



근육경련 어깨·목결림 수족냉증 말초혈행장애

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(1,740mg) 중

- 유효성분 : 산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 250mg) 414.53mg, 토코페롤아세테이트(KP)(비타민E로서 500IU) 500.00mg
- 첨가제(타르색소) : 적색 40호, 황색5호, 청색1호
- 기타 첨가제 : 공기름, 황납, 레시틴, 폴리소르베이트80, 숙신산젤라틴, 농글리세린, 산화티탄

【성상】 유백색의 유상 내용물을 함유한 적갈색의 장방형 연질캡슐

【용법 용량】 만 12세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐

【효능 효과】

1. 다음 경우의 비타민 E의 보급

- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)

2. 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 심한 증상의 신부전 환자
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

인산염, 칼슘염, 경구(먹는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 5) 신장(콩팥)장애 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 임부
- 8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 제2형(이차)당뇨 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 9) 이 약은 황색5호(산셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예정보다 빨리지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.

- 3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 5) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여(함께 복용)시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 6) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자가 이 약을 복용할 때 혈장지질치를 검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 복용을 적절히 조절해야 한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 60캡슐/상자(10캡슐/PTP×6), 120캡슐/상자((10캡슐/PTP×6)×2)

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【소비자상담실】 (고객만족팀) 1588-2675 / 080-090-6777(수신자부담)

- ※ 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- ※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 주의해 주십시오.
- ※ 구입시 유효기간 또는 사용기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

설명서 작성일자 : 2021.08.23

※ 위 일자는 설명서 작성일자로 사용기한과 관련이 없습니다

판매원

JW 중외제약

충청남도 당진시 송악읍 한진길 56

제조원

Rp Bio 알피 바이오

경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7