



※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

원료약품 및 그 분량 : 1정(1.080 mg) 중

▶ 유효성분

진피(KP)	11.0 mg
육계(KP)	46.0 mg
화행(KP)	12.0 mg
육두구(KP)	10.0 mg
정행(KP)	6.0 mg
견티아닌(KP)	7.5 mg
고목(KP)	7.5 mg
탄산수소나트륨(KP)	312.5 mg
침강탄산칼슘(KP)	66.5 mg
탄산마그네슘(KP) (산화마그네슘으로서 5.46 mg)	13.0 mg
합성규산알루미늄(KP)	136.7 mg
디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제2000 III(KP)	20.0 mg
▶ 동물유래성분 : 유당수화물(소 / 우유)	
▶ 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, L-멘톨, 산하티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스, 물엿	

성상 : 백색의 정방형 필름코팅정

효능 · 효과 : 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체할, 구역, 구토, 위통, 신트림, 식욕감퇴(식욕부진), 소화불량, 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

용법 · 용량 : 만 15세 이상 : 1회 2정 / 1일 3회 식후 30분에 복용(사용)한다.

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

- 1) 투석요법을 받고 있는 환자
- 2) 만 7세 이하의 어린이
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 테트라사이클린계 항생제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 신장(콩팥)장애 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
- 2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것
- 3) 나트륨 제한 식이를 하는 사람

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

사용기간 : 제조일로부터 36개월

포장단위 : 10정 / PTP

제조사 : 한솔신약(주) / 충청북도 음성군 금왕읍 청평길 2-11

제조외화자 : 원광제약(주) / 전라북도 익산시 춘포면 석암로 11길 165

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다. ※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 소비자상담실 080-359-3333 으로 문의 하시기나 또는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다. ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)