

※ 이 문서는 이 약을 사용할 시에 필요한 주의사항을 기재한 것으로 이 약과 같이 보관하십시오.

비만, 부종
러너스^정
(방기홍기탕건조엑스)

우수의약품제조관리기준
KGMP적격지정업체
일반의약품



【성분·함량】1정 중

- 유효성분:방기(KP)..... 418mg, 황기(KP)..... 418mg, 백출(KP)..... 250mg,
생강(생규)..... 250mg, 대추(KP)..... 333mg, 감초(KP)..... 168mg
(건조엑스로서 244mg)

■첨가제(타르색소):청색1호, 황색4호

- 첨가제:경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스
칼슘, 크로스포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

【성 상】녹색의 원형 필름코팅정제

- 【효능·효과】살색이 희고, 피로하기 쉬우며, 땀이 잘 나는 경향이 있는 다음 증상
: 비만(근육에 긴장감이 없고 물살짐), 관절통, 부종(부기)

【용법·용량】보통 성인 1회 4정을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 - 1) 고혈압 환자
 - 2) 심장대 또는 신장에(신장장애) 환자
 - 3) 부종(부기) 환자
 - 4) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
 - 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
 - 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임신중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌, 우돌다)한다고 판단되는 경우에만 투여할 것.)
 - 7) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.))
 - 8) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
 - 9) 이 약은 황색4호(타르트라진, Tartrazine)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - (1) 위압도스테론증 : 요양이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위압도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰혈청칼륨치의 측정을 충분히 하고 이상이

- 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
- (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- (3) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
- (4) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감
- (5) 간질성 폐렴 : 발열, 기침, 숨찬, 호흡곤란, 폐음이상(염발음, 捻髮音) 등이 나타난 경우에는 이 약의 복용을 중지하고, 신속히 흉부X선 등의 검사를 실시함과 동시에 부신피질호르몬제 투여 등 적절한 처치를 받을 것.
- (6) 간기능장애, 황달 : AST, ALT, ALP, γ -GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애, 전신의 나른함, 황달(따부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 이상이 확인된 경우 복용을 중지할 것.
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
3. 기타 이 약의 복용(사용시) 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것(감초를 함유하는 제제를 장기간 복용할 경우 혈청 칼륨치나 혈압측정 등을 충분히 하고, 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.).
 - 3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루르게 이노제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 타이디드제 이노제(트리클로르메타이디드)와 병용(함께 복용(사용시) 위임도, 스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
 - 4) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.
4. 저장상의 주의사항
 - 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
 - 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

- 【포장단위】 360정 【사용기한】 제조일로부터 36개월 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
- 【제조외파자】 (주)테라젠이텍스 / 경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58
- 【제조자】 (주)아이월드제약 / 인천광역시 남동구 함박로로 316 17B-2L
- 【판매자】 (주)에드바이오 / 경기도 김포시 고촌읍 아라육로 80, 204호(WJ 물류센터)



- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서(설명서)를 주의 깊게 읽어야 하며, 이 첨부문서(설명서)를 의약품과 함께 보관하십시오
- ※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
- ※ 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정 거래위원회 고사(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr/>)의 의약품 정보를 참조하십시오.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원(의약품유해사례 보고에 알려주시기 바랍니다).
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)
- ※ 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 023463-7111이나 www.etexpharm.co.kr에서 확인할 수 있습니다.