

효과빠른 복합소화제 스피자임S정

시메티콘



【원료약품 및 그 분량】1정 중

- 유효성분 : 판크레아틴(KP) 175.00mg
(전분당화력 1,654단위 이상, 지방소화력 677단위 이상, 단백소화력 22,365단위 이상),
(기원동물 : 돼지, 사용부위 : 이자(췌장))
- 셀룰라제(KP) 50.00mg
(섬유소당화력 60단위 이상)
- 우담즙건조엑스(생규) 25.00mg
(콜산으로서 11.25mg)
- 시메티콘(KP) 26.00mg
- 첨가제(타르색소) : 황색 203호, 청색 1호
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타 첨가제 : 히드록시프로필셀룰로오스, 미결정셀룰로오스, 이산화규소, 전분글리콜산나트륨,
크로스카멜로오스나트륨, 스테아르산마그네슘, 탭실드 녹색(319G726)

【성상】

연녹색의 타원형 장용성 필름코팅정

【효능·효과】

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체합, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

【용법·용량】

- 1일 3회 식후에 복용한다.
- 만 15세 이상 : 1회 2정
 - 만 8세 이상~만 15세 미만 : 1회 1정

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 만 7세 이하의 어린이
 - 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
 - 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 투여할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】

밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】

10정, 20정, 100정, 200정

【취급상의 주의사항】

- ※ 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서 개정일자(2021년 08월 17일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 본 제품 사용으로 인한 부작용 피해구제 신청은 한국약품안전관리원(T.14-3330(상담) 또는 1644-6223(신고 및 상담))에서 할 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

【제조회사】

에이프론헌제약(주) / 경기도 화성시 양감면 두머리길 16

【제조자】

(주)노비엠헌스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

【판매자】

(주)대웅생명과학 / 서울시 송파구 삼전로 42