전문의약품

셀파엠정 10밀리그램 25밀리그램 (엠파글리플로진)

CELLPAEM Tab. 10mg 25mg (Empagliflozin)

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
※ 의약품을 사용하는 동안에는 정부로부터 지시받은 사항을 준수하시기 바랍니다.
※ 제품의 안정성을 위해 반드시 복용시까지 포장상태를 유지하여 주시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- **셀파엠정 10밀리그램(엠파글리플로진)**
  유효성분 : 엠파글리플로진(별규) ····· 10mg
  동물유래성분: 유당수화물(소, 우유)
  기타첨가제 : D-만니톨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드리이에제(03828796), 콜로이드성이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 황색산화철, 히드록시프로필셀룰로오스
- **셀파엠정 25밀리그램(엠파글리플로진)**
  유효성분 : 엠파글리플로진(별규) ····· 25mg
  동물유래성분: 유당수화물(소, 우유)
  기타첨가제 : D-만니톨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드리이에제(03828796), 콜로이드성 이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 황색산화철, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】

- **셀파엠정 10밀리그램(엠파글리플로진)** : 연한 노란색의 원형 필름코팅정
- **셀파엠정 25밀리그램(엠파글리플로진)** : 연한 노란색의 타원형 필름코팅정

【효능 · 효과】

이 약은 성인 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여한다.
- 단독요법 -병용요법

혈당이 충분히 조절되지 않는 제2형 당뇨병 환자중 심혈관계 질환이 확인된 환자에서 심혈관계 사건 발생에 대한 영향은 사용상의 주의사항 10. 전문가를 위한 정보 2) 임상시험 정보 항을 참고한다.

【용법 · 용량】

이 약의 권장용량은 단독요법 및 인슐린 등 다른 혈당 강하제와의 추가 병용요법에 대하여 1일 1회 10mg이다. 더 약 10mg에 내약성이 우수하면서 추가적인 혈당조절이 필요한 경우, 이 약 용량을 1일 1회 25mg으로 증량할 수 있다.
이 약과 설포닐우레아 또는 인슐린을 병용투여시에는 저혈당 발생의 위험을 감소시키기 위해 설포닐우레아 또는 인슐린의 용량감소를 고려할 수 있다(사용상의 주의사항 3.이상반응 항 참고). 이 약은 식사와 관계없이 투여할 수 있다. 정제는 통째로 삼켜서 복용한다. 이 약의 복용을 잊었을 때에는 생각나는 즉시 복용한다. 하루에 두 배의 용량을 복용하지 않는다.
특수집단

- **신장애 환자**
  경증의 신장애 환자에 대한 용량 조절은 필요하지 않다. 사구체 여과율(eGFR)이 60 ml/min/1.73㎡미만인 환자및도 CrCl 〈 60ml/min)에게 이 약으로 치료를 시작하서는 안된다. 이 약에 내약성이 우수한 환자 중 사구체 여과율이 계속적으로 60ml/min/1.73㎡미만인 환자및도 CrCl (60 ml/min)는 이 약의 용량을 1일 1회 10mg으로 조절하거나 중지하여야 한다. 사구체 여과율이 45ml/min/1.73㎡미만 환자및도 CrCl (45 ml/min)으로 감소하는 경우 이 약을 중단해야 한다. 말기 신질환(ESRD) 또는 투석 중인 환자에서는 이약의 유효성이 기대되지 않으므로 이 약을 사용하지 않는다.
- **간장애 환자**
  경증 또는 중등증의 간장애 환자에 대한 용량 조절은 필요하지 않다. 중증의 간장애 환자에 대하여 연구되지 않았으므로, 이 약의 사용이 권장되지 않는다.
- **고령자**
  연령에 따른 용량조절은 필요하지 않다. 75세 이상의 환자는 신장 기능과 체액량 감소 위험을 고려해야 한다. 85세 이상의 고령자에서의 임상 경험이 제한적이므로, 이 약의 투여를 시작하는 것은 권장되지 않는다(사용상의 주의사항 4. 일반적 주의사항 참고).

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 1) 이 약의 주성분 및 구성성분에 과민반응이 있는 환자
 2) 제1형 당뇨병 또는 당뇨병성 케톤산증 환자
 3) 사구체 여과율 (eGFR)이 30 mL/min/1.73㎡미만인 환자. 말기 신질환(end stage renal disease) 또는 투석 중인 환자
 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 1) 신장애 환자
  사구체 여과율(eGFR)이 60 ml/min/1.73㎡ 미만인 환자및도 CrCl (60 ml/min)에게 이 약으로 치료를 시작해서는 안된다. 이 약에 내약성이 우수한 환자 중 사구체 여과율이 계속적으로 60 ml/min/1.73㎡ 미만인 환자및도 CrCl (60 ml/min)는 이 약의 용량을 1일 1회 10 mg으로 조절하거나 유지하여야 한다. 사구체 여과율이 계속적으로 45 mL/min/1.73㎡ 미만및도 CrCl (45 ml/min) 감수에는 이 약을 중단해야 한다.
  말기 신질환(ESRD) 또는 투석 중인 환자에서는 이 약의 유효성이 기대되지 않으므로 이 약을 사용하지 않는다.
  신기능 모니터링
  이 약의 유효성은 저장기전으로 인해 신기능에 의존적이다. 따라서 다음의 신기능 모니터링이 권장 된다:
  – 이 약 투여를 시작 전 및 투여 이후 정기적으로 (1년에 1회 이상)
  – 신기능을 감소시킬 수 있는 병용 약제들의 투여 전
 2) 심부전
  NYHA class I-III에서의 경험은 제한적이므로, 이들 환자에서는 신중히 사용하여야 한다. NYHA class III-IV에 대한 이 약의 임상시험 경험이 없기 때문에 이 약의 사용이 권장되지 않는다.
 3) 인슐린 및 설포닐우레아와 같은 인슐린 분비 촉진제는 저혈당을 일으킬 수 있다. 따라서, 이 약과 병용시 저혈당의 위험을 줄이기 위해, 인슐린 또는 인슐린 분비 촉진제의 용량을 줄여야 할 수 있다.

3. 이상반응
 1) 인전성 프로파일의 요약
  제 2형 당뇨 환자 15,582명을 대상으로 이 약의 안전성이 평가되었다. 이 약을 단독요법 또는 메트포르민, 설포닐우레아, 피오글리타존+메트포르민, 리나글립틴+메트포르민이오 투여하겠을 때 저혈당 발생 빈도는 이 약군과 위약군에서 유사하였다. 이 약을 메트포르민+설포닐우레아 또는 인슐린+메트포르민+설포닐우레아와 병용하였을 때 위약군에 비해 이 약군에서 주요한 저혈당의 발생 빈도가 높았다.
  주요한 저혈당 (처치가 필요한 사건)
  이 약을 단독요법 또는 추가 병용요법(메트포르민+설포닐우레아, 피오글리타존+메트포르민, 리나글립틴+메트포르민이오로 투여하였을 때 주요한 저혈당의 발생 빈도는 위약에 비해 이 약군에서 주요한 저혈당의 발생 빈도가 높았다.
  표 2 2 임상시험 및 효능효과 별로 확인된 저혈당의 발생 빈도 (1245, 19, 1245.20, 1245.23$_{met}$, 1245.23$_{met+SU}$, 1245.33, 1245.49, 1273.9$_{met+ins}$), 1245.25 – TS')

투여군	위약	이 약 10 mg	이 약 25 mg
단독투여 (1245.20) (24주)			
N	229	224	223
저혈당(%)	0.4%	0.4%	0.4%
주요한 저혈당(%)	0%	0%	0%
메트포르민 병용 (1245.23$_{met}$) (24주)			
N	206	217	214
저혈당(%)	0.5%	1.8%	1.4%
주요한 저혈당(%)	0%	0%	0%
메트포르민 + 설포닐우레아 병용 (1245.23$_{met+SU}$) (24주)			
N	225	224	217
저혈당(%)	8.4%	16.1%	11.5%
주요한 저혈당(%)	0%	0%	0%
피오글리타존+/–메트포르민 병용 (1245.19) (24주)			
N	165	165	168
저혈당(%)	1.8%	1.2%	2.4%
주요한 저혈당(%)	0%	0%	0%
기저 인슐린+/–메트포르민+/–설포닐우레아 병용(1245.33) (18weeks[2] / 78 weeks)			
N	170	169	155
저혈당(%)	20.6% / 36.3%	19.5% / 36.1%	28.4% / 36.1%
주요한 저혈당(%)	0% / 0%	0% / 0%	1.3% / 1.3%
MDI 인슐린 +/–메트포르민 병용 (1245.49) (18주[2] / 52 주)			
N	188	186	189
저혈당(%)	37.2% / 58.0%	36.8% / 51.1%	41.3% / 57.7%
주요한 저혈당(%)	0.5% / 1.6%	0.5% / 1.6%	0.5% / 0.5%
메트포르민 + 리나글립틴 병용 (1275.9)(24주)[3]			
N	110	112	110
저혈당(%)	0.9%	0.0%	2.7%
주요한 저혈당(%)	0%	0%	0.9%
EMPA-REG OUTCOME 임상연구 (1245.25)			
N	2333	2345	2342
저혈당(%)	27.9%	28%	27.6%
주요한 저혈당(%)	1.5%	1.4%	1.3%

확인된 저혈당 : 혈당 ≤ 70mg/dL 또는 처치가 필요함
주요한 저혈당 : 처치가 필요한 저혈당
[1]최 이상 임상시험약을 투여받은 환자 수
[2]인슐린 기저요법 용량은 초기 18주 동안 안정화되었다.
[3]메트포르민 기저요법에 엠파글리플로진+리나글립틴 5 mg 고정용량 복합제가 투여되었다.

 2) 질요실금(긴박뇨, 요빈무절금, 자두염 및 기타 생식기 감염
  질요실금(긴박뇨, 요빈무절금, 자두염 및 기타 생식기 감염은 위약과 비교하여 이 약에서 빈번하게 보고되었다 (이 약 10 mg 4.0%, 이 약 25 mg 3.9%, 위약 1.0%). 여성에서는 위약에 비해 이 약에서 빈번하게 보고된 반면, 남성에서는 그 차이가 크지 않았다. 생식기 감염은 경증 내지 중등도이었다.
 3) 체뇨 증가
  체뇨 증가빈도, 다뇨, 또는 야간뇨 표함가 위약에 비해서 이 약에서 빈번하게 보고되었다 (이 약 10 mg 3.5%, 이 약 25 mg 3.3%, 위약 1.4%). 체뇨 증가의 정도는 대부분 경증 내지 중등도이었다. 야간뇨의 빈도는 이 약군과 위약군에서 유사하였다 (각 1%).
 4) 요로감염
  요로감염의 발생빈도는 전반적으로 이 약 25 mg군과 위약군에서 유사하였고, 이 약 10 mg군에서 높았다 (이 약 10 mg 8.8%, 이 약 25 mg 7.0%, 위약 7.2%). 위약과 유사하게 이 약에서도 만성 또는 재발성 요로감염의 과거 병력이 있는 환자에서 요로감염이 빈번하게 보고되었다. 요로 감염의 정도(경증, 중등도, 중증도)는 이 약군과 위약군에서 유사하였다. 요로 감염은 여성에서는 위약군에 비해 이 약군에서 빈번하게 보고되었다; 남성에서는 차이가 없었다.
 5) 체액량 손실
  체액량 손실 (활동시 혈압강소, 수축기혈압강소, 탈수, 저혈압, 혈액량감소, 기립성저혈압, 또는 실신 포함)의 발생빈도는 전반적으로 이 약군과 위약군에서 유사하였다 (이 약 10 mg 0.6%, 이 약 25 mg 0.4%, 위약 0.3%). 체액량 손실 이벤트의 빈도는 75세 이상의 환자에서 위약군에 비해서 이 약군에서 높았다 (이 약 10 mg 2.3%, 이 약 25 mg 4.3%, 위약 2.1%).
 6) 혈중 크레아티닌 증가 및 사구체 여과율 감소
  혈중 크레아티닌 증가 및 사구체 여과율 감소의 전반적인 발생빈도는 이 약군 및 위약군에서 유사하였다 (혈중 크레아티닌 증가: 이 약 10 mg 0.6%, 이 약 25 mg 0.1%, 위약 0.5%; 사구체 여과율 감소: 이 약 10 mg 0.1%, 이 약 25 mg 0%, 위약 0.3%).
  이러한 변화는 치료가 지속되는 동안 일시적이거나 이 약 투여가 중단된 이후 대체로 가역적이었다.
 4) 시판 후 조사
  다음은 이 약의 시판 후 추가로 확인된 약물이상반응이다. 이 약물이상반응은 불특성 다수의 인구집단에서 자발적으로 보고된 것으로서, 발생빈도를 신뢰성 있게 추정하거나 이 약 투여가 중단된 이후 대체로 가역적이었다.
  – 저트사증/당뇨병성 케톤산증 포함) – 요로성폐혈증 및 신우신염 – 발진
  – 두드러기 – 혈관부종 – 쇠약무 피로

4. 일반적 주의
 1) 케톤산증
  시판 후 조사에서 이 약을 포함한 SGLT2 저해제로 치료받은 제 1형과 제 2형 당뇨병 환자에서 선속한 입원을 필요로 하는 중대한 생명을 위협하는 케톤산증 보고가 확인되었다. 이 약으로 치료받은 환자에게서 케톤산증과 관련하여 처방자 사례가 보고된 바 있다. 이 약은 제 1형 당뇨병 치료제 하기되지 않았다.
  혈당수치가 250mg/dL 보다 낮더라도, 이 약과 관련된 케톤산증은 발생할 수 있으므로, 이 약으로 치료한 환자에서 중증의 대사성 산증에 일치하는 징후와 증상(과 관련되는 경우 혈당 수치와 관계없이 케톤산증 검사를 실시해야 한다. 만약 케톤산증이 의심되는 경우, 이 약의 치료를 중단하고 환자의 상태를 평가하고, 즉각적인 조치를 시작해야 한다.
  케톤산증의 치료는 인슐린 제제, 그리고 탄수화물 보충을 필요로 할 수 있다.
  케톤산증의 중상과 징후는 탈수 및 중증의 대사성 산증과 일치하고 오심, 구토, 식욕감소, 복통, 권태, 호흡곤란 등을 포함한다. 일부 보고에서 케톤산증을 일으키기 쉬운 요인으로 인슐린 용량 감소, 급성 열성질환, 질병 또는 수술로 인한 칼로리 섭취 제한, 케톤 생성 식이요법, 인슐린 결핍을 일으키는 췌장장애에게; 제1형 및 2형 당뇨병, 췌장염 또는 췌장 수술 병력), 그리고 알코올 남용이 확인되었다.
  이 약의 투여를 시작하기 전 인슐린 분비 감소, 칼로리 제한, 알코올 남용을 포함한 케톤산증을 일으키기 쉬운 요인이 있는지 고려해야 한다. 이 약으로 치료받는 환자에서 케톤산증이 발생하는지 모니터링하고, 케톤산증을 일으키기 쉬운 임상적 상황에: 금식 질환 또는 수술로 인한 장기적인 단식이 발생할 경우 이 약의 투여를 일시적으로 중단하는 것을 고려한다. 케톤산증을 일으키기 쉬운 임상적 상황에서는, 이 약의 치료를 일시적으로 중단한 경우에도 케톤체 대한 모니터링을 고려한다.
 2) 간 손상
  임상시험 중 이 약에서 간손상이 보고되었다. 이 약과 간손상간의 인과관계는 확립되지 않았다.
 3) 고령 환자
  노 중 포도당 배설에 대한 이 약의 영향은 체내 수분 상태에 영향을 줄 수 있는 생투압상 이노와 연관되어 있다. 75세 이상 환자는 체액량 손실의 위험이 더 높을 수 있다. 위약에 비해 이 약을 투여받은 환자에서 체액량 손실과 관련된 이상반응이 높게 발생하였다 (3. 이상반응 항 참고).
  85세 이상의 고령자에서의 임상 경험이 제한적이므로, 이 약의 투여를 시작하는 것이 권장되지 않는다.
 4) 체액량 손실의 위험이 있는 환자
  SGLT-2 저해제의 작용기전에 따라 치료적으로 포도당노에 등반되는 삼투압성 이노는 약간의 혈압강하를 유발할 수 있다. 따라서 임상적 신뢰성과 질환자, 저혈압 기왕이 있는 참고할인 치료 중인 환자 또는 75세 이상의 환자와 같은 엠파글리플로진-오도 혈압강하의 위험이 있는 환자에게는 신중히 투여하여야 한다.
  체액량 손실을 유발할 수 있는 상황에를 들어, 위장관계 질병에서 엠파글리플로진을 투여할 때에는 신체검사, 혈압측정, 체마트크리트를 포함한 실험실적 검사 등을 통해 체액 상태 및 전해질을 주의깊게 관찰하는 것이 권장된다. 체액량 손실이 교정될 때까지 이 약 투여를 일시적으로 중단하는 것이 고려되어야 한다.
 5) 요로생혈혈증과 신우신염
  이 약 및 다른 SGLT2 저해제를 사용한 환자에서 요로생혈혈증과 신우신염을 포함하는 중대한 요로 감염이 시판 후 보고된 바 있다. SGLT2 저해제 오빈은 요로 감염의 위험을 증가시킨다. 필요한 경우 환자의 요로 감염 징후와 증상을 평가하여 신속히 치료한다.
 6) 생식기 진균감염
  이 약은 생식기 진균감염의 위험을 증가시킨다. 생식기 진균감염 병력이 있는 환자들은 생식기 진균 감염이 더 발생하기 쉬다. 적절히 관찰하고 치료한다.
 7) 이 약과 같은 SGLT2 저해제들은 배뇨/기능에 영향을 줄 수 있는 삼정 기자질환이 있는 환자들에 대하여 이론적으로 노령증가로 인하여 질병의 상태를 악화시킬 수 있다. 그러므로 이 약과 같은 SGLT2 저해제들을 이와 같은 환자들에게 처방할 경우 주의가 요구된다.
 8) 노 실험실적 평가
  이 약을 복용하는 환자들은 적절기반으로 인하여 노 중 포도당에 대한 검사에서 양성을 나타낼 것이다.
 9) 운전 또는 기계조작에 대한 영향
  이 약은 운전 또는 기계조작 능력에 대해 경미한 영향을 준다. 환자들은 특히 이 약을 설포닐우레아 또는 인슐린과 병용할 때 운전 또는 기계를 조작시 저혈당을 피하기 위해 주의하여야 한다.
 10) 하지 절단
  다른 SGLT2 저해제의 장기간 임상연구에서 하지 절단(주로 발가락) 사례의 증가가 관찰되었다. 이 사례가 계열 전체에 적용되는지는 확인되지 않았다. 또한 당뇨병 환자와 마찬가지로, 임상적인 예방적 발관리에 대해서 환자와 상담하는 것이 중요하다.
 11) 회음부 괴저 푸르니에 괴저)
  SGLT2 저해제를 복용한 당뇨병 환자의 시판 후 조사에서 드물기는 하나 신속한 수술적 중재를 필요로 하고, 생명을 위협하는 심각한 회음부 괴저가 보고되었다. 회음부 괴저는 남성과 여성 모두에서 보고되었으며 이로 인한 입원, 여러 차례의 수술 및 사망이 보고되었다.
  이 약을 투여 받는 환자에서 발열 및 불편함과 함께 생식기 또는 회음부 주변의 통증, 자무름, 홍반 또는 부종이 나타나는 경우 회음부 괴저 여부를 확인해야 한다. 회음부 괴저가 의심되는 경우, 즉시 광범위 항생제 치료를 시작하고 필요한 경우 외과적 절제술을 시행해야 한다. 이 약의 투여를 중단하고 혈당 수치를 면밀히 모니터링하면서 혈당조절을 위한 적절한 대체 치료를 시행하여야 한다.

5. 상호작용
 1) 약력학적 상호작용
  ① 이뇨제 : 엠파글리플로진은 티아지드의 루프계 이노제의 이뇨 효과를 증가시킬 수 있으며, 탈수 및 저혈압의 위험을 증가시킬 수 있다.
  ② 인슐린 및 인슐린 분비 촉진제 : 인슐린 및 설포닐우레아와 같은 인슐린 분비 촉진제는 저혈당을 일으킬 수 있다. 따라서 엠파글리플로진과 병용시 저혈당의 위험을 줄이기 위해, 인슐린 또는 인슐린 분비 촉진제의 용량을 줄여야 할 수 있다.
  ③ 1,5-AG (anhydroglucitol) 시험: SGLT2 저해제를 복용하는 환자의 혈당조절을 평가하는 데에 1,5-AG 측정은 신뢰할만 하지 않기 때문에, 1,5-AG 시험으로 혈당을 모니터링하는 것은 권장되지 않는다. 혈당 조절을 모니터링시 다른 방법을 사용한다.
 2) 약동학적 상호작용
  ① 다른 약물의 엠파글리플로진에 대한 영향
  생체외(in vitro) 자료는 인체 내 엠파글리플로진의 주요 대사 경로가 우리딘 5'-디포스포-글루로쿠노실트랜스퍼라제 UGT1A3, UGT1A8, 및 UGT1A9 및 UGT2B7에 의한 글루쿠론산화임을 시사한다. 엠파글리플로진은 인체 흡수 수송체 (human uptake transporters) OAT3, OATP1B1 및 OATP1B3의 기질이나, OAT1및 OCT2의 기질로는 작용하지 않는다. 엠파글리플로진은 P-당단백질 (P-glycoprotein 및 BCRP (breast cancer resistance protein)의 기질이다. 엠파글리플로진과 프로베네시드(UGT 표소저해제, OAT3 저해제)와 함께 투여시 엠파글리플로진 혈장농도 (Cmax)와 농도-시간 면적(AUC)가 각각 26%, 53% 증가하였다. 이러한 변화는 임상적으로 의미있는 것으로 간주되지 않았다.
  엠파글리플로진의 UGT 유도 영향은 연구되지 않았다. 유효성이 감소할 위험이 있으므로, 이미 알려진 UGT 효소의 유도제와의 병용은 피해야 한다.
  경미으로도(OAT3의 생체외(in vitro) 저해제, OATP1B1/1B3 억제 수송체 저해제)의 상호작용 연구에서 병용시 엠파글리플로진 Cmax와 AUC가 각각 15%, 59% 증가하였다. 이러한 변화는 임상적으로 의미있는 것으로 간주되지 않았다.
  리팜피신과의 병용에 의한 OATP1B1/1B3 억제 수송체의 저해는 엠파글리플로진 Cmax와 AUC를 각각 75%, 35% 증가시켰다. 이러한 변화는 임상적으로 의미있는 것으로 간주되지 않았다.
  엠파글리플로진은 P-gp 기질 배설을 증가시켜 혈액 리튬 농도가 감소할 수 있다. 혈청 리튬 농도는 엠파글리플로진의 투여 및 용량 변경 후에 다 자주 관찰되어야 한다. 혈청 리튬 농도의 관찰을 위해 리튬을 처방한 의사에게 환자 치료를 의뢰한다.
  생체외 (in vitro) 연구에서 엠파글리플로진은 CYP450 isoforms을 저해하거나 불활성화시키거나 유도하지 않는다. 엠파글리플로진은 UGT1A1, UGT1A3, UGT1A8, UGT1A9 또는 UGT2B7를 저해하지 않는다. 따라서, 엠파글리플로진과 이들 효소의 기질 약물을 동시 투여할 때 주요 CYP450 및 UGT isoforms의 관련된 약물상호작용은 없을 것으로 예상된다.
  엠파글리플로진 치료 용량에서 P-gp를 저해하지 않는다. 생체외(in vitro) 시험 결과를 근거로, 엠파글리플로진은 P-gp 기질 약물과 상호작용하지 않을 것으로 예상된다. 엠파글리플로진과 P-gp 기질인 디곡신을 병용투여했을 때 디곡신의 AUC 및 Cmax가 각각 6%, 14% 증가하였다. 이러한 변화는 임상적으로 의미있는 것으로 간주되지 않았다.
  생체외(in vitro)에서 엠파글리플로진은 임상적으로 유의한 혈장농도에서 OAT3, OATP1B1 및 OATP1B3와 같은 인체 흡수 수송체 (human uptake transporters)를 저해하지 않는다. 따라서 이들 흡수 수송체 기질과 약물 상호작용은 없을 것으로 예상된다.
  간장환 피험자를 대상으로 실시된 상호작용 연구 결과 엠파글리플로진은 메트르르민, 글리메피리드, 피오글리타존, 시타글립틴, 리나글립틴, 와파린, 리마프릴, 디곡신, 이뇨제 및 경구용 피임제의 약동학에 임상적으로 유의한 영향을 나타내지 않았다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 1) 임부
  임부에서의 이 약의 사용에 대한 자료는 제한적이다. 비임상시험에서 초기에 발생과 관련하여 직간접적으로 유해한 영향은 보이지 않았다. 그러나, 동물시험에서 출생 후 발달에 대한 유해한 영향을 나타내었다. 임부에서 이 약을 투여하지 않는 것이 권장된다. 임신이 확인되면 이 약의 투여를 중단해야 한다.
 2) 수유부
  엠파글리플로진이 사람 모유를 통해 분비되는지에 대한 자료는 없다. 동물시험에서 엠파글리플로진은 모유를 통해 분비되었다. 신생아/유아에 대한 위험성을 배제할 수 없다. 따라서 이 약으로 치료하는 동안에는 수유를 중단한다.
 3) 생식능
  이 약의 인간의 생식능에 대한 영향은 연구된 바 없다. 동물시험에서 수태능과 관련해서 직간접적으로 유해한 영향은 보이지 않았다.

7. 소아에 대한 투여
 이 약은 만 18세 미만의 소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.

8. 과량투여시의 처치
 1) 증상: 대조임상시험에서 건강한 피험자에게 이 약 800 mg (1일 최대 권장용량의 20배에 해당)까지 단회투여, 및 최고형 당뇨환자에게 400 mg (1일 최대 권장용량의 4배에 해당)까지 반복 투여하였을 때, 이러한 독성도 나타나지 않았다. 이 약은 노중 포도당 배출을 증가시켜 삼투압을 증가시키는 소변량과 증가는 용량 의존적으로 알려졌며, 임상적으로 유의하지 않다. 사람에서 800 mg을 초과하여 투여한 경험은 없다.
 2) 처치: 과량이 투여되었을 경우 환자의 임상 상태에 적절한 치료가 실시되어야 한다. 혈액 투석시 이 약의 제거에 대하여 연구된 바 없다.

9. 보관 및 취급상의 주의사항
 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

10. 전문가를 위한 정보
 1) 비임상 안전성 자료
  비임상 자료는 인전성 약리, 유전독성, 수태능 및 초기배 발생의 전통적인 시험을 바탕으로 사람에 특별한 위험이 없음을 보여준다.
  설치류 및 개에서의 장기 독성 시험에서 엠파글리플로진 임상 용량의 10배 이상의 노출에서 독성 징후가 관찰되었다. 대부분의 독성은 체중 및 체지방 감소, 사료섭취량 증가, 설사, 탈수, 혈청 포도당 감소 및 단백질 대사 및 포도당 신생성의 증가를 반영하는 기타 혈청 파라미터의 증가, 다뇨와 포도당뇨와 같은 소변 변화, 및 신장 및 일부 연부 및 혈관 조직에서의 무기질화와 같은 현미경적적 변화를 포함하는 노중 포도당 손실 및 전해질 불균형과 관련있는 이차 약리와 일치하였다. 일부 종에서 관찰된, 과도한 약리작용이 시상에 미치는 영향에 대한 현미경적적 증가는 엠파글리플로진 25 mg의 임상 노출의 약 4배 용량에서의 세노관 확장, 세노관 및 골반의 무기질화를 포함하였다.
  엠파글리플로진은 유전 독성이 없다.
  엠파글리플로진은 2년간의 발암성 시험에서 암컷 쥣드에 최고 용량인 700 mg/kg/일 용량(엠파글리플로진 최대 임상 전신노출의 약 7배에 해당)까지 투여하였을 때 종양 발생을 증가시키지 않았다. 수컷 쥣드에서 최고 용량에서 치료-관련된 장기인 림프암의 양성 혈관 종식 병변이 관찰되었으나, 300 mg/kg/일 용량(엠파글리플로진 최대 임상 노출의 약 20배에 해당)에서는 관찰되지 않았다. 고환 간질세포 종양은 쥣드에서 300 mg/kg/일 이상 용량에서 높은 비율로 관찰되었으나, 100 mg/kg/일 용량(엠파글리플로진 최대 임상 전신노출의 약 10배에 해당)에서는 그러하지 않았다. 두 종양 모두 쥣드에서는 흔하였으나, 사람과 관련이 있는 것으로 보이지 않는다.
  엠파글리플로진은 암컷 마우스에 최고 용량인 1000 mg/kg/일 용량(엠파글리플로진 최대 임상 노출의 약 60배에 해당)까지 투여하였을 때 종양성 발생을 증가시키지 않았다. 수컷 마우스에서는 1000 mg/kg/일 용량에서 신장 종양을 유도하였으나, 300 mg/kg/일 용량(엠파글리플로진 최대 임상 노출의 약 11배에 해당)에서는 그러하지 않았다. 이러한 종양의 발생기전은 시험에서 적절할 수 없는, 신장 병리학 및 대사 경로에 대한 수컷 마우스의 선천적인 소인에 의존하다고 수컷 마우스의 신장 종양은 사람과 관련이 있는 것으로 간주된다.
  체중, 수축기 및 이완기 혈압에서 글리메피리드 대비 통계적으로 유의한 감소가 확인되었다.
  표5 메트르르민과 설포닐우레아 병용요법으로 혈당조절이 충분하지 않은 제2형 당뇨환자 대상 이 약 25mg 추가병용을 글리메피리드 추가병용과 비교한 104주 시험결과 (LOCF)[1]

유효성평가변수	메트르르민	
	이 약 25 mg	글리메피리드 (최대 4 mg)
N	765	780
HbA1c (%)		
베이스라인 (평균)	7.92	7.92
베이스라인 대비 치이[2]	–0.66	–0.55
글리메피리드 대비 차이 (97.5% CI)	–0.11* (–0.20, –0.01)	

1 LOCF: Last observation carried forward, 혈당 구제치료 전 자료
2 베이스라인 및 종료에 대해 보정된 평균
* 비열등성에 대한 p–값 (0.0001 및 우월성에 대한 p–값 = 0.0153
메트르르민과 이 약의 추가병용
이전 약물 치료 경험이 없는 제2형 당뇨환자를 대상으로 이 약과 메트르르민 초기병용의 유효성과 안전성을 평가하기 위해 이중눈가림, 요인설계(factorial design) 24주 임상시험이 수행되었다. 엠파글리플로진과 메트르르민 초기병용(5/500mg, 5/1000mg, 12.5/500mg, 12.5/1000mg, 1일 2회 투여)은 각각의 단독요법 대비 통계적으로 유의하게 HbA1c를 감소시켰으며, 베이스라인 HbA1c 7% 이상 환자에서 목표인 HbA1c 7% 미만 달성 비율은 각각의 단일제 단독요법에 비해 높았다(표6). FPG에서도 단독요법 대비 더 큰 감소를 보였다(일부에서으로 표기).
표6. 약물치료경험이 없는 환자 대상 엠파글리플로진과 메트르르민 초기병용 요법을 단독요법과 비교한 24주 시험결과(LOCF)[1]

유효성평가변수	엠파글리플로진 10 mg[2]	+메트르르민 1000 mg[3]	엠파글리플로진 25 mg[2]	+메트르르민 1000 mg[3]	엠파글리플로진 10 mg[2]	엠파글리플로진 25 mg[2]	메트르르민 1000 mg	메트르르민 2000 mg
		2000 mg[3]		2000 mg[3]			단독투여	단독투여
N	161	167	165	169	169	164	168	164
HbA1c (%)								
베이스라인 (평균)	8.66	8.65	8.84	8.66	8.62	8.86	8.69	8.55
베이스라인 대비 치이[2]	–1.98	–2.07	–1.93	–2.08	–1.35	–1.36	–1.18	–1.75
엠파글리플로진 10 mg 또는 25 mg 단독요법 대비 차이 (95% CI)[4]	–0.63* (–0.86, –0.40)[5]	–0.72* (–0.95, –0.49)[5]	–0.57* (–0.81, –0.34)[5]	–0.72* (–0.95, –0.49)[5]				
메트르르민 1000 mg 대비 차이 (95% CI)[4]	–0.79* (–1.02, –0.56)[5]	–0.93* (–1.16, –0.70)[5]	–0.75* (–0.98, –0.51)[5]	–0.93* (–1.16, –0.70)[5]				
N	153	161	159	163	159	158	166	159
베이스라인 HbA1c 7% 이상 환자 대상 HbA1c 7% 미만 달성비율(%)[6]	63	70	57	68	43	32	38	58

a 위루 총 투여용량으로 1일 2회 동일용량으로 분할 투여함
b MMRM (Mixed Model Repeated Measure)분석에 사용한 전체 분석 집단(관찰된 증례), MMRM 모형에는 치료, 신장기능, 지역, 성별, 치료 상호작용별 성분 및 베이스라인 HbA1c가 포함됨
1 분석은 관찰된 증례(observed case, OC) 접근법을 사용하여 전체 분석 대상군(full analysis set, FAS)에 대해 실시됨
2 베이스라인 수치에 대해 보정된 평균
3 통계적 유의성에 대한 평가 안들: 이차 평가변수에 대한 순차 검정 절차의 부분이 아님
* p–값<0.0002
메트르르민과 설포닐우레아 병용요법에 대한 이 약의 추가병용
메트르르민과 설포닐우레아 병용요법으로 적절히 조절되지 않는 제2형 당뇨환자들을 대상으로 이 약의 추가병용의 유효성과 안전성을 평가하기 위해 이중눈가림, 24주 위약대조 연구가 수행되었다. 이 약10 mg 또는 25mg)을 1일 1회 투여 시 각각 위약 대비 통계적으로 유의한 HbA1c 개선이 나타났다(표7). 위약 대비 통계적으로 유의한 체중감소가 확인되었으며, 임상적으로 유의미한 FPG 감소를 보였다.
24주 임상시험에 확인된 HbA1c 및 체중 감소는 76주까지 유지되었다.
표7 메트르르민과 설포닐우레아 병용으로 혈당조절이 충분하지 않은 제2형 당뇨병환자 대상 이 약의 추가병용을 위약과 비교한 24주 시험결과(LOCF)[1]

유효성평가변수	메트르르민		
	위약	이 약 10mg	이 약 25 mg
N	207	217	213
HbA1c (%)			
베이스라인 (평균)	7.90	7.94	7.86
베이스라인 대비 치이[2]	–0.13	–0.70	–0.77
위약 대비 차이[2] (97.5% CI)		–0.57* (–0.72, –0.42)	–0.64* (–0.79, –0.49)
N	184	199	191
베이스라인 HbA1c 7% 이상 환자 대상 HbA1c 7% 미만 달성 비율 (%)[3]	12.5	51.7	38.7

1 LOCF: Last observation carried forward, 혈당 구제치료 전 자료
2 베이스라인 및 종료에 대해 보정된 평균
3 통계적 유의성에 대한 평가 안들: 이차 평가변수에 대한 순차 검정 절차의 부이이 아님
* p–값 (0.0001
메트르르민과 글리메피리드 병용요법에 대한 이 약의 추가병용
메트르르민 단독요법으로 적절히 조절되지 않는 제2형 당뇨환자들을 대상으로 이 약 25mg 추가병용의 유효성과 안전성을 평가하기 위해 이중눈가림, 24주 위약대조 연구가 수행되었다. 이 약10 mg 또는 25mg)을 1일 1회 투여 시 각각 위약 대비 통계적으로 유의한 HbA1c 개선이 나타났다(표7). 위약 대비 통계적으로 유의한 체중감소가 확인되었으며, 임상적으로 유의미한 FPG 감소를 보였다.
체중, 수축기 및 이완기 혈압에서 글리메피리드 대비 통계적으로 유의한 감소가 확인되었다.
표5 메트르르민과 설포닐우레아 병용요법으로 혈당조절이 충분하지 않은 제2형 당뇨환자들을 대