



고함량 활성형 메가비타민 맥스케어^{액정} [無타르색소]

일반의약품
분류번호:319

【성분 · 함량】 1정(1,024mg) 중

유효성분 : 벤포티아민(KP)	100mg	토코페롤아세테이트2배산(KP)	40mg
(티아민염산염으로서)	72.31mg)	(비타민E로서)	20 IU)
리보플라빈비테이트(KP)	12mg	농축콜레칼시페롤(분말형)(EP)	10mg
니코틴아미드(KP)	100mg	(비타민D로서)	1000 IU)
판토텐산칼슘(KP)	100mg	셀레늄함유건조효모(KP)	25mg
피리독살포스페이트수화물(KP)	10mg	(셀레늄으로서)	13.5μg)
히드록소코발라민아세트산염(KP)	0.01045mg	산화마그네슘(KP)	30mg
(히드록소코발라민으로서)	10μg)	(마그네슘으로서)	18mg)
비오틴(USP)	0.1mg	산화아연(KP)	20mg
폴산(KP)	0.1mg	(아연으로서)	16mg)
클린타르타르산염(USP)	10mg	유비데카렌(KP)	5mg
이노시톨(KP)	30mg	γ-오리자놀(KP)	10mg
아스코르브산(KP)	50mg	우르소데옥시콜산(KP)	10mg

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소-우유)

기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 클로이드성아산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 탭설드감색(999722), 탭설드흰색(19W623), 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 직각색의 정방형 필름코팅정

【효능 · 효과】

1. 다음 경우의 비타민 D, E, B₁, B₂, B₆, C의 보급

육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 발육기, 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.

- 뼈, 이의 발육발달 - 구루병의 예방 - 각기 - 눈의 피로
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(인안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

3. 아연의 보급

【용법 · 용량】 만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia) : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환, 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장(콩팥)결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자
- 6) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염 이 배설되는 상태)

3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.

- 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장(콩팥)장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- 9) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
- 10) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 붉은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전증 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 9) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 10) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사시에 영향을 줄 수 있습니다.
- 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 60정/병, 120정/병(60정/병 x 2EA)

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지 또는 식품의약품안전처 의약품안전나라(<https://necrug.mfds.go.kr>)를 통하여 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

■ 제품문의의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

제조의회사 : **신일제약(주)**

본사 : 서울특별시 동대문구 사가정로 272
공장 : 충청북도 충주시 양성면 복상골길 28

제조사 : 경방신약(주)

인천광역시 남동구 남동대로 394



설명서 개정년월일 : 2021.10.05