용법 · 용량 성인 : 1일 3회, 1회 2정 복용(식후 30분)<상세 내용 뒷면 참조>


Kwangdong

7가지 성분 종합감기약

하디콜 MAX 맥스정

일반의약품 / 10T

몸살감기 / 코감기 / 목감기



어린이 안전용기
포켓부분을 강하게 누르세요

약사님 복약지도

광동제약(주)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 피해를 보상해 드립니다. ※ 본 제품은 복용할 때에 정제가 기도에 걸릴 수 있으니 유의하시기 바랍니다. ※ 본 내용은 최신정보 및 허가정보의 변경에 따라 계속 수정됩니다. 작성일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr) 또는 수신자부담 클로버서비스 (080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다. 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)
※ 영·유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. **[작성일자]** 2022.09.19 **[제품명]** 하디콜맥스정 **[성상]** 노란색의 장방형 필름 코팅정제 I.C.220919-001

일반의약품 정보

이 내용은 소비자의 안전한 선택을 위해 허가사항을 기재한 것으로 복용 전 반드시 포장의 기재사항을 확인할 것. *부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

【유효성분】

1정 중 구아이페네신 (KP) … 41.6 mg, 덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물 (KP) … 8.0 mg, 슈도에페드린염산염 (BP) … 15.0 mg, 아세트아미노펜 (KP) … 200.0mg, 카페인무수물 (KP) … 20.0 mg, 클로르페니라민말레산염 (KP) … 1.25 mg, 티아민질산염 (KP) … 4.0mg

【효능 · 효과】 감기의 제증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법 · 용량】 만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2정 식후 30분에 복용. 만 7세 이상 ~ 15세 미만: 1일 3회, 1회 1정 식후 30분 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다. 2) 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성전신성발진성농포증(급성전신성발진성 고름물집증)(AGEP), 스티븐스 - 존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사용해(TEN)와 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다. 3) 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안된다. 4) 슈도에페드린 함유 의약품 복용 시 급성전신성발진성농포증(AGEP)과 같은 중증(심한 증상) 피부이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 홍반, 다수의 작은 농포(고름물집)와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람 3) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기) 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람 5) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다. 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 멀미약, 알레르기용약) 4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이, 갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.) 2) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터해야 한다. 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람 5) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상샘질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 눔) 곤란 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여받고 있는 사람) 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람, 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 · 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침 10) 이 약은 황색 5호(선셋옐로우FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것. 5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역 · 구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨(소변을 눔) 곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우 ① 쇼크(아나필락시스) : 복용 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다. ② 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사용해(리엘증후군) : 고열을 동반하고, 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다. ③ 급성전신성발진성농포증(AGEP) 발열, 홍반, 다수의 작은 농포(고름물집)와 같은 중증(심한 증상) 피부 이상반응이 나타날 수 있다. ④ 천식 ⑤ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨) 등이 나타날 수 있다. ⑥ 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다. ⑦ 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성대장염의 증상(급격한 복통, 직장(곧창자) 출혈 등)이 발현(드러내 보임)될 경우 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것 2) 장기간 계속 복용하지 말 것 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것 4) 복용 시에는 음주하지 말 것 5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것 6) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 7. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기한】 용기 측면 표기일까지

【첨가제】

· 첨가제(동물유래성분):유당수화물(소,우유), 첨가제(타르색소) : 청색2호, 황색203호, 황색5호 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이노란색85F42138, 전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스