

일반의약품 정보 이 약을 사용하기 전 반드시 사용상의 주의사항을주의 깊게 읽어 주시길 바랍니다.

[제품명] 더블비정

[용법용량] 만 8세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 2정 식후 복용한다.

[포장단위] 60정/병, 120정(60정/병 X 2ea)

[성상] 적갈색의 타원형 필름코팅정

[사용기한] 제조일로부터 36개월

[유효성분] 1정(850밀리그램) 중

벤포티아민(KP)(티아민염산염(으)로서 36.2 mg)	50.0mg
리보플라빈부티레이트(KP)	15.0mg
니코틴산아미드(KP)	15.0mg
판토텐산칼슘(KP)	150.0mg
피리독살포스페이트수화물(KP)	15.0mg
히드록소코발라민아세트산염(KP)(히드록소코발라민(으)로서 47.9 µg)	0.05mg
비오틴(USP)	0.05mg
폴산(KP)	0.2mg
콜린타르타르산염(USP)	15.0mg
이노시톨(KP)	15.0mg
아스코르브산(KP)	50.0mg
토코페롤아세이트2배산(KP)(비타민E(으)로서 50 IU)	100.0mg
농축콜레칼시페롤(분말형)(EP)(비타민D(으)로서 500 IU)	5.0mg
셀레늄함유건조효모(KP)(셀레늄(으)로서 37.5 µg)	25.0mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘(으)로서 90.5 mg)	150.0mg
산화아연(KP)(아연(으)로서 12.1 mg)	15.0mg
유비데카레논(KP)	5.0mg
감마-오리자놀(KP)	5.0mg
우르소데옥시콜산(KP)	15.0mg

[효능효과]

■ 다음 종류의 비타민 D, E, B1, B2, B6, C의 보급

- 육체피로 - 임신 - 수유기 - 병중 - 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 발육기 - 노년기

■ 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

- 뼈, 이의 발육불량 - 구루병의 예방 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저마·수족냉증(손발이 차가움) - 각기 - 눈의피로 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리) 통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술 염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

■ 아연의 보급

[첨가제]

■ 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성이산화규소, 스테아르산마그네슘, 탭설드흰색(19W623), 탭설드갈색(99B722)

[제조사]  **경방신약** (주) 인천광역시 남동구 남동대로 394

[판매처] (주)셀로맥스 경기 용인시 기흥구 구성로 357 용인테크노밸리 D동 710호

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장(콩팥)결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 4) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- 5) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다
- 6) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 7) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 8) 신장(콩팥)장애 환자
- 9) 저단백혈증 환자
- 10) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- 11) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
- 12)임부

4. 다음과 같은 경우 이 약을 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 붉은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장 박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다
- 4) 장기간 고용량을투여할 경우 내성이 생길 수 있다
- 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요 산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다
- 9) 할랄도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- 10) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것.
- 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 4) 요를 황색으로 변화게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 5) 녹차, 홍차 등 탄인을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳 에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[소비자 상담실] 031 - 662 - 1395

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 제품의 자세한 허가사항은 의약품안전나라 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.
※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 유통과정 중 변질 변태 또는 오손된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다. ※ 의약품은 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과함께 보관하십시오.
※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)