

비타민함유 효과빠른 몸살감기약

# 비타미노펜 연질캡슐

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고,  
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

## [원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1,030 mg) 중

유효성분 : 아세트아미노펜(USP) ..... 250.00 mg  
티아민질산염(KP) ..... 4.00 mg

기타 첨가제 : 콩기름, 아자정화유, 황납, 레시틴, 젤라틴, 비결정성소르비톨  
엑, 농글리세린, 락세스, 홍화향색소, 산화티탄

[성상] 미향색(연노랑)의 내용물을 함유한 다홍색의 타원형 연질캡슐

[용법용량] -만 15세 이상 및 성인: 1일 1~2회, 1회 1~2캡슐 6시간 이상 간격  
-만 8세 이상 ~ 만 15세 미만: 1일 1~2회, 1회 1캡슐 6시간 이상 간격  
-공복(빈 속)시를 피하여 복용한다.

[효능효과] 1. 두통, 치통, 발치후 동통(통증), 인후(목구멍)통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요통, 근육통, 건통(어깨결절), 타박상, 골절통, 염좌통(뱀통증), 월경통(생리통), 외상통의 진통  
2. 오히려(잘고 떨리는 증상), 발열시의 해열

[포장단위] 12 캡슐/상자(12캡슐/PTPx1)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 24 개월

[소비자상담실] 031-662-1395

[판매원] (주)셀로맥스(경기도 용인시 기흥구 구성로 357 D동 710호)

[제조원] (주)알피바이오(경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7)

## ※ 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템

(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 주의해 주십시오

※ 구입시 유효기간 또는 사용기한이 지났거나 변질, 변태, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오

## [사용상의 주의사항]

### 1. 경고

- 매일 세한 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.
- 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 홍포증(급성 전신성 발진성 고름물집증)(AGEP), 스티븐스 - 존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사증(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다.
- 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다.  
아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간 손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 된다.

### 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 전신을 일으킨 적이 있는 사람
- 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)

### 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 해열진통제, 감기약, 진정제

### 4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것.

- 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
- 만 3 개월 이상 만 1세 미만의 영아(갓난아기)는 의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 바람직하다.
- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 전신, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 고령자
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 게양, 출혈문제를 가지고 있는 사람

### 5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우  
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 어지러움, 부종(부기)
- 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
  - 속(아니발락사): 복통후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
  - 피부점막만종후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증(리엘증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다.
  - 전신
  - 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨)등이 나타날 수 있다.
- 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

### 6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 정기적 계속 복용하지 말 것.
- 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
- 보통이상은 음주하지 말 것.
- 바르비탈계 약물, 삼현계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

### 7. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.