

비타민K를 함유한 미네랄제

디케이정

칼슘|마그네슘|망간|UDCA|코엔자임|비타민D 함유

【원료약품 및 분량】1정 중

- 유효성분
- | | |
|--|---------|
| 콜레칼시페롤농축분말(EP)(비타민D(으)로서 500IU)..... | 5.0mg |
| 피토나디온(KP)(비타민K(으)로서 50ug) | 0.05mg |
| 황산망간(USP)(망간(으)로서 1.8mg) | 5.5mg |
| 무수인산수소칼슘(IP)(인(으)로서 77.3mg, 칼슘(으)로서 100mg) | 339.5mg |
| 산화마그네슘(KP)(마그네슘(으)로서 100mg) | 166.0mg |
| 우르소데옥시콜산(KP) | 10.0mg |
| 유비데카레논(KP) | 5.0mg |

【 효능·효과 】

- 다음 경우의 비타민 D의 보급
- 임신.수유기
 - 발육기
 - 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능.효과는 다음과 같다.
- . 뼈, 이의 발육불량
- . 구루병의 예방

【 첨 가 제 】

- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 첨가제(타르색소) : 황색4호, 황색5호
- 기타첨가제 : 탭설드노란색(21Y647), 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 크로스포비돈, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 경질무수규산

【 용법·용량 】

만 8세 이상 및 성인: 1회 1정, 1일 2회 복용한다.

【 사용상의 주의사항 】

- 1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
- (1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (3) 만 12개월 미만의 젓먹이
- (4) 신장결석 환자
- (5) 심한 증상의 신부전 환자
- (6) 이 약은 유당(젓당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(Galactose intoleranc e), Lapp 유당(젓당)분해효소 결핍증(Lapp Lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 2) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
- (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 3) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
- (1) 만 1세 미만의 젓먹이
- (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- (4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- (5) 심장.순환기계기능 장애 환자
- (6) 신장장애 환자
- (7) 저단백혈증 환자
- (8) 강심배당체를 투여 중인 환자
- (9) 담낭(쓸개)관련 질환, 간질환 환자
- (10) 신장결석 병력이 있는 환자
- (11) 임부
- 4) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- (2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- (3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- (4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- (5) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 5) 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- (1) 정해진 용법.용량을 잘 지킬 것.
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도.감독하에 투여할 것.
- (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- 6) 저장상의 주의사항
- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【 저장방법 】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【 사용기간 】 제조일로부터 36개월

【 포장단위 】 60 정/병, 120 정/병

【 제 조 자 】 미래제약 / 경기도 안성시 공단2로 104

【 판 매 자 】 동화약품 / 충청북도 충주시 충주산단1로 167(용탄동)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질, 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.