

베니에프정

조제용

500정

일반의약품
분류번호 238

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

■ 유효성분 : 수산화마그네슘(KP) 500mg, 우르소데옥시콜산(KP) 10mg, 노회 건조엑스(EP) 100mg [히드록시안트라센 유도체(바바로인)(오)로서 20mg]

■ 기타첨가제 : 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스

[성상] 흰색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과] ·변비 ·변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

[용법·용량] 1회 1정 성인(15세이상), 1일 3회 식전(식간(식사때와 식사때 사이) 또는 식후)에 복용한다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 급성 복부질환(충수염, 장 출혈, 궤양성 결장염 등) 환자 2) 장폐색(창자막힘) 환자 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것. 제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 3) 신장장애 환자 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 5) 직장출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것. 1) 이 약을 복용함으로써 발진 · 충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우. 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우. 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. 2) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것. 3) 오염(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 500정/병

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 제조일로부터 36개월

[제조사] (주)노바엔헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

[제조회자] (주)엘앤씨바이오 / 경기도 안성시 공단2로 104 가동 1층

* 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

* 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

* 본 약제 투약 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)으로 문의 및 보고하여 주시기 바랍니다.

(주)엘앤씨바이오 Tel. 02-541-8577

<http://lncbio.co.kr>

[제조번호]

[사용기한]

35X18mm

20211029/00

