

3정(1포)

KGMP
일반의약품

복합 위장/소화제

위제로^{에스} ZERO 정

소화불량

속쓰림

위산과다



일양약품



(01) 08806417060017

【성상】 연한 황백색의 정제 【원료약품 및 그 분량】 1정 (428.66밀리그램) 중 · 유효성분 디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제 1000(전분호정화력 100.5단위, 단백소화력 67단위)(KP) 6.7mg, 프로자임(단백소화력 184.8단위)(KP) 3.3mg, 리파제(지방소화력 39.6단위)(KP) 6.6mg, 탄산수소나트륨(KP) 170mg, 침강탄산칼슘(KP) 30mg, 히드로탈시트(BP) 100mg, 우르소데옥시콜산(KP) 1.4mg · 첨가제 동물유래성분: 유당·젖당·수화물(소, 우유) · 첨가제(타르색소): 황색 4호 알루미늄레이크 · 기타첨가제: L-멘톨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 토크페롤아세테이트2배산 【효능·효과】 소화불량, 식욕감퇴·식욕부진, 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부평만감, 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 체할, 구역, 구토, 위통, 신트림, 위부평만감 【용법·용량】 만 15세 이상 소아 및 성인: 1일 3회, 1회 3정 복용 식후 또는 식간·식사때와 식사때 사이에 복용합니다. 【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 1) 투석요법을 받고 있는 환자 2) 만 15세 미만 소아 3) 이 약은 유당·젖당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당·젖당·분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 모도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 1) 신장·콩팥장애 환자 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 5) 이 약은 황색 4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지하십시오. 1) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우 2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오. 2) 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것 3) 나트륨 제한 식이를 하는 사람 5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오. 3) 오용·잘못사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오. 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 【포장단위】 90포/상자 (3정/포×90) 【제조·판매자】 일양약품(주), 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 · 소비자상담실: 080-021-1010 · 학술상담실: 02-570-3888 · 홈페이지: www.iyang.co.kr ※ 제조번호, 사용기한은 측면 참조 P2110-01

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변색·오염되거나 손상된 제품은 약국 개설자 또는 약약품 판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 '소비자 분쟁 해결기준'에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해드립니다.
※ 최종 개정 연월일(2021. 10.05) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 약약품 통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
※ 부작용 보고 및 피해 구제신청: 한국의약품안전관리원 1644-6223 또는 14-3330