

헤모킨골드M^엠

프리미엄 캡슐

일반 의약품

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

[제품명] 헤모킨골드엠프리미엄캡슐

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(430.0mg) 중

- 유효성분: 폴리사카리드철착염(KP)..... 76.1mg(철(으)로서 35.0mg)
시아노코발라민 1000배산(KP)..... 12.0mg(시아노코발라민(으)로서 12.0μg)
폴산(KP)..... 0.5mg
아스코르브산(KP)..... 100.0mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소의 우유)
- 기타 첨가제: 경질무수규산, 상, 하부 적갈색의 캡슐제, 스테아르산마그네슘, 크로스포비돈

[성상] 회색 내지 옅은회색의 분말이 든 상, 하부 적갈색의 경질캡슐제

[효능·효과]

1. 다음경우의 비타민 C의 보급
- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
2. 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

[용법·용량] 만 8세이상: 1일 1회 1캡슐을 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고
1) 철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
2) 만 12개월 미만의 젖먹이
3) 혈색소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose mal absorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 만 1세 미만의 젖먹이
2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
3) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
5) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
6) 심장·순환기계기능 장애 환자
7) 신장(콩팥)장애 환자
8) 저단백혈증 환자
9) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사, 두드러기, 가려움, 광선과민반응, 복부·위통증, 경련, 열, 혼수
2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
5) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
6) 우발적으로 과량복용 한 경우
7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
7. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30캡슐/PTP

[제조사] 경남제약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 49

※ 기타주의

1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용 시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
 2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 사용을 금하시기 바랍니다.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.
소비자 상담전화: 080-232-8600, www.kyungnampharm.com
- ※ 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 “소비자분쟁해결기준”에 의거하여 구입한 곳에서 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- ※ 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템「<https://nedrug.mfds.go.kr>」→「의약품 등 검색」을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다. 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※개봉방법



① 포장 뒷면의
질혀짐을 따라
1정씩 자르세요.



② 모서리의
표시된 부분을
화살표 방향으로
벗깁니다.