

복통(배아픔)을 수반하는 설사엔

설페린큐

캡슐

설사 / 복통 / 토사



[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(550 밀리그램)

■ 유효성분 :

아크리놀수화물(KP)···10mg, 베르베린염화물수화물(KP)···20mg,
스코폴리아엑스(KP)···5mg, 오배자(KP)···60mg, 현초(KP)···60mg,
산사(KP)···50mg, 감초(KP)···50mg, 작약(KP)···50mg,
현호색(KP)···30mg

■ 첨가제(타르색소) : 녹색3호, 황색204호

■ 기타첨가제 : 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 캡슐(상하녹색)

[성상] 갈색의 분말이 든 상, 하 녹색의 경질캡슐제

[효능·효과] 설사, 복통(배아픔)을 수반하는 설사, 체함, 묽은 변, 토사

[용법·용량] 만 15 세 이상 성인 : 1회 2캡슐, 1일 3회 식후 30분 이내에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 신생아
2) 만 7세 이하의 어린이
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
위장진통, 진경제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
2) 발열을 수반하는 설사 환자, 고령자 혈변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자
3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타나는 경우
2) 이 약을 복용하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타나는 경우
3) 수일간 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 1주 이상 계속하여 복용하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 10캡슐/PTP

[제조판매원] (유)한풍제약 / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301
1~3층, 5층, 봉동로 705

※ 본 의약품은 “우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)”에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 본 첨부문서 작성일자(2021년 11월 18일) 이후에 변경된 내용은 소비자 상담실번호(02-521-2618)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 본 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※ 제품 개봉시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.



한풍제약



www.hanpoong.co.kr

소비자 상담실: 02-521-2618