

γ-오리자놀·신경 비타민을 함유한
근육경련 및 말초혈행장애 개선제

마그로디안

【원료약품 및 분량】이 약 1캡슐 중

- 유효성분 :
 - 산화마그네슘(KP) 250 mg
(마그네슘으로서 150.8 mg)
 - 토코페롤아세테이트(KP) 500 mg
(비타민 E로서 500 I.U.)
 - 벤포티아민(KP) 50 mg
(티아민염산염으로서 36.15 mg)
 - 피리독신염산염(KP) 50 mg
 - 리보플라빈(KP) 5 mg
 - γ-오리자놀(KP) 5 mg
- 첨가제(동물유래) : 숙신산젤라틴(소, 가축내피)
- 첨가제(기타) : 농글리세린, 레시틴, 백납, 소르비톨액(비결정성), 에틸바닐린, 정제수, 콩기름

【성상】

노란색의 점조성 내용물을 함유한 적갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, E의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시
 - 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 각기
 - 눈의 피로
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 말초혈행장애 및 갱년기 시 다음 증상의 완화 : 어깨·목 결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)

【용법·용량】

만 12세 이상 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 2회 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 심한 증상의 신부전 환자
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은, 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 임부
- 7) 고지단백혈증, 당뇨병 고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한

이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능 저하
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 7) 우발적으로 과량복용한 경우
- 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜야 합니다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전후에는 피해야 합니다.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장합니다.
이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절해야 합니다.
환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (피해하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말아야 합니다.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용기한】

케이스 별도 표시일 참조

【제조자】

(주)서흥 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

【판매자】

(주)대웅생명과학

※ 본 의약품은 KGMP(의약품 제조및 품질관리기준) 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

※ 의약품 용어설명, 의약품 허가 변경사항 등 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하시기 바랍니다.

※ 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)

※ 소비자상담실 : 02-2210-8169