

배가나정

트리메부틴 함유 . . .
8가지 복합성분 소화제

일반의약품

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정 중

• 유효성분 :	
간조가루(생규).....	25mg
(글리시리진산(으)로서 0.63mg)	
디아스타제-프로테아제-셀룰라제2000V(별규).....	20mg
(전분당화력(pH 4.5) 278 단위, 단백소화력(pH 3.0) 170 단위)	
리파제(KP).....	7.5mg
(지방소화력(pH 6.0) 45 단위)	
메타규산알루미늄산마그네슘(KP).....	40mg
(산화알루미늄(으)로서 12.92mg, 산화마그네슘(으)로서 5.08mg)	
스코폴리아염산(KP).....	5mg
(총 알칼로이드(히요스시아민 및 스코폴라민)(으)로서 50 µg)	
침강탄산칼슘(KP).....	100mg
탄산수소나트륨(KP).....	50mg
트리메부틴말라신염(KP).....	50mg

• 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(건강한 소의 우유에서 유래)
• 첨가제(타르색소) : 정색1호, 황색203호
• 기타첨가제 : 박하유, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 저자(환도히드록시프로필셀룰로오스, 클로로이드성인산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프록셀로오스

[성상] 녹색의 원형 필름코팅정

[효능·효과]

소화성 궤양에 따른 증상의 개선 : 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구도, 위통, 신트림, 소화불량

[용법·용량] 성인 1회 2정, 1일 3회 매 식간 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 투석요법을 받고 있는 환자
2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 이 약으로 알레르기 증상(발진, 발적(총혈되어 붉어짐), 가려움증)을 일으킨 일이 있는 환자
2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
3) 신장장애(신장장애) 환자
4) 간장애 환자
5) 의사의 치료를 받고 있는 환자
6) 인산염 저하가 있는 환자

3. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.

1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자(노인)
2) 심장 또는 신장(콩팥)에 장애가 있는 환자
3) 부종(부기)이 있는 환자

4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

1) 본제의 복용에 의해 노랑이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무거거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.

2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기연용(계속복용)할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.

3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.

5. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.

칼륨함유제제, 간조함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프제 이노제(무로세미드, 에타크린산) 또는 차이리드제 이노제(트리클로르메타이리드)와 병용(함께 복용) 시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.

6. 부작용

1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

2) 이 약을 투여함으로써 드물게 동계, 졸음, 현훈(어지러움), 권태감, 두통이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

3) 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비, 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

4) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.

5) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.

7. 일반적 주의

1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킨다.

2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

3) 장기연용(계속 복용)을 하지 않는다.

4) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.

8. 상호작용

위장진통, 진경(경련원화)제와 병용 투여(함께 복용)하지 않는다.

9. 소아·임부에 대한 투여

1) 이 약은 소아(15세 미만)에게는 투여하지 않는다.

2) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인에게는 투여하지 않는다.

10. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10정/상자(10정/PTP)

※ 본 의약품은 KQMP(의약품제조 및 품질관리기준)적격업체에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 유효기간 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오소류 제품군 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 약용 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. ※ 작성일자 이후 변경될 내용은 홈페이지(www.daewonpharm.com)나 전화(080-497-6273)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<https://medrug.mfds.go.kr>)의약품 정보를 참조하세요. ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원 (1644-6223) * 작성일자 : 2023. 06. 06.

[제조/회자 및 판매자]

Daewon 대원제약

본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 368
공장 : 경기도 화성시 황남읍 제약공단 1길 24

[제조사]

(주)노바엠헬스케어

경상북도 경산시 하양읍 지사산업4로16-53