

액상캡슐로 효과빠른 목감기약



목감기 기침/가래/목아픔

[제품명] 판텍큐코프플러스연질캡슐

[유효성분] 이 약 1캡슐(1,120mg) 중

아세트아미노펜 (USP)..... 200mg

클로르페니라민말레산염 (KP) 1.25mg

gua이페네신(KP) 41.6mg

덱스트로메토르판브로화수소산염수화물 (KP) 8mg

dl-메틸에페드린염산염 (KP).....12.5mg

[첨가제]

솔비톨수페살글리세린블렌드, 정제수, 젤라틴, 치자청
색소, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜400, 프로필렌글리콜

[성상]

연한 노랑의 투명한 액상내용물을 함유한 청색의 투명한
타원형 연질캡슐

[효능·효과]

감기의 증상상(여러 증상) (콧물, 코막힘, 재채기, 인후
(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춡고 떨리는 증상), 발열,
두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량]

-만 15세 이상 및 성인:

1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

-만 7세 초과~만 15세 미만:

1일 3회, 1회 1캡슐 식후 30분에 복용

[사용상의 주의사항]

1. 경고

1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이
약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시
의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이
약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다. 2) 아세트아미
노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진
성홍포증(급성 전신성 발진성 고열물집증) (AGEP), 스
티븐스-존슨 증후군 (SJS), 독성 표피 괴사증 (TEN)와
같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한
피부반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한
피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고,
이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가
나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다. 3) 이
약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미
노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우
간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량
(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세

일반의약품

액상캡슐로 효과빠른 목감기약		
1일	복용연령 및 복용량	식후
3회	1회당 만 15세 이상 및 성인 2캡슐 만 7세 초과~만 15세 미만 1캡슐	30분

트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서
는 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그
병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약
복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 4) MAO억제제 (항우울제, 항정신병제, 감정조절제,
항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한
후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

진해(기침을 그치게 함) 거담제(가래약), 다른 감기약,
해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약
(비염(코염)용 경구제, 멸미약, 알레르기용약)

**4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과
의사, 약사와 상의 할 것.**

- 1) 수도 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심
되는 영아(젖먹이, 갓난아기) 및 만 15세 미만의
어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가
있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기
증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
- 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염,
기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물
알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진,
관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 긴장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환,
당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장(예: 눈의
통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 눌) 곤란 등이
있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이
있는 사람
- 5) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속
혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 7) 의사또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람 (당뇨약,
통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른
약물을 투여받고 있는 사람)
- 8) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가

동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침,
만성 기침, 발열 · 발진이나 지속적인 두통이 동반
되는 기침

**5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고
의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 상담 시 가능한
이 첨부문서를 소지 할 것.**

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토,
식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨(소변을 눌)곤란,
목마름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림,
불면
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상)
증상이 나타난 경우
 - ① 속(아나필락시스): 복용 후 바로 두드러기, 부종
(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고,
손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날
수 있다.
 - ② 피부점막안증후군 (스티븐스-존슨증후군), 중
독성표피괴사증(리얼증후군): 고열을 동반하고,
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이
생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에
나타날 수 있다.
 - ③ 천식
 - ④ 신기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의
흰자위가 황색을 띄게 됨)등 이 나타날 수 있다.
 - ⑤ 간질성폐렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡
곤란, 발열 등이 나타난다.
- 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 소아에 대한 투여

만2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우
의사의 진료를 받는다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독
하에 복용시킬 것.
- 4) 복용시에는 음주하지 말 것.
- 5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차
운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- 6) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한
환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이
감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬

제조의회사 M 동아제약

본사: 서울특별시 동대문구 천호대로 64

공장: 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로

200-23(1, 2A, 4A층)

수 있다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한
곳에 밀폐하여 보관 할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른
용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위]

10캡슐/PTP

[문의전화]

080-920-2002(고객만족팀)

[부작용보고 및 피해구제 신청]

1644-6223(한국의약품안전관리원), 14-3330
(피해구제신청 전용번호)

[최신정보 확인방법]

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지
(www.dapharm.com)에서 확인할 수 있습니다.
※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으
시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.
※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 오손된 의약품은
구입처를 통해 교환해 드립니다.

PTQC10P-21M001

작성일자: 2021.12.02

제조사 (주)알피바이오

경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7



초비자중심경영
공정거래실현 | 환자사랑