

비오라민 골드정

활성형 종합비타민제

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 푸르선티아민 (KP)..... 50mg
리보플라빈부티레이트 (KP)..... 2.5mg
피리독신염산염 (KP)..... 6mg
시아노코발라민 (KP)..... 50μg
아스코르브산과립97% (별규)..... 72.2mg
(아스코르브산으로서 70mg)
토코페롤아세테이트 2배산 (EP)..... 40mg
[토코페롤아세테이트로서 20mg (22IU)]
- 첨가제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 청색2호
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드로스97W19I96글리어, 오파드라이II발간색(85F650013), 옥수수전분, 클로이드성아산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 빨간색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₂, B₆, C의 보급
 - **육체피로** - **임신·수유기**
 - **병중·병후 (병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하** - **노년기**
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과를 다음과 같습니다.
 - 다음 증상의 완화: **신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨 결림 등)**
 - **각기, 눈의 피로**

【용법·용량】 성인 1회 2정씩 1일 1회 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 만 3개월 미만의 젖먹이
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 고옥산살노증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥산염이 배설되는 상태)
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
 - 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕 부진, 복부팽만감
 - 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
 - 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민제를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경 병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관합니다.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 60정/병, 120정/상자(60정/병*2), 100정/상자(10정/PTP×10), 500정/병(조제용), 30정/병(관납용), 100정/병(관납용)

【최신정보 확인방법】 설명서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

【제품문의처】 소비자 상담실 : 080-587-7575(수신자 요금부담)

의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은
한국 의약품안전관리원에 할 수 있습니다.

신청방법 ☎ 1644-6223, 14-3330 □ karp.drugsafe.or.kr

※ 유통과정 중 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 약국개설자 및 의약품판매업자에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

<http://www.myunginph.co.kr>

설명서 작성년월일 : 2023. 11. 06

비오라민 골드정의 활력 이야기

비오라민 골드정은 신경과 근육의 각종 대사에 중요한 역할을 담당하는 비타민B군에 비타민C와 비타민E가 추가된 활성형 종합 비타민제입니다. 비오라민 골드정은 활성형 비타민 B(푸르선티아민), B₂(리보플라빈부티레이트)를 함유하여, 우리 몸에 흡수가 잘되고, 지속적으로 효과를 나타냅니다.



비오라민 골드정은 다음과 같은 증상에 효과적입니다.

육체 피로

비오라민 골드정은 신경과 근육 활동에 필요한 비타민이 함유되어 있어, 피로의 원인이 되는 체내 활성산소를 제거하여 피로를 없애주고, 우리 몸의 에너지 생성을 원활히 하여 활력을 높여 줍니다.

병중·병후 체력저하

질병 등으로 인해 몸에서 필요로 하는 만큼 충분히 영양소를 섭취하지 못한다면, 비타민을 따로 보충해줄 필요가 있습니다. 비오라민 골드정은 체내 에너지 생성을 도와 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후) 체력저하에 복용하면 좋습니다.

신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨 결림 등)

비오라민 골드정은 손상된 신경을 재생시키고, 근육 주변의 혈액순환을 도와 신진대사를 활성화함으로써 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨 결림 등)을 완화시켜 줍니다.

활력 충전



※ 본 의약품을 복용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽고, 본 의약품과 함께 보관하십시오.