

마그라민

엑티브맥스 연질캡슐

일반의약품 분류번호 319 (기타의 비타민제)

원료약품 및 분량 (1캡슐 중)

■ 유효성분

산화마그네슘(마그네슘으로서 211.2mg)(KP).....	350mg	
토코페롤아세테이트(비타민E로서 200IU)(KP).....	200mg	
푸르셀티아민(KP).....	50mg, 리보플라빈(KP)	50mg
피리독살포스페이트수화물(KP).....	50mg	
시아노코발라민(KP).....	0.5mg, 폴산(KP).....	0.25mg
감마오리자놀(KP)	5mg	
농축콜레칼시페롤(유상)(비타민D로서 200IU)(EP)	0.2mg	

■ 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소, 가축)

■ 기타 첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 백납, 소르비톨액(비결정성), 에틸 바닐린, 적색산화철, 콩기름, 폴리소르베이트80

성상 : 이 약은 탁한 노랑색 내지 겨자색의 점조성 내용물을 함유한 적갈색의 장방형 연질캡슐제입니다.

ID Max

효능·효과

○ 다음 경우의 비타민 D, E, B₁, B₂, B₆의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
- 발육기 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 뼈, 이의 발육불량 • 구루병의 예방
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨, 목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기 • 눈의피로

○ 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

용법·용량 : 만 12세 이상 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 2회 복용합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자
- 6) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 7) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.

※5030744-1211201

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
 - 4) 심장·순환기계기능 장애 환자 5) 신장장애 환자
 - 6) 저단백혈증 환자 7) 신장결석 병력이 있는 환자 8) 임부
 - 9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- #### 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 4) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피합니다.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 :

60 캡슐/상자[(10캡슐/PTP)×6)], 120 캡슐/상자[(10캡슐/PTP)×6]/(상자×2)]

○ 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 약국개설자, 안전상비 의약품 판매자 및 의약품 판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

○ 이 설명서는 2021년 12월 1일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

○ 의약품 부작용 신고·피해구제 상담 :
한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

제조사 : (주)서흥 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

제조의뢰자 : 일동제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 바우뒤편로27길 2

공장 : 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실 : (전화)080-022-1010(수신자부담) ※5030744-1211201

ILDONG