

근육경련 및 열액순환 개선! 마그네슘 바이타민 연질캡슐



[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유효성분
 - 산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 241.25mg) 400mg
 - 벤토포아민(KP)(티아민염산염으로서 43.38mg) 60mg
 - 피리독신염산염(KP) 100mg
 - 시아노코발라민(KP) 500µg
 - 토코페롤아세테이트(KP)(비타민E로서 300I.U) 300mg
 - 감마-오리자놀(KP) 5mg
- 첨가제(타르색소) : 적색3호, 적색4호, 청색1호
- 첨가제(동물유래) : 백납(기원동물 : 벌, 사용부위 : 벌집), 젤라틴(기원동물 : 소, 사용부위 : 가죽)
- 기타 첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 산화티탄, 에틸바닐린, 정제수, 콩기름, 팜유, 폴리소르베이트 80, D-소르비톨 액

【성상】 연한 노란색의 유상 내용물을 함유한 어두운 갈색의 장방형 연질캡슐(M바이타민)

[효능 · 효과]

- 다음 경우의 비타민E, B₁, B₆ 의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시
 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 비타민E(토코페롤아세테이트)
 - 말초혈행(혈액)장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족(손발)저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 비타민B1(티아민염산염)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
 - 각기
 - 눈의피로
 - 비타민B6(피리독신염산염)
 - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련
- 【용법 · 용량】 만 12세 이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐 복용한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - (2) 만 12개월 미만의 영아
 - (3) 심한 증상의 신부전 환자
 - (4) 대두유(콩기름)에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - (5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - (1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - (2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - (3) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - (4) 신장(콩팥)장애 환자

- (5) 저단백혈증 환자
 - (6) 임부
 - (7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여 해야 하는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부(상복부)불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 붉은 변, 붉은 반점, 부전 수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
 - (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - (3) 에스트로겐을 포함한 경우(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - (4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경 병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - (5) 골산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상 반응이 나타날 수 있다.
 - (6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - (7) 항알도스테론제, 트리암테넨과 병용(함께 복용(사용))투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - (8) 우발적으로 과량복용한 경우
 - (9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
 - 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
 - (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
 - (4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다.
환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
 - 저장상의 주의사항
 - (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
 - (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 60캡슐(10캡슐/PTP×6), 120캡슐((10캡슐/PTP×6)×2)

【사용(유효)기간】 제조일로부터 24개월

- ※ 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 지나거나 변질 변패 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.
- ※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(http://www.taiguk.co.kr) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 및 QR코드를 참조하십시오.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생시 한국의약품안전관리원에 피해 구제 신청을 할 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- ☎ 소비자상담전화 080-300-8282

첨부문서 작성 연월일 : 2022. 03. 28

【제조외곽지】 태극제약(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123

【제조자】 동방에프티엘(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 78