

파워맥스비^정

【유효성분】1정 중

벤토타민(티아민염산염)으로 72.3 mg(KP)	100 mg
푸르셀티아민염산염(푸르셀티아민)으로 27.49 mg(KP)	30 mg
리보플라빈(KP)	100 mg
니코틴산아미드(KP)	10 mg
판토텐산칼슘(KP)	100 mg
피리독신염산염(KP)	100 mg
폴산(KP)	400 µg
시아노코발라민(KP)	1,000 µg
이노시톨(KP)	100 mg
콜린타르타르산염(USP)	100 mg
D-비오틴(USP)	100 µg
콜레칼시페롤 농축분말(비타민D3로서 1,000 IU)(EP)	10 mg
신화아연(아연으로서 25 mg)(KP)	31.2 mg
산화아그네슘(마그네슘으로서 36 mg)(KP)	60 mg
우르소데옥시콜산(KP)	30 mg
셀레늄함유건조효모(셀레늄으로서 21.6 µg)(KP)	40 mg

【효능·효과】

1. 다음경우의 비타민 D, B1, B6, B12의 보충

- 1) 옥제피로, 임신·수유기, 병중·병후 회복을 앓는 동안이나 회복 후의 체력저하시, 발육기, 노년기
- 2) 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방, 각기, 눈의 피로
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

2. 아연의 보충

【용법·용량】만 12세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 식후 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcemia): 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태 환자, 유육종증(sarcoidosis): 원인을 알 수 없는 전신 염증질환, 신장질환 환자
- (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- (4) 신장결석 환자
- (5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 인산염, 갈슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- (1) 만 1세 미만의 젖먹이
- (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- (4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아·비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다
- (5) 소화성 궤양, 만성 궤양성 대장염, 국한성 대장염 등의 위장질환 환자
- (6) 심장·순환기계기능 장애 환자

- (7) 신장장애 환자
- (8) 저단백혈증 환자
- (9) 감심배당제를 투여 중인 환자
- (10) 신장결석 병력이 있는 환자
- (11) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중지하고, 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
구역, 구토, 설사, 묽은 변, 구내염(입안염), 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, دم·호흡기 약칙, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종
- (2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy): 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- (3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- (4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- (5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- (6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- (7) 항알도스테론계, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- (8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- (3) 오늘 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- (4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】밀폐용기, 실온(1~30℃)에 보관하십시오

【사용기간】제조일로부터 36개월

【포장단위】60정/병, 120정/상자(60정/병×2)

【성상】작갈색의 타원형 필름코팅정

【첨가제】미결정셀룰로오스, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 크로스포비돈, 전분글리콜산나트륨, 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 락트드칼슘(99B703)

【제조자】성이바이오주/ 강원도 원주시 지정면 지래로로 184 1층 일부, 3층

【판매자】광동제약(주)/ 경기도 평택시 산단로 114 Tel: 02-6006-7017

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한 또는 유효기간이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어보시고 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하십시오.

※ 부작용 발생 시 피해 구제 상담: 14-3330

※ 부작용 신고 및 피해 구제 상담: 1644-6223

작성 연월일: 2022. 01. 06 [V.01]