

베라정

(방풍통성산건조엑스(4,6→1))

- 성분・함량：1정 중
 - 유효성분：방풍통성산건조엑스(4,6→1)(별규) 237.5mg
 - 첨가제(타르색소)：황색203호알루미늄레이크
 - 첨가제(동물유래)：유당수화물(소의 우유)
 - 첨가제：미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드알릴리콘디옥사이드, 폴리에틸렌글리콜 6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

- 성상：노란색의 원형 필름코팅정

- 효능・효과
배에 피하지방이 많고 변비가 있는 환자의 다음 증상：
고혈압의 동반증상(두근거림, 어깨결림, 흉조), 비만, 부기, 변비

- 용법・용량
보통 성인 1회 4정을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용한다.

- 사용상의 주의사항
 - 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁수축작용 또는 골반내 장기의 충혈작용에 의해 유·조산의 위험이 있다.)
 - 수유부(이 약에 함유되어 있는 대황 중 안트라퀴논은 유도체는 모유 중으로 이행되어 영아에게 설사를 유발할 수 있으므로 수유 중에는 약물복용을 금하거나 수유를 중단한다.)
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
 - 이 약을 복용하고 있는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
다른 설사약
 - 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 - 고혈압 환자
 - 심장에 또는 신장에 환자
 - 부종 환자
 - 고령자(일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의할 것.)
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
 - 설사, 묽은 변의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
 - 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 묽은 변, 복통, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
 - 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
 - 병후의 쇠약기, 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
 - 땀이 많이 나는 환자(땀 과다, 전신탈력감 등이 나타날 수 있다.)
 - 협심증, 심근경색 등의 순환기계 장애에 있는 환자 또는 그 병력이 있는 환자
 - 배뇨장애 환자(질환 및 증상이 악화될 수 있다.)
 - 감상선기능항진증 환자(질환 및 증상이 악화될 수 있다.)
 - 지금까지 이 약에 의한 발진, 발적, 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
 - 당뇨병 환자(마황(에페드린 류)에 의해 글리코겐의 분해가 촉진되어 혈당이 상승할 수 있다.)
 - 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.
 - 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - 위알도스테론증：요량이 감소하거나, 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나, 두통

- 등(1일 최대 배합량이 감초로서 1 g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
 - (2) 근병증：저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
 - (3) 소화기계：식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등
 - (4) 피부：발진・발적, 가려움 등이 나타나는 경우
 - (5) 자율신경계：불면, 땀 과다, 빠른 맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등
 - (6) 비뇨기계：배뇨장애
 - (7) 간기능장애, 황달：AST, ALT, ALP, γ-GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애(전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위 가 황색을 띄게 됨))가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- 2) 1개월(변비에 복용하는 경우 1주) 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
- 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 - 2) 자극성 완하제는 장기간 계속 복용시 약물에 대한 내성이 증가하고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다.
 - 3) 정해진 용법・용량을 잘 지킬 것. 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법・용량에 주의할 것.
 - 4) 다른 한약제제 등과 병용 투여할 경우 함유 생약의 중복에 주의해야 한다. 대황 함유제제와 병용투여 시 특히 주의할 것.
 - 5) 마황 또는 에페드린 함유제제, MAO 억제제, 갑상선제제(티록신, 리오치오닌), 카테콜아민제제(에피네프린, 이소프레날린), 크산틴계제제(테오필린, 디프로필린)과 병용 시 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등의 증상이 나타나기 쉬우므로 감량하는 등 신중히 복용할 것.
 - 6) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
6. 저장상의 주의사항
- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것).
 - 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

- 저장방법：밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

- 사용기간：제조일로부터 36개월

- 포장단위：500정

- 제조의뢰자：(주)테라젠이텍스 (경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58 (초지동))

- 제조자：코스맥스파마(주) (충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23)

- 판매자：(주)에드바이오 (경기도 김포시 고촌읍 아라옥로80, 204호(WJ 물류센터))

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서(설명서)를 주의 깊게 읽어야 하며, 이 첨부문서(설명서)를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
- ※ 구입시 사용한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질・변패・오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비처 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하세요.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청：한국의약품안전관리원(1644-6223)
- ※ 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 02)3463-7111이나 www.etexpharm.co.kr에서 확인할 수 있습니다.