

138*175mm (접지 : 35*35mm)

일반의약품

깡고맥스 정
240밀리그램
(은행엽건조엑스)

일반의약품

혈액순환개선제
깡고맥스 240밀리그램 정
(은행엽건조엑스)
Gingomax Tab. 240mg

[성분·함량] 1정 중
· 유효성분 : 은행엽건조엑스(EP).....240.0mg
· 첨가제(종물유래) : 유당수화물(소, 우유)
· 첨가제(타르색소) : 청색1호 알루미늄레이크, 청색2호 알루미늄레이크, 황색203호 알루미늄레이크
· 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이녹색(03B41083), 콜로이드성이산화규소, 크로스카르멜로
오스나트륨

[성상] 연두색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과] 집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증(동맥경화 증상)과 같은 증상이 동반되는 정신 기능 저하

[용법·용량] 은행엽건조엑스로서 1회 240 mg, 1일 1회 1정 복용한다, 식사와 관계없이 복용할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 18세 미만의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 18세 미만의 소아에는 투여하지 않는다.)
- 3) 임부(동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)
- 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 항응고제(예 : 펜프로쿰몬, 와파린, 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)와 병용투여(함께 복용(사용))하는 경우, 둘의 약효가 강화되는 것을 배제할 수 없다.
- 2) 다른 의약품과 마찬가지로 약도 시토크롬 P450, 3A4, 1A2, 2E1, 2C9를 통해 다양한 다른 의약품의 대사에 영향을 미치는 것을

- 배제할 수 없으며, 효능 및/또는 효력 지속 시간을 변화시킬 수 있으므로 주의깊게 모니터링하고 용량을 조절해야 한다.
- ① 이 약을 니페디핀 및 딜티아젠크 같은 칼슘채널차단제와 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 생체이용률에 영향을 미침으로써 이들 물질의 활성 수준이 더 높아질 위험이 있다.
 - ② 경구용 테오필린과 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 배설에 영향을 끼침으로써 낮은 활성 수준이 나타날 위험이 있다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제(예:펜프로쿰몬, 와파린), 항혈소판제(예:클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제))을 복용하고 있는 환자
- 2) 수유부(모유로 이행 여부가 알려지지 않음)
- 3) 이 약을 복용(사용)하여 뇌전증 환자의 추가 발작이 촉진되는 것을 배제할 수 없다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 수술이 예정된 자
· 이약을 복용(사용) 시 출혈 위험이 증가할 가능성이 있으므로 안전을 위해 수술 전 최소 36시간 전에 이 약의 복용(사용)을 중단해야 한다.
- 2) 복용기간은 증상의 정도에 따라야 하며 최소 8주 이상 지속되어야 한다. 3개월 후 증상이 호전(나아짐)되지 않거나 증상이 악화되면 의사에게 복용(사용)을 지속해도 되는지 확인해야 한다.
- 3) 이상반응
① 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기 피부반응이 나타날 수 있다.
· 위장 장애 : 오심(구역) 등의 위장관 증상 · 신경계 : 매우 드물게 두통, 불면증, 불안, 혼란
· 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응(예 : 피부 홍반(붉은 반점), 부어오름, 가려움증), 알레르기성 쇼크가 있을 수 있다.
장기 사용의 경우 출혈이 일어난 사례가 보고되었다.
② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당 성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
· 어지러움 · 가려움증
③ 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로서 해당 성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

5. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 20정/상자(10정/PTPx2), 30정/병, 300정/병

제조의뢰자 : ㈜메디카코리아 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 96

제 조 자 : ㈜인트로바이오파마 경기도 평택시 서탄면 마두길 104-12, 104-2 1동 1층(일부) 및 2층(일부)(보관소)

저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질 관리를 통해서 제조됩니다. 혹시 사용기간이 경과되었거나, 유통과정 중 변질·훼손된 제품은 구입 경로를 통하여 교환해 드립니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

※ 피해구제 제도 전용 상담 전화번호 : 14-3330

※ 첨부문서 작성일자 2025년 02월 01일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 메디카코리아 홈페이지(www.medicakorea.com)에서 확인할 수 있습니다.

※ 제품문의 및 상담은 메디카코리아(1522-1131)로 문의바랍니다.

MK 메디카코리아
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 96

MK25020101-H