

효과빠른 복합진경제

속베린정

【원료약품 및 그 분량】1정 중

■유효성분	
다시클로민염산염(KP)	5mg
파파베린염산염(JP)	15mg

■ 첨가제(동물유래성분) : 유당(젓당)수화물(소, 우유)

■ 기타첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히도록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 포비돈

【성상】백색의 원형 정제

【효능·효과】 위통, 복통(배앓음), 산통, 위산과다, 속쓰림

【용법·용량】 성인 1회 2정, 1일 2 ~ 3회. 다만, 1일 2회 이상 복용 시에는 4시간 이상의 간격을 두고 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 만 7세 이하의 어린이
- 2) 이 약은 유당(젓당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젓당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

스코폴리아 엑스 함유 제제 및 다른 위장진통 · 진경(경련완화)제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 약으로 일레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 2) 심장장애 환자, 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 또는 배뇨(소변을 누)장애 환자, 허약자 또는 고령자(노인)
- 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우
- 2) 이 약을 복용함으로써 구갈(목마름), 변비의 증상이 나타날 수 있다. 또 두통, 안면(얼굴)홍조, 눈부심, 배뇨(소변을 누)장애 등이 나타날 경우
- 3) 여러차례 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 청해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 이 약을 복용함으로써 시야몽롱, 눈부심 등이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의할 것

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관 【사용기간】 제조일로부터 36개월 【포장단위】 10정/상자((10정/피티피))

【제조사】 (주)한국파비스제약 / 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 127

【제조외파자】 (주)마더스제약 / 경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18

※ 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

※ 본 제품은 우수 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 받은 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 작성일자(2022.03.25) 이후 변경된 내용이나 자세한 품목허가 또는 신고사항은 본사(070-7457-8819)로 문의하시거나 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

작성일 : 2022년 03월 25일

40년 이상 임마의 마음으로 여러분의 건강을 지켜온



(주)마더스제약 Since 1974 -
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO., LTD.