

【원료약품의 분량】 이 약 1정 중

유효성분: 판크레이틴(KP) 200mg
 (전분소화력 2100단위, 지방소화력 860단위, 단백소화력 28,400단위)
 우담즙 건조엑스(생구) 25mg
 디메티콘(NF) 25mg
 셀룰라제(KP) 50mg
 (섬유소당화력 2,5단위)

유효성분(동물유래): 판크레이틴(돼지-췌장), 우담즙건조엑스(소-담즙)
 첨가제(동물유래): 스테아르산마그네슘(소-우지, 돼지-돈자), 셀락투오스(소-우유)
 기타첨가제: 아크릴아이드93041049초록색, 오파드라이한색(OY-C-7000A),
 클로이드성아산화규소, 크로스포비든, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 연두색의 장방형 장용코팅정

【효능·효과】 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진,
 소화불량으로 인한 위부팽만감

【용법·용량】 성인 1회 2정 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 1) 만 7세 이하의 어린이
 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 중단 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 심할 시 이첨부문서를 소지할 것.
 1) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

일반의약품 **조제용**

500정

급·만성소화불량/가스제거

판크론®에프정



영진약품

- 1) 전해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것
 5. 저장상의 주의사항
 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
 3) 오용(잘못사용)을 먹고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것
- 【저장방법】** 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관
【포장단위】 100정/PTP(10정/PTP × 10), 500정/병
【사용기간】 제조일로부터 36개월 @- 등록상표
제조사: 영진약품㈜ 공장: 경기도 화성시 남양읍 무하로 66
 ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입하신 약국, 병원, 의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다.
 ※ 이 문서 작성일자(2022년 1월 14일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 소비자상담실에서 확인할 수 있습니다.
 ※ 의약품 부작용 발생 신고 및 피해구제 상담은 한국약품안전관리원(1644-6223) 또는 피해구제 제도 전용 상담번호(14-3330)를 통하여 신청할 수 있습니다.
 소비자 상담실: 080-990-8200
 홈페이지: www.yungjin.co.kr

M43059◎



HDPE
 두께: PP
 재활용 어려움

문서작성일: 2022년 1월 14일



(01) 08806424049722

제조번호:
 사용기한:

