

징코짱정120밀리그램(은행엽건조엑스)

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

징코짱정120밀리그램(은행엽건조엑스)

- 유효성분 : 은행엽건조엑스(생규).....120mg
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물 (기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타첨가제 : 전분글리콜산나트륨, 탭실드갈색(29B754), 크로스카멜로오스나트륨, 경질무수 규산, 스테아르산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 톨크

[성상] 적갈색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

- 1) 말초동맥 순환장애(간혈성 파행증)의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명
- 3) 이명, 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애의 치료

[용법·용량]

1. 성인

- 1) 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명:
은행엽 건조엑스로서 1회 40mg, 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구투여한다.
- 2) 기질성 뇌기능 장애:
은행엽 건조엑스로서 1회 40 ~ 80mg, 1일 3회 또는 1회 120mg, 1일 2회 경구투여한다.

2. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것
 - 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 12세 이하의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.)
 - 3) 임부 (동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)
 - 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당

분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제(예: 펜프로쿠몬, 와파린)), 항혈소판제(예:클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제))을 복용하고 있는 환자

2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것, 상담시 가능한 첨부문서를 소지할 것

1) 수술이 예정된 자

2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우

3) 이상반응

① 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.

② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

- 어지러움

- 가려움증

③ 기타 : 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로서 해당성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

4. 기타 이약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10정/PTP, 30정/병, 30정/PTP, 60정/병, 60정/PTP, 120정/병, 120정/(10정/PTP×12), 120정/병((60정/병)×2), 180정/병, 180정/PTP(10정/PTP×18), 240정/병(120정/병×2), 240정/PTP((10정/PTP×12)×2), 360정/병(180정/병×2), 360정/PTP((10정/PTP×18)×2)

[사용기간] 제조일로부터 36개월

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※이 문안은(2021년 12월 23일)작성되었으며 이후로 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보는 미래제약 홈페이지 또는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※소비자상담실 : 02-521-2308 / www.miraepharmkorea.co.kr

Rev.00

[제조사] : 미래제약(주) 경기도 안성시 공단2로 104