

에스코텐 정

에스오메프라졸마그네슘삼수화물

에스코텐 정

에스오메프라졸마그네슘삼수화물

전문의약품

에스코텐 정
에스오메프라졸마그네슘삼수화물

전문의약품

【성분・함량】 이 약 1정 중

- 유효성분：에스오메프라졸마그네슘삼수화물 (법규)
11.15mg(에스오메프라졸로서 10 mg)
- 기타 첨가제：D-니나졸, 라우일황산나트륨, 메클루민, 스테이릴푸마르산나트륨, 시트르산나트륨, 이크릴아식화제(93018509), 오파드라이Ⅱ 노란색(95F420005), 오파드라이Ⅱ 클리어(95F19250), 오파드라이클리어(02B29055), 크로스보덴, 히프로클로오스

【성상】 연한 노란색의 원형 필름코팅정
【효능・효과】 급성위염 및 만성위염의 위장적 병변 개선

- 【용법・용량】**
이 약은 물 등의 액체와 함께 삼켜야 하며 씹거나 부수어서는 안된다.
성인：1회 1정, 1일 1회 경구 투여한다.
12세 미만의 소아：이 약을 12세 미만의 소아에 투여한 경험은 없다.
신기능장애：용량을 조절할 필요는 없다.
중증의 신부전환자에 투여한 예가 없지 않기 때문에 신중에 투여하여 한다.
간기능장애：강중-중등도의 간장애 환자에서 용량을 조절할 필요는 없다.
중증 간장애환자는 신중에 투여하여 한다.
고령자：용량을 조절할 필요가 없다.

- 【사용상의 주의사항】**
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약, 이 약의 구성성분 또는 벤조이미다졸류에 과민반응 및 그 병력이 있는 환자
2) 이타자나비르 및 넬비나비르를 투여 중인 환자(상호작용항 참조)
3) 수유부
4) 넬비나비르 함유제제를 투여중인 환자 (상호작용항 참조)
2. 이상반응
1) 급성 위염 및 만성 위염 환자 332명을 대상으로 이 약과 활성대조약인 인산성 및 우유효소를 비교한 치료적 확증 임상시험 결과, 이 약을 투여한 환자에서 3.03%(45/166)의 이상반응이 보고되었으며, 보고된 이상반응은 아래와 같다. 발생한 이상반응은 모두 이 약과 인과관계는 없는 것으로 확인되었다.
표1. 이 약의 3상 임상시험에서 보고된 이상반응

이상반응	이 약 10mg(N=165명)
	환자 수 (%)
전신 장애 및 투여 부위 병태	
발열	1 (0.61)
임상 검사	
아스파르트산 아마노 전이 효소 증가	1 (0.61)
알라닌 아마노 전이 효소 증가	1 (0.61)
장동 정진 장애	
복통	1 (0.61)
양성, 악성 및 상해 불명의 신생물(낭종 및 종종 포함)	
B-세포 림프종	1 (0.61)
피부 및 피하 조직 장애	
두드러기	1 (0.61)

- 2) 아래에 명시된 정보는 에스오메프라졸 정중정 20mg, 40mg에 대한 임상시험 및 시판 후 조사에서 수집된 것을 근거로 한 것이다.
○ 다음의 이상반응이 임상시험과 시판 후 조사에서 확인 또는 의심되었다. 용량 상관성은 없었다. 이상반응을 빈도에 따라 분류하였다(자주) 1/100, < 1/10；때때로) 1/1,000, < 1/100；드물게) 1/10,000, < 1/1,000；매우 드물게) 1/10,000.
－혈액 및 림프계：드물게 백혈구감소증, 저혈소판증, 매우 드물게 무혈소판증, 혈구계감소증
－면역계：드물게 발진, 혈관부종, 아나필락시스 반응/쇼크 등과 같은 과민반응
－다기관/영양：때때로 말초 부종, 드물게 처나트륨결핍, 매우 드물게 저마그네슘결핍 (중증의 저마그네슘결핍은 저칼슘혈증을 유발할 수 있다. 저마그네슘결핍은 또한 저칼륨혈증을 유발할 수 있다).
－정신계：때때로 불면, 드물게 초조, 정신 혼란, 우울, 매우 드물게 공격성, 환각
－신경계：자주 두통, 때때로 어지럼(dizziness), 지각이상, 졸음, 드물게 미각장애
－시각：드물게 흐린시력
－청각 및 미로계：때때로 어지럼(vertigo)
－호흡기계：드물게 기관지경련
－위장관계：헐정염, 자주 복통, 변비, 설사, 복부평민감, 구역구토, 때때로 구강건조증, 드물게 구내염, 위장관 칸디다증, 매우 드물게 현미경적 결장염
－간기능장애：때때로 간효소 증가, 드물게 황달을 동반하거나 동반하지 않는 간염, 매우 드물게 간부전, 기존 간질환이 있는 환자에서 뇌병증
－피부 및 피하조직：때때로 피부부, 가려움, 발진, 두드러기, 드물게 발모, 감광성 증, 매우 드물게 다형홍반, 피부정맥인후종(스틴슨-존슨증후군), 독성표피괴사증후군(열열증후군), 급성 전신 피진성 급증증, 호산구 증가 및 전신 증상 동반 약물 반응(DRESS 증후군)
－근골격계：골절 드물게 관절통, 근육통, 매우 드물게 근육쇠약
－신장 및 비뇨기계：매우 드물게 간질신장염
－생식계：매우 드물게 여성항문방
－전신 및 투여부위：드물게 무릎, 발한증가
－감염：클로스트리듐 디피실레증(설사(빈도불명))
○ 이외에 다음의 이상반응이 1% 미만의 발생률로 이 약과 관련이 있거나 또는 관련 가능성이 있는 것으로 보고되었다.
－전신：복부팽만, 알레르기 반응, 등통, 흉통, 흉골하통통, 안면부종, 인후염증, 다뇨, 발열, 인플루엔자 유사증상, 일반부종, 다리부종, 권태, 통증, 경직, 무력증, 말초부종
－심혈관계：홍조, 고혈압, 빈맥
－내분비계：갑상선종

- －소화기계：대장과민증, 변비약화, 소화불량, 연하곤란, 위장관형성 장애, 상복부통증, 트림, 식도장애, 잦은배변, 위장염, 위장관출혈, 골골직, 흑색변, 구강장애, 인두장애, 직장장애, 위장관 증상, 혈중가스 수리증가, 허장애, 거부증, 쾌양성 구내염, 구토
－청각：귀울림, 이명
－혈액계：빈혈, 저색소빈혈, 자궁경부암혈전병증, 코피, 백혈구증가증, 백혈구감소증, 혈소판감소증
－간：빌리루빈혈증, 간기능 이상, ALT 증가, AST 증가
－대사/영양：당뇨, 고요산혈증, 저나트륨혈증, ALP증가, 구갈, 비타민 B12결핍, 체중증가, 체중감소
－근골격계：관절염약화, 관절병증, 경련, 섬유근통증후군, 말장, 류마티스성 다발성근육통, 관절통
－정신신경계：식욕부진, 무감동, 식욕증가, 혼란, 우울약화, 과다근육 긴장증, 초조, 감각지하, 발기부전, 불면증, 편두통, 편두통약화, 수면장애, 떨림, 어지럼(dizziness, vertigo), 시야결손, 지각이상, 졸음
－생식계：혈정통, 혈정장애, 절멸
－호흡기계：전신쇠약, 기침, 호흡곤란, 후두부종, 인두염, 비염, 부비염증
－피부/부속기관：여드름, 황문가려움, 발진, 홍반발진, 반구진성발진, 혈관부종, 피부부, 가려움, 두드러기, 발한증가
－특수감각：조음력, 이상후각, 미각소실, 미각노화
－비뇨기계：소변이상, 알부민노, 방광염, 배뇨곤란, 전권감염, 혈뇨, 배뇨노화, 칸디다증, 생식기칸디다증, 다뇨
－시각：결막염, 시각이상
－내시장 상에서 발견된 이상반응：심아지정염, 식도염, 식도협착, 식도폐양, 식도장막류, 위궤양, 위염, 양성종양 또는 결절, 바레트식도 (Barrett's esophagus), 점막빈색, 말장
3) 다음은 프로토펙프록시제제의 시판 후 조사를 통해 보고된 이상반응이다. 이 이상반응은 불특정 다수의 인구집단에서 자발적으로 보고된 것이기 때문에, 항상 발생률을 신뢰성 있게 예측하거나 약물 투여와의 인과관계를 확립할 수 있지는 않다.
－면역계：전신홍반루푸스
－피부 및 피하조직계：피부홍반루푸스
－위장관계：위자선 용종
4) 황문근공해：황문근공해가 나타날 수 있으나 신중하게 관찰하고 근육통, 위궤양, 크레이티나키나제(크레이티나산활성효소) 상승, 혈중 및 소변 미오글로빈 상승을 포함한 증상이 나타난 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 취하여야 한다.

3. 일반적 주의
1) 이 약으로 인해 악성종양의 증상이 완화되거나 진단이 지연될 수 있으므로 악성 종양이 의심되는 경우 종양의도하지 않은 현저한 체중 감소는 세균의 수가 증가한다. 이 약으로 치료할 때 살모넬라, 캄필로박터, 클로스트리듐 디피실레와 같은 세균에 의한 위장관의 감염 위험이 약간 증가할 수 있다. 이것은 클로스트리듐 디피실레균증 설사 위험성 증가와 연관이 있으며 특히 입원환자에서 이러한 위험성이 증가되었다는 여러 관찰연구 결과가 보고되었다. 이러한 진단은 설사증세가 개선되지 않았을 때 고려되어야 한다. 클로스트리듐 디피실레균증 설사는 거의 모든 항균제 사용 중 보고되고 있다.
5) 프로토펙프록시제제로 인해 위내 산도가 감소하여 위장관에 보통 존재하는 세균의 수가 증가한다. 이 약으로 치료할 때 살모넬라, 캄필로박터, 클로스트리듐 디피실레와 같은 세균에 의한 위장관의 감염 위험이 약간 증가할 수 있다. 이것은 클로스트리듐 디피실레균증 설사 위험성 증가와 연관이 있으며 특히 입원환자에서 이러한 위험성이 증가되었다는 여러 관찰연구 결과가 보고되었다. 이러한 진단은 설사증세가 개선되지 않았을 때 고려되어야 한다. 클로스트리듐 디피실레균증 설사는 거의 모든 항균제 사용 중 보고되고 있다.
6) 일부 해외 역학연구에서 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 치료가 고관절, 손목 및 척추 골절의 위험성 증가와 관련이 있을 가능성이 있다고 보고되었다. 골절의 위험은 권장용량을 상회하는 고용량을 투여한 환자나 1년 이상의 장기사용 환자에서 증가되었다. 오메프라졸 및 에스오메프라졸과 골다공증성 골절 간의 인과관계가 밝혀진 것은 아니나, 골다공증 및 골다공증성 골절이 진행될 위험이 있는 환자의 경우 최선의 임상 자전에 따라 적절한 임상적 모니터링이 권고된다.
7) 3개월 이상 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 치료를 받은 환자들에게서 저마그네슘혈증이 드물게 보고되었으며, 1년 이상 치료를 받은 것으로 가장 많이 나타났다. 대부분의 환자들에게 저마그네슘혈증의 치료에 마그네슘보충 및 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 투여 중단이 필요하다. 장기간 치료가 필요하거나 다국적인 저마그네슘혈증은 매우 드물지만, 약물에 의해 발생할 수 있는 고용량 투여하는 치료 시작을 포함한 주기적 마그네슘 수치 모니터링이 필요하다. 중대한 이상반응은 감지, 부정맥, 발작을 포함한다.
8) 실험실적 검사와의 간섭：이 약의 투여로 인한 위내 산도의 감소는 혈청 크로모그라닌 A (serum chromogranin A, CgA)의 농도를 증가시킨다. 따라서 이 약을 투여 중인 사람은 신경내분비종양 진단검사에 서 위양성 결과를 야기할 수 있다. 검사자 전 최소 14일 전에는 이 약의 투여를 일시적으로 중단해야 하며, 검사자가 참고 상한선을 초과한 경우 재검사 시행을 고려하도록 한다. 반복적으로 검사를 실시할 경우 (예, 모니터링), 실험실 전 참고 범위가 다르므로 농도의 측정치는 동일한 실험실에서 실시해야 한다.
9) 메토트렉세이트：프로톤펌프억제제와 메토트렉세이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토트렉세이트의 사용상의 주의사항 참조)를 병용하는 경우 메토트렉세이트 그리고/또는 그 대사체의 혈중 농도가 상승 및 지속하여 메토트렉세이트의 독성이 나타날 수 있는 문해되고 가 있었다. 고용량의 메토트렉세이트를 사용하는 경우, 프로톤펌프억제제의 일시적인 투여 중단을 고려할 수 있다(상호작용항 참조).
10) 치료시 결과를 충분히 관찰하고 증상에 따라 이 약을 최소용량 및 적절한 장기기간으로 투여하여야 한다.
11) 피부 및 전신홍반루푸스：프로톤펌프억제제를 복용한 환자에서 피부홍반루푸스(Outaneous lupus erythematosus, CLE)와 전신홍반루

푸스(Systemic lupus erythematosus, SLE)가 보고되었다. 이러한 사례들은 새로 발생하거나 기존의 자기면역질환의 약화로 발생하였다. 프로토펙프록시제제로 유발되는 홍반루푸스 사례는 대부분 피부홍반루푸스였다. 프로토펙프록시제제를 복용한 환자에서 보고된 피부홍반루푸스의 가장 흔한 형태는 아급성피부홍반루푸스이며, 영어부터 노인에 이르기까지 지속적인 약물 치료 후 수주에서 수년 이내에 발생하였다. 일반적으로 조직학적 결과는 장기침습이 없는 형태로 관찰되었다. 프로톤펌프억제제를 복용한 환자에서 전신홍반루푸스는 피부홍반루푸스보다 덜 흔하게 보고되었다. 프로토펙프록시제제 관련 전신홍반루푸스는 보통 비약물유발성전신홍반루푸스보다 더 가벼운 증세를 보인다. 전신홍반루푸스는 주로 젊은층의 성인부터 노인에 이르기까지 초기 약을 치료 후 수일에서 수년 이내에 발생한다. 대다수의 환자는 발진이 나타나지만, 관절통과 혈구감소증도 보고되었다. 의학적으로 지시된 것 보다 더 오랫동안 프로토펙프록시제제를 투여하지 않는다. 만약 이 약을 복용한 환자에서 피부홍반루푸스 또는 전신홍반루푸스의 일지하는 증상이나 징후가 나타나는 경우, 약물 복용을 중단하고 적절한 전문의에게 환자 평가를 의뢰한다. 대부분의 환자들은 4～12주 내로 프로토펙프록시제제 중단만을 통하여 개선되었다. 혈청학적 검사에, 항핵항체(Antinuclear antibody, ANA)에서 양성으로 나타날 수 있으며, 높은 혈청학적 검사결과는 임상 증상보다 해결되는 데 시간이 더 소요될 수 있다.
12) 위자선 용종(Fundic gland polyps)：프로톤펌프억제제 사용은 위자선 용종의 위험 증가와 관련이 있으며 특히 1년 이상 장기간 사용 시 위험이 증가한다. 프로톤펌프억제제를 사용하는 환자 중 위자선 용종이 발생한 대부분의 환자들은 무증상이었으며 내시경 검사를 통해 우연히 발견하였다. 프로토펙프록시제제는 치료하고자 하는 증상에 맞게 최단 기간 사용해야 한다.

4. 상호작용
1) 이 약 투여 중 위내 산도 감소로 인해 위 산도에 의해 흡수 기전이 영향을 받는 약물의 흡수가 증가 또는 감소될 수 있다. 다른 산 분비 억제제나 제산제와 마찬가지로 이 약 투여 중에는 케토프로판과 테라리노를 함께 테라네티드의 흡수가 감소될 수 있고 다국적인 흡수가 증가할 수 있다. 건강한 자험자들에게 오메프라졸(하루에 20 mg)과 다국적인 동시투여는 다국적인 생체이용률을 10% 정도 증가시켰다(10명의 자험자중 2명은 30 %까지 증가). 이 약은 오메프라졸의 이성질체이다. 따라서 이 약을 다국산과 병용투여시 환자의 상태는 모니터링 되어야 한다.
2) 이 약은 CYP2C19과 CYP3A4에 의해 대사된다. 그리고 이 약은 이 약의 주 대사효소인 CYP2C19을 저해한다. 다이제팔, 시탈로프람, 이마프라민, 클로미프라민, 페니티민, 외르파민 등과 같이 CYP2C19에 의해 대사되는 약물과 병용시 이들 약물의 혈장 농도가 증가될 수 있으므로 이들 약물의 감량이 필요할 수 있다. CYP2C19 기질인 다이제팔과 이 약 30 mg의 병용투여로 다이제팔의 청소율이 45 % 감소되었다. 간질환자에게 페니티민과 이 약 40 mg의 병용투여로 페니티민의 혈장농도 최저치가 13 % 증가되었다. 이 약을 투여하기 시작하거나 중단할 때 페니티민의 혈장 농도를 모니터링하도록 한다. 오메프라졸 (1일 1회 40 mg 투여)은 보리코나졸(CYP2C19 기질)의 Cmax와 AUCr를 각각 15 % 및 41 % 증가시켰다. 임상시험에서 외르파민을 투여하고 있는 환자에게 이 약 40 mg을 병용 투여하였을 때 응고 시간은 정상 범위에 포함되었다. 그러나, 시판 후 조사에서 두 약물을 병용투여하는 동안 임상적으로 유의한 INR과 프로트롬빈 시간의 상승이 없 건 보고되었으며 이는 비정상적혈액화 심하여 사망까지 초래할 수 있다. 그러므로 외르파민 또는 다른 쿠마린 유도제와 이 약과의 병용투여를 시작하거나 중단할 때 모니터링이 필요하다.
3) 이 약은 CYP2C19과 CYP3A4에 의해 대사된다. 이 약과 CYP3A4 저해제인 클래리트로마이신(500 mg 1일 2회 투여)을 동시에 투여하면 이 약의 AUC가 2배로 증가한다. 이 약과 CYP2C19, CYP3A4 저해제와의 병용투여는 이 약의 노출을 두 배 이상 증가시킬 수 있다. CYP2C19, CYP3A4 억제제인 보리코나졸은 오메프라졸의 AUC를 280 %까지 증가시킨다. 이 때문에 이 약의 용량을 조절할 필요는 없다. 그러나 중증의 장기능 장애환자의 장기간의 치료가 필요한 환자에서는 용량조절을 고려하여야 한다.
4) CYP2C19나 CYP3A4 혹은 두가지 모두를(예, 리람피산과 세린트즈 스위트) 유도한다고 알려진 약물들은 에스오메프라졸 대사를 증가시킬 경우 에스오메프라를 혈장 농도를 감소시킬 수도 있다. 이 약과 리람피산 또는 세린트즈스위트의 병용투여를 피한다.
5) 이 약 뿐만 아니라, 오메프라졸도 CYP2C19의 억제제로서 작용한다. 교차연구에서 건강한 자험자에게 40 mg의 오메프라졸을 투여한 경우 살로스타솔의 Cmax와 AUC가 각각 18 %와 26 % 증가하였고 살로스타솔의 혈장 대사체 중 하나의 Cmax와 AUC는 각각 29 %와 69 % 증가하였다.
6) 건강한 자험자에게 오메프라졸(40 mg 1일 1회 투여)과 이타자나비르 300 mg/리토나비르 100 mg를 병용투여했을때 이타자나비르의 노출이 감소한다(AUC, Cmax, Cmin이 약 75 % 감소). 이타자나비르 400 mg 1일 4회 투여는 오메프라졸의 이타자나비르 노출에 대한 영향을 상쇄시킬 수 없다. 이 약을 포함한 프로톤펌프억제제들은 이타자나비르와 병용투여할 수 없다.
7) 오메프라졸은 몇 개의 항 바이러스제의 상호작용이 있는 것으로 보고되었다. 이 보고된 상호작용 및 임상적 중요성과 기전은 밝혀지지 않았다. 오메프라졸 투여시의 위내 산도 감소는 항 바이러스제의 흡수를 변화시킬 수 있다.
가능한 상호작용의 또 다른 기전은 CYP2C19이며, 이타자나비르 및 넬비나비르의 같은 항바이러스 제제에서는 오메프라졸과 병용 투여시 혈청수치 감소가 보고되었으며 병용투여는 권장되지 않는다. 그 외 사 퀴나비르와 같은 항바이러스 제제에서는 혈청수치 증가가 보고되었다. 오메프라졸과 병용 투여시 혈청수치가 변하지 않는 항바이러스 제제 또한 존재한다. 오메프라졸과 에스오메프라졸은 유사한 약력학/약동학적 특성을 갖고 있으므로 이타자나비르 및 넬비나비르와 같은 항 바이러스제제 약물과 병용투여해서는 안된다.
8) 건강한 자험자에게 시사프리드와 이 약 40 mg을 병용투여했을 때 시사프리드의 AUC가 32 % 증가되고 배설 반감기가 31 % 연장되었으나, 최고 혈장 농도의 유의한 증가는 없었다. 이러한 상호작용으로 심장 전기생리에 대한 시사프리드와의 영향이 변경되지 않았다. 즉, 시사프리드 단독 투여에 의한 QTc 간격의 근소한 연장 외에 이 약과 시사프리드의 병용투여에 의해 더 이상 QTc 간격이 연장되지는 않았다.
9) 이 약은 이독사실린 또는 퀴나리딘의 약물동력학에 임상적으로 유의한 영향을 미치지 않았다.
10) 이 약과 나프로센 또는 로페카비르의 병용 투여를 더긴간 평가한 시험에 의하면 임상적으로 연관있는 약동학적 상호작용이 나타나지 않았다.
11) 건강한 자험자로부터의 연구결과로부터 클로피도그렐(초기용량 300 mg/ 유지용량1일 75 mg)과 에스오메프라졸(경구투여 1일 40 mg)은 약동학/약력학적인 상호작용이 있는 것으로 보여졌으며, 이것은 평균 14 % 정도 혈소판 응집을 감소시키는 것으로 보여졌으며 클로피도그렐의 혈장 대사체의 노출을 평균 40 % 정도 감소시키는 것으로 나타났다. 이 결과에 근거하여 에스오메프라졸과 클로피도그렐은 병용투여하지 않도록 한다.

- 12) 이상반응 사례 보고, 집단약동학 연구(population pharmacokinetic studies) 및 후향적 연구 등에서 메토트렉세이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토트렉세이트의 사용상의 주의사항 참조)와 프로토펙프록시제제를 병용하는 경우 메토트렉세이트 그리고/또는 그 대사체인 히드록시메토트렉세이트의 혈장 농도가 상승 및 유지되어 메토트렉세이트의 독성이 나타날 수 있다고 보고되었다. 그러나 고용량의 메토트렉세이트와 프로토펙프록시제제에 대한 정식 약물상호작용연구는 수행되지 않았으나(일부만 제외) 주의할 점),
13) 이 약과 테크로리루스를 병용하면 테크로리루스의 혈청치기 증가할 수 있다.
14) 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제병용요법：클래리트로마이신 및/또는 에리트로마이신을 토르미드와 병용 투여시 심부정맥(QT 연장, 심실성 빈맥, 심실세동, Torsades de pointes 포함)이 나타나고 이는 클래리트로마이신 및 에리트로마이신에 의해 이들 약물의 간섭사 기 방해를 받기 때문인 것으로 약국의 시판후 조사결과 보고되었으며 치명적인 사례도 보고되었다.
15) 이 약과 넬비나민의 병용 시 넬비나민의 혈장농도가 감소할 수 있으므로(위장 pH 증가) 병용 투여해서는 안된다. 이는 넬비나민의 치료 효과를 저하시킬 수 있다.

5. 임부에 대한 투여
이 약의 임신 중 노출에 대한 데이터는 제한되어 있다. 동물실험 결과 배/태아 발달과 관련하여 작－간섭의 유해작용은 나타나지 않았다. 라세미제 혼합물의 동물실험 결과 임신, 분만 또는 분만후 발달에 대한 작－간섭의 유해작용도 나타나지 않았다. 그러나 이 약을 임부에 처방 시 주의해야 한다.
6. 수유부에 대한 투여
이 약이 사람의 우유 무으로 이행하는지 여부는 알려져 있지 않다. 수유부를 대상으로 한 시험은 실시되지 않았으므로, 이 약을 수유 중 투여해서는 안된다.
7. 과량 투여시의 처치
계획된 과량투여(240 mg/day용량의 제한된 경험)와 관련해서 나타나는 증상들은 일시적이다. 에스오메프라졸 80 mg을 1회 투여한 경우 별다른 문제가 없었다. 특이적인 해독제는 알려져 있지 않다. 이 약은 난백결합율이 아주 높기 때문에 투석되지 않는다. 따라서 과량투여시 대조요법 및 일반 유지 요법을 사용하여야 한다.
8. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유자면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.
9. 전분가용 정보
(1) 임상시험정보
급성위염 또는 만성위염을 경험하고 있는 환자에서 이 약의 위양성 및 안전성을 평가하기 위한 무작위배정, 이중눈가림, 활성대조, 이중투여, 다기관, 비맹등성 3상 임상시험을 수행하였다. 시험약에스오메프라졸 10mg) 또는 대조약(비도민인 20mg)을 2주간 투여하며, 각 군의 투여 전/후 내시경 검사를 통해 투여 전 대비 2주 시점의 위염과 미린의 유효율을 평가하여 대조와 대비 비맹등함을 확인하였다.
표. 위염 환자에서 2주 투여후 미린의 유효율(%)

	시험약(N=147)	대조약(N=151)
미린의 유효율(%)	61.90(94)	59.60(90)
차이(시험약-대조약)에 대한 95% 신뢰구간	2.30[-8.78, 13.39]	
P-value	0.6841	

* 비맹등성 마진: 신뢰구간 하한의 -14% 이상

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관
【포장단위】 30정/병, 300정/병
【사용기한】 외부포장 참조

※ 본 의약품은 KGMPI의약품제조 및 품질관리기준)적격업체에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변태 또는 모순 제형은 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.daewonpharm.com)나 전화(080-487-8272) 이서 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr) 의약품정보를 참조하십시오. ※ 부작용 피해조사 신청: 한국약사약품안전관리원 (1644-8223) ※ 작성일자: 2021. 11. 30.

【제조판매업】
Daewon 대원제약
본사：서울특별시 성동구 천호대로 386
공장：경기도 화성시 함평읍 제양공단 1길 24