

성분 강화 고함량 기능성 비타민

메가비타민 B 프리미엄정

일반의약품

MVMI-001

활성형B₁ 포함 고함량 비타민 B군 6종 각 100mg 함유 비타민 B·C·D·E + 셀레늄·아연·코큐텐·UDCA 포함

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

■ 유효성분

벤포티아민(KP)	100.0mg(티아민염산염으로서 72.31mg)
리보플라빈(KP)	100.0mg
니코틴아미드(KP)	100.0mg
판토텐산칼슘(KP)	100.0mg
피리독신염산염(KP)	100.0mg
비오틴(USP)	0.1mg
폴산(KP)	0.1mg
시아노코발라민1000배산(KP)	100.0mg(시아노코발라민으로서 100μg)
이노시톨(KP)	100.0mg
클린타르타르산염(DAB)	100.0mg

■ 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)

■ 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성이산화규소, 맵실드갈색(29B061), 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

【성상】

갈색의 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】

■ 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, D, E의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하, 발육기, 노년기

■ 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방, 각기, 눈의 피로

- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입고리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

■ 아연의 보급

【용법·용량】

만 8세 이상 및 성인: 1회 1정, 1일 1회 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자

2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

3) 만 12개월 미만의 젖먹이

4) 신장(콩팥)결석

5) 심한 증상의 신부전 환자

6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

7) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

8) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

아스코르브산과립97%(별규)	103.1mg(아스코르브산으로서 100mg)
산화아연(KP)	31.2mg(아연으로서 24.96mg)
도코페롤아세테이트 2배산(KP)	80.0mg(비타민E로서 40IU)
셀레늄함유건조효모(KP)	9.23mg(셀레늄으로서 4.98μg)
클레칼시페롤농축물(분말형)(EP)	10.0mg(비타민D로서 1000IU)
산화마그네슘(KP)	30.0mg(마그네슘으로서 18mg)
감마-오리자놀(KP)	10.0mg
유비데카레논(KP)	10.0mg
우르소데옥시콜산(KP)	10.0mg

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이

3) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)

4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아: 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

5) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자

6) 심장·순환기계기능 장애 환자

7) 신장(콩팥)장애 환자

8) 저단백혈증 환자

9) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자

10) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

11) 임부

12) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사, 뉘은변, 변비, 위부불쾌감, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 담·호흡기 악취, 탈모, 조급증, 저혈압, 폐부종

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.

3) 에스트로겐을 포함한 경우 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.

4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.

5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

9) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

10) 우발적으로 과량복용 한 경우

11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.

3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.

5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제에 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【포장단위】 60정/병, 120정/상자(60정/병 X 2) 【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다. ※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오. ※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(<http://www.dkpharm.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품에 관한 의문사항은 동국제약(주) 소비자상담실(☎080-777-5678: 수신자 요금 부담)로 문의 주십시오. ※ 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

■ 제조의뢰자: 동국제약(주) 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19

■ 제조자: 한국코러스(주) 충청북도 제천시 강저로 30

설명서 최종 개정 연월일: 2022.02.23

Dongkook 동국제약