

규격	100x230
종이	70모조
접지	100x57.5
삼진기획	

전문 의약품

간장질환용제 우루리버정 200밀리그램 (우르소데옥시콜산)

HT-211216

Urliver Tab. 200mg

【원료약품 및 분량】 1정 중

유효성분 : 우르소데옥시콜산(JP) 200mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물<기원동물 : 소, 사육부위 : 우유>

기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 클로이드성이산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스

【성 상】 흰색의 원형 정제

【효능 · 효과】

- 담석증
- 원발 췌관 간경화증(Primary Biliary Cirrhosis: PBC)의 간기능 개선
- 만성 C형 간염 환자의 간기능 개선

【용법 · 용량】

1. 담석증 : 성인 우르소데옥시콜산으로서 1회 200 250밀리그램 1일 3회 경구투여한다(복용한다).
2. 원발 췌관 간경화증 : 성인 우르소데옥시콜산으로서 1회 200 300밀리그램 1일 3회 식사와 함께 경구투여한다(복용한다).
3. 만성C형 간염 : 성인 우르소데옥시콜산으로서 1회 200밀리그램 1일 3회 경구투여한다(복용한다). 필요시 1회 300밀리그램 1일 3회로 증량(양을 늘림)할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 이 성분에 과민증 환자
 - 2) 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자 (이담작용이 있으므로, 증상을 악화시킬 수 있다.)
 - 3) 전격성 간염 환자 (증상을 악화시킬 수 있다.)
 - 4) 방사선비투과성 석회화된 담석 환자
 - 5) 비기능성 담낭(쓸개)환자
 - 6) 급성 담낭(쓸개)염 환자
 - 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
 - 8) 소아
 - 9) 신질환 환자
 - 10) 소화성궤양 (급성 위 · 십이지장궤양) 환자 (점막자극작용이 있으므로, 증상을 악화시킬 수 있다.)
 - 11) 크론병과 같은 대장 및 소장염 환자
 - 12) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당 갈락토오스 흡수장애(glucose galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
 - 1) 경구용 당뇨병제(예 : 톨부타미드) : 다음 약물의 작용을 증가시킬 위험성이 있다.
 - 2) 콜레스티라민, 콜레스티폴, 약용탄, 마그네슘 및 수산화알루미늄을 함유하는 제산제 : 다음의 약물은 이 약의 흡수를 방해한다.
 - 3) 간에서 담즙으로 콜레스테롤 분비를 증가시키는 약물(예 : 에스트로겐 함유 경구용 피임제, 클로피브레이트와 같이 지질감소약품): 콜레스테롤성 담석형성을 촉진하기 때문에 이 약의 작용을 악화시킬 수 있다
 - 4) 간에 손상을 주는 약물
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 심한 체장(이자)질환 환자 (원 질환을 악화시킬 수 있다.)
 - 2) 담관(쓸개관)에 담석이 있는 환자 (이담작용이 있으므로, 담즙(쓸개즙)울체를 일으킬 수 있다.)
 - 3) 정맥류 출혈, 간성혼수, 복수(벧물), 갑자기 간 이식이 필요한 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 소화기계 : 때때로 설사, 묽은변, 구역, 구토, 식욕부진, 명치통증, 드물게 배아픔, 변비, 가슴쓰림, 위부불쾌감 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 2) 과민증 : 때때로 가려움증, 드물게 발진, 홍반(붉은 반점)(다형성출성 홍반(붉은 반점) 등) 등의 과민증상이 나타날 수 있다.
 - 3) 간질성폐렴 : 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 이상을 동반한 간질성 폐렴이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고, 의사, 치과의사, 약사와 상의한다.
 - 4) 기타 : 드물게 전신권태감, 현기(머지러움), 담석의 석회화, 간효소치의 증가(ALT, ALP, AST, γ GT), 백혈구 감소가 나타날 수 있다.
 - 5) 혈청 빌리루빈치의 상승 등이 있는 경우에는 복용을 중지하고, 의사, 치과의사, 약사와 상의한다.
5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 간경변기에서 고도의 황달이 있는 환자에 투여하는 경우에는 증상이 악화될 수 있으므로 신중하게 투여한다.
 - 2) 치료 중 혈장의 간효소치(ALT, ALP, AST, γ GT, 총 빌리루빈치)를 규칙적으로 검사한다.
 - 3) 과량투여로 인해 심각한 이상반응이 일어날 가능성은 적지만 필요한 경우 간기능 검사를 한다.
 - 4) 고령자(노인)에서 용량의 변경이 필요하다는 증거는 없지만 고령자(노인)는 일반적으로 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 적절한 예방이 고려되어야 한다.
 - 5) 담석증 : 담석이 용해되는 시간은 보통 6 24개월이기 때문에 12개월 후에도 담석이 작아지지 않으면 치료를 중단한다. 치료성과에 대해 6개월에 한번씩 린트겐이나 초음파로 검사한다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【포장단위】 30정/병, 100정/병

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(☎031 377 7909)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 한국휴텍스제약(주) 홈페이지(www.hutechs.co.kr) 또는 식물의약품 안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인해 주십시오.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(☎1644 6223, ☎14 3330)
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 이 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



한국휴텍스제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

우수의약품제조관리기준
KGMP 적격지정업체

설명서 작성일 : 211216