

15가지 비타민·미네랄 함유한 고함량 멀티비타민 렛잇비 프로

렛잇비프로정은 활성형 비타민B 3종을 함유하고 있을 뿐만 아니라 현대인들이 결핍되기 쉬운 항산화 성분(코큐텐, 셀레늄, 비타민E) 및 각종 영양소를 포함하고 있어 피로회복 및 영양소 보충에 효과적인 고함량 멀티비타민입니다.

특 장 점

1. 활성형 비타민B 3종 함유
2. 항산화 성분(코큐텐, 셀레늄, 비타민E) 및 UDCA, 마그네슘, 아연 등 영양소 함유
3. 비타민D 1일 1,000 IU 함유

효능·효과



**육체피로**  
몸이 나른하고  
자도 자도 피로하신 분



**근육통, 관절통**  
근육이 자주 뭉치고  
걸리시는 분



**뼈·이의 발육불량**  
비타민 부족으로 인해 뼈나 치아의  
회복, 성장이 더딘 분



**눈의 피로**  
컴퓨터에 스타트폰까지  
눈이 침침하고 피로하신 분

[원료약품 및 그 분량] - 1정 중 -

| [유효성분]                                 |       | [첨가제]             |       |
|----------------------------------------|-------|-------------------|-------|
| 벤포타이민(비타민B <sub>1</sub> )(KP)          | 100mg | D-비오틴(USP)        | 0.1mg |
| (티아민)염산염으로서 72.31mg)                   |       | 폴산(엽산)(KP)        | 0.1mg |
| 리보플라빈부타레이트(비타민B <sub>2</sub> )(KP)     | 12mg  | 신엽아연(KP)          | 20mg  |
| 니코틴아마이드(비타민B <sub>3</sub> )(KP)        | 10mg  | (아연으로서 16mg)      |       |
| 판토텐산칼슘(비타민B <sub>5</sub> )(KP)         | 50mg  | 우르소데옥시콜산(USP)(JP) | 10mg  |
| 피리독살포스페이트수화물(비타민B <sub>6</sub> )(KP)   | 5mg   | 충족량(비타민D)(KP)     | 10mg  |
| 시아노코발라민1000배수(비타민B <sub>12</sub> )(KP) | 50mg  | (비타민D로서 1,000 IU) | 30mg  |
| (시아노코발라민으로서 50µg)                      |       |                   |       |

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 D, E, B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub>의 보급  
- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력자하시 - 발육기 - 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.  
- 뼈, 이의 발육불량 - 구루병의 예방 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요하리통), 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 - 각기 - 눈의 피로
3. 아연의 보급

[용법·용량] 만8세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 복용하십시오.

\* 비타민B군의 함량이 높아 빈 속에 복용 시 일시적으로 속쓰림, 미식거림 등이 있을 수 있으나 식사 후 바로 복용하세요.

[성상] 담황색의 정방형 필름코팅정

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.  
1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자분, 유육종증(sarcomatosis: 원인을 알 수 없는 전신 염종결핵), 신장(콩팥)질환 환자분 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자분 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장(콩팥)결석 환자분 5) 심한 충상의 신부전 환자분 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자분에게는 투여하면 안 됩니다. 7) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자분 8) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자분
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.  
1) 인산염, 칼슘염, 경구약, 복용하는 용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.  
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자분 2) 일부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 마약, 유아 ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘 혈증을 일으킬 수 있습니다. 3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는 대장염) 등의 위장질환 환자분 4) 신장-순환기계기능 장애 환자분 5) 신장(콩팥)장애 환자분 6) 저단백혈증 환자분 7) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자분 8) 일부 9) 만 1세 미만의 젖먹이 10) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이 11) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해당(아자)염 등 대장질환 이상 환자분 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자분
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.  
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진(출혈되어 붉어짐), 묽은 변, 식욕부진, 복부(배부)팽만감, 붉은 비점, 부전속(상장동정지), 중추신경계 기능장애, 피부염, 딸, 호흡기 약화, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부)통증, 저혈압, 폐부종(부기) 2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예전보다 빨리되거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구약은 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자분이 비타민 D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다. 4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다. 5) 폴산이 부족한 환자분에게 비타민 B<sub>12</sub>를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다. 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia: 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다. 7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 8) 항알도스테론제, 트리암테네과 병용함께 복용하여 시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 9) 우월적으로 과량복용한 경우 10) 개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항  
1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오. 2) 요로 황색으로 변하게 하여 임상검사에서 영향을 줄 수 있습니다. 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전후에는 피하십시오. 4) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오. 5) 자방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자분에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자분이 다른 정중용 자질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어있는 자질의 양을 고려하여 그 자질제의 투여량을 감소해야 합니다.

[저장상의 주의사항]

1. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2. 직사광선을 피하고 밀 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
3. 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관 하십시오. [포장단위] 60정/병, 120정/상자(60정/병 x 2)

[사용기간] 제조일로부터 24개월입니다.

- \* 내부 포장에 파손되어 있으면 복용하지 마십시오.
- \* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지나거나 변질, 변색, 오염되었거나 손상된 의약품은 공장거래위원회의 고시(소자)자 분해(해결)기준에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
- \* 이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308-9)에서 확인할 수 있습니다.
- \* 부작용보고 및 피해구제신청: 한국약물관리안전관리원(14-3330, 1644-6223)

제조사: (주)대웅제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14



(주)대웅제약  
경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14

작성 연월일 : 2021.12.20

H00  
2301032