



웨스탈®

슈퍼자임®

소화불량
위부팽만
식체·과식
속쓰림



종합소화제

일반의약품

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

[특징]

웨스탈 슈퍼자임은 소화를 돕는 5가지 복합 성분을 함유한 종합소화제입니다.
비동물성 성분의 소화효소제 - 탄수화물, 지방, 단백질 소화에 효과를 나타냅니다.^{1,2}
제산제 산화마그네슘 - 위산을 중화시켜 속쓰림을 완화하는 효과를 나타냅니다.¹
가스제거제 시메티콘 - 위와 장의 가스를 제거해 줍니다.¹
웨스탈 슈퍼자임은 건위제 당약가루와 점막수복제 수용성아줄렌을 함유하고 있습니다.

[참고문헌]

- 1 Alison Brayfield, BPharm, MRPharmS. Martindale The Complete Drug Reference 38th Edition. Pharmaceutical Press. 2014.
- 2 Singh AK, Mukhopadhyay M. Appl Biochem Biotechnol. 2012 Jan;166(2):486-520.

[원료약품 및 그 분량] 1정(709mg) 중,

- 유효성분: 리파제(KP).....30mg
프로자임(KP).....35mg
디아스타제·프로테아제·셀룰라제(KP).....60mg
시메티콘(USP).....30mg
산화마그네슘(JP).....60mg
수용성아줄렌(KP).....1mg
당약 가루(JP).....8.333mg
- 첨가제: 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스카멜로오스나트륨, 콜로이드성이산화규소, 히프로멜로오스, 산화티탄, 유드라짓 이피오레딕스 클리어 390.05, 규화미결정셀룰로오스



[성상]

하얀색의 달걀형 필름코팅정



[효능·효과]

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 위부팽만감, 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 구역, 구토, 위통, 신트림



[용법·용량]

성인 1회 1-2정, 소아(만 8세~만 15세미만) 1회 1정
1일 3회



[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 만 7세 이하의 어린이
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 신장장애 환자
2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
2) 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것
5. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[포장단위] 12정/상자(6정/PTP X 2)



[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나, 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 본사 또는 영업소를 통해 교환하여 드립니다. 일반소비자의 경우에는 구입한 약국을 통해 교환하시기 바랍니다.

이 첨부문서의 문안작성(개정)년월일 (2022.02.14) 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.handok.co.kr>) 제품소개에서 제품명을 클릭하거나 전화번호 02-527-5114으로 문의하셔서 확인하실 수 있습니다.

문안작성(개정)년월일 : 2022.02.14

[제조사] (주) 한독

충청북도 음성군 대소면 대풍산단로 78

[판매자] (주) 한독

서울특별시 강남구 테헤란로 132