

SGLT2 억제 당뇨병 치료제

## 다파메트®

(다파글리플로진·다스·프롤린 / 메트포르민염산)

전문약품

서방정

10/500mg

---

**원료약품 및 용량** 1회 용량

- 유효성분 : 다파글리플로진·다스·프롤린(염기) ..... 15.3mg (다파글리플로진으로서 10mg)
- 메트포르민(염기)(염산염) ..... 500.00mg
- 함량제(동등유량제) : 무수물(다스, 무수물)
- 기타 첨가제 : 규산, 셀룰로오스, 스티라신산하이드레이트, 오파드라이트(분쇄제)
- (85F94333) : 이산화규소, 지질화제, 하이드록시프로필셀룰로오스, 히프록셀로스

**특성**

분출속의 양면이 불룩한 다각형의 필름코팅

---

**효능**

이제는 다파글리플로진과 메트포르민의 병용투여가 적합한 성인 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 향상시키기 위해 사용되며 모든 유형의 당뇨병에서 사용된다.

혈당이 충분히 조절되지 않는 제2형 당뇨병 환자 중 심혈관계 질환이 확인되었거나 심혈관계 질환이 없는 환자는 심혈관계 사건 발생에 대한 다파글리플로진의 영향은 사용상의 주의사항 13. 전초기를 위한 정보, 2 임상시험 정보 항목을 참고한다.

**효과**