

M36246②

전문의약품

안전한 경구용 항응고제

자렉스®

정 2.5mg

(리바록사반(미분화))

XAREX Tab. 2.5mg

【원료약품의 분량】이 약 1정 중

유효성분：리바록사반(미분화)(별규)…………… 2.5mg
첨가제(동등유물)：유당수화물(기원동물：소, 사용부위：우유), 스테아르산아그네슬(기원동물：소, 사용부위：우지, 기원동물：돼지, 사용부위：돈지)

가짜참가제：미정정셀룰로오스, 오파라이트II 85F22093 노반색, 크로스카르멜로오스나트륨, 라우릴황산나트륨, 히드록셀로오스

【상상】밝은 노란색의 원형 필름코팅형

【효능·효과】

- 심장표지자(cardiac biomarker) 상수를 동반한 급성관상동맥증후군을 경험한 환자에서 아스피린과의 병용 혹은 아스피린 및 클로피도그렐과 병용투여 시 즉상동맥혈전성 사건(심혈관계 이상으로 인한 사망, 심근경색)의 발생률 감소
- 혈전성 사건의 발생 위험성이 높은 관상동맥질환 성인 환자에서 아스피린과 병용하여 즉상동맥혈전성 사건(뇌졸중, 심근경색 및 심혈관계 이상으로 인한 사망)의 위험 감소

【용법·용량】

이 약은 식사와 관계없이 투여한다.

1. 성인

- 심장표지자(cardiac biomarker) 상수를 동반한 급성관상동맥증후군을 경험한 환자에서 아스피린과의 병용 혹은 아스피린 및 클로피도그렐과 병용투여 시 즉상동맥혈전성 사건(심혈관계 이상으로 인한 사망, 심근경색)의 발생률 감소
이 약의 권장용량은 1일 2회, 1회 2.5mg이다. 환자는 아스피린 1일 75~100mg 또는 1일 아스피린 75~100mg과 클로피도그렐 75mg을 이 약과 함께 복용해야 한다.
최소 24개월의 치료기간 권장된다. 급성관상동맥증후군을 경험한 환자는 심혈관계 증상의 위험이 지속되므로, 투여 기간의 연장시 유의할 수 있다.
급성관상동맥증후군의 사건이 안정화한 이후(혈전재형성 포함) 가능한 빠른 시기에 이 약 2.5mg으로 치료를 시작해야만 한다. 빠른편 입원 후 24시간 후에 투약을 시작하고, 비경구용 항응고요법이 정상적으로 중단되었을 때 시작해야한다.

- 관상 동맥 질환(CAD) 또는 말초 동맥 질환(PAD)
이 약의 권장 용량은 1일 2회, 1회 2.5mg이며, 아스피린 1일 75~100mg을 이 약과 함께 복용해야 한다.
이 약의 투여 지속기간은 개별 환자의 상태를 정기적으로 평가하여 결정하여야 하며, 혈전성 사건 대비 출혈의 위험성을 고려하여야 한다.
이 약 투여 중, 급성 혈전성 사건이 발생하거나 혈관 시술을 받은 환자 그리고 이중 항혈소판 요법(dual antiplatelet therapy)이 필요한 환자는 항혈소판 요법 및 혈전성 사건 또는 혈관시술의 종류에 따라 이 약 2.5mg 1일 2회 또는 지속여부를 평가해야 한다.
이 약과 아스피린 및 클로피도그렐의 병용투여에 대한 유효성과 안전성을 급성관상동맥증후군 환자에서만 연구되었다. 관상동맥질환 또는 말초동맥질환 환자에서 이중 항혈소판 요법과 이 약의 병용투여는 연구되지 않았다.
- 이 약의 복용을 잊었을 경우
만약 이 약의 복용을 잊었을 경우, 예정된 다음 복용시점에 권장 용량인 2.5mg으로 복용을 지속한다. 놓친 용량을 보충하기 위하여 1일 투여용량이 권장용량의 두배가 되어서는 안된다.

2. 약물의 전환

- 비타민 K 길항제에서 이 약으로의 전환
용량이 상한 입이 이 약을 복용한 후 INR 값이 거짓으로 올라갈 것이다. INR은 이 약의 항응고활성을 측정하기에 적당하지 않으므로 사용되어서는 안 된다.
- 이 약에서 비타민 K 길항제로의 전환
이 약에서 비타민 K 길항제로 바꾸는 동안 부적절한 항응고가 일어날 수 있다. 다른 항응고제로 바꾸는 동안에는 계속적으로 항응고가 적절히 유지되어야한다. 이 약은 INR 상승에 영향을 줄 수 있는 것을 유의해야 한다. 이 약에서 비타민 K 길항제로 바꾸는 환자는 INR≥2.0 이 될 때까지 비타민 K 길항제를 같이 투여해야 한다. 전환 후 첫 2일 동안에는 비타민 K 길항제의 표준 용량을 투여하고 이후 INR 감사를 해 따른 비타민 K 길항제의 용량을 투여해야 한다.
반면 이 약과 비타민 K 길항제를 같이 투여받고 있는 환자는 이 약 복용 후 24시간이 경과될 때까지 INR 감사를 해서는 안 된다. 일단 이 약을 중단할 경우에는 마지막 복용 24시간이 지난 후에는 INR 감사를 할 수 있다.
- 비경구 항응고제에서 이 약으로의 전환
비경구 항응고제를 투여하고 있는 환자에게는 다음 예정된 비경구제제(예, 저분자헤파린)의 투여시간으로 부터 0~2시간 전이나, 계속적으로 투여하고 있는 비경구제제(예, 정제된 미분헤파린)를 중단한 시점에 이 약의 투여를 시작한다.
- 이 약에서 비경구 항응고제로의 전환
이 약을 중단하고, 이 약의 다음 복용시점에 비경구 항응고제의 투여를 시작한다.

3. 신장애 환자

- 크레아티닌 청소율 50~80 mL/min인 경증의 신장애 환자에서는 용량조절이 필요하지 않다. 크레아티닌 청소율 15~50 mL/min 미만인 중등 신장애 환자에 대한 임상적 평가 없으므로 이 약의 투여는 권장되지 않는다.
1) 심장표지자 상수를 동반한 급성관상동맥증후군을 경험한 환자에서 아스피린과의 병용 혹은 아스피린 및 클로피도그렐과 병용투여 시 즉상동맥혈전성 사건(심혈관계 이상으로 인한 사망, 심근경색)의 발생률 감소
중증도의 신장애 환자(크레아티닌 청소율 30~49 mL/min)에서는 용량조절이 필요하지 않다. 중증의 신장애 환자(크레아티닌 청소율 15~29 mL/min)에 대한 제한적인 임상시험에 따르면 이 약의 혈중 농도가 유의적으로 증가하였으므로 이 약은 주의해서 투여한다.

4. 간장애 환자

이 약은 혈응고장애와 관련한 간질환 환자와 중증도(Child Pugh B) 및 중증(Child Pugh C)의 간장애 환자에 대해서는 투여를 피한다. 이러한 환자에서 이 약의 노출증가 및 출혈위험의 증가가 나타날 수 있다.

5. **정제명, 삽입 시 없는 환자의 경우**, 사용 직전에 이 약을 부수어 물 또는 사과소스와 같은 음료와 섞어서 경구로 투약할 수 있다. 또한 이 약을 부수어 위장관 투부를 통해 소량의 물과 함께 투약 할 수 있다. 이 약을 위장관 투부로 투약하기 전에 투약가 제제로 위치하고 있는 지 확인해야 하고, 투부를 물로 세척한 후에 투여해야 한다.
【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 다른 항응고제와 마찬가지로, 이 약을 복용하는 환자에서 출혈의 징후에 대해 주의깊게 관찰해야 한다. 이 약은 출혈 위험이 증가된 경우 주의하여 투여한다.
- 중증의 출혈이 나타나는 경우 이 약의 투여를 중단한다(10. 과량투여시의 처치*참고). 이 약의 치료시 정기적인 노출의 모니터링이 필요하지는 않다. 그러나, 예외적인 경우 이 약의 노출증가가 임상적 결정(예, 과량투여 및 응급수술)에 도움이 되는 경우 anti-Factor Xa 정량 분석이 유용할 수 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 이 약의 구성분 또는 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 임상적으로 유의한 출혈 환자(예, 두개내 출혈, 위장관 출혈)
- 혈응고장애와 관련한 간질환 환자와 Child Pugh B 및 C 등의 임상적으로 의미있는 출혈 위험성과 관련한 간질환 환자
- 임부 및 수유부
- 이 약은 용량을 동일하고 있으므로, 갈락토오스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍증 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 등의 유전적인 문제가 있는 환자에서는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 질환으로 인하여 출혈 위험성이 증가된 환자
① 최근의 위장관 괴양 병변
② 최근의 두개내 또는 뇌내 출혈 병변
③ 척수내 또는 뇌내 혈관질환
④ 최근의 뇌, 척수 또는 안과 수술 병변
⑤ 최근의 뇌 또는 척수 손상
⑥ 식도정맥류가 있거나 의심되는 경우
⑦ 동정맥기형(arteriovenous malformations)
⑧ 혈관성 동맥류(vascular aneurysms)
⑨ 출혈 위험이 높은 악성 종양(neoplasms)이 있는 환자
- 다른 항응고제의 병용치료: 비분획 헤파린(Unfractionated Heparin, UFH), 저분자량 헤파린(eno xaparin, dalteparin 등), 헤파린 유도제(fondaparinux 등), 경구용 항응고제(warfarin, apixaban, dabigatran 등) 등의 다른 항응고제와 병용치료 받는 경우. 단, 이 약과 서로 전환하는 경우 비분획 헤파린(UFH)을 개방 중심 정맥 또는 동맥 카테터(patient central venous or arterial catheter)를 사용하기 위해 투여하는 경우 제외함
- 급성관상동맥증후군 치료시 뇌졸중 또는 일과성허혈성 발작의 병력이 있는 환자에서의 항혈소판제와의 병용

3. 다음 환자에는 신중하게 투여한다

- 신장애 환자(크레아티닌 청소율 15~49 mL/min)에서 P-gp 억제 및 경쟁-중증도의 CYP3A4 억제 효과가 있는 약물을 병용투여할 경우 이 약의 혈중 농도 상승으로 인하여 출혈 위험성이 증가되므로 주의 하여 투여하며, 이 약 투여시의 임상적 유의성인 출혈에 대한 위험성을 상회하는 경우에만 투여하도록 한다.
- 다른 항응고제와 마찬가지로 다음과 같은 질환으로 인하여 출혈 위험성이 증가된 환자
① 선천적 또는 후천적 출혈성 질환
② 잘 조절되지 않는 중증의 동맥성 고혈압
③ 활동성 궤양성 위장관 질환
④ 혈관성 망막병증
⑤ 기관지확장증이나 폐혈액 병변
⑥ 비스테로이드성염증제(NSAIDs), 혈소판 응집 억제제, 다른 항응고제 또는 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI) 및 세로토닌 노르에피네프린 재흡수 억제제(SNRIs)와 같이 지혈 작용에 영향을 주는 약물을

병용투여하는 환자

- 아스피린 혹은 아스피린 및 클로피도그렐과 이 약을 병용투여하고 있는 환자에서의 비스테로이드성염진통제(NSAIDs) 투여는 출혈 위험성이 증가되므로 주의해야하며, 이 약 투여시의 임상적 유의성이 출혈에 대한 위험성을 상회하는 경우에만 투여한다.

4. 이상반응

- 이 약에 대한 안전성은 아래 표와 같이 53,103명의 환자가 포함된 13개의 3상 임상상을 통해 평가되었다. 전체 자별도 3상 임상에서의 환자 수, 1일 투여용량, 최대 투여 기간은 아래와 같다.

처용증	환자수*	1일 투여용량	최대투여 기간
술판절 또는 고관절 치환술을 받은 성인 환자의 정맥혈전색전증 예방	6,097명	10mg	39일
의학적으로 아픈 환자에서의 정맥 혈전색전증의 예방	3,997명	10mg	39일
신생성 정맥혈전증 또는 폐색전증의 치료 및 재발 예방 감소	6,790명	1~ 21일째: 30mg 22일째부터: 20mg 최소 6개월 투여 후: 10mg 또는 20mg	21개월
비만관성 심장증후 환자에서 뇌졸중 및 전신 색전증의 위험 감소	7,750명	20 mg	41개월
급성관상동맥증후군(ACS)을 경험한 환자 에서 즉상동맥혈전성 사건의 발생률 감소	10,225명	5mg 또는 10mg 아스피린 과의 병용 혹은 아스피린 및 클로피도그렐 또는 티클로피딘과 병용 투여	31개월
관상 동맥 질환(CAD) 또는 말초 동맥 질환 (PAD) 환자에서 아스피린과 병용 시 즉상동맥혈 전성 사건의 위험 감소	18,244명	아스피린 100mg과 5mg의 병용 또는 10mg 단독 투여	47개월

* 적어도 한 번 이상 리바록사반을 투여받은 환자

- 이 약은 그 약리학적 작용기전으로 인하여 출혈 후 반응을 초래할 수 있는 모든 조직과 장기에서의 잠재출혈이 혈전출혈의 위험성 증가와 관련이 있을 수 있다. 출혈위험은 특정 환자군, 즉, 조절되지 않은 심한 동맥성 고혈압 및/또는 지혈에 영향을 미치는 병용투여 중인 환자군에서 증가할 것이다. 그 징후, 증상 및 정도(징후적인 결과를 포합)는 출혈 및/또는 빈혈이 발생하는 위치와 정도에 따라 다르다. 출혈성 합병증은 허혈성, 장폐합, 이차리음, 두통 또는 심정지 없는 부종, 요요근관 그리고 선명되지 않는 소크로 나타날 수 있다. 빈혈의 결과로서 때때로 흉통 또는 협심증과 같은 심장학혈성 증상이 관찰되었다. 편류 저하로 인한 구혈증후군, 신부전과 같은 중증의 출혈 이후 이차적으로 나타나는 것으로 알려진 합병증이 보고되었다. 그러므로 항응고제를 투여받은 환자에서 환자의 상태를 평가할 때 출혈 가능성이 고려되어야 한다.
- 이 약과 관련된 이상 반응은 아래 표와 요약되어 있다. 각각의 빈도 내에서, 이상반응은 중증도가 감소되는 순으로 나타내었다. 빈도는 "매우 흔하다(≥1/10), 흔하게(≥ 1/100 이고) (1/10), 흔하지 않게(≥ 1/1,000 이고 < 1/100), 드물게(≥ 1/1,000 이고 < 1/1,000)"으로 정의된다. 표1, 3상 임상연구에서 보고된 이 약과 관련된 이상반응

분류	흔함	흔하지 않음	드물
혈액 및 림프계	빈혈 (임상검사치 포함)	혈소판증가증 (혈소판 수 증가 포함)A	빈맥
신장계			
인구	인구 출혈 (결막 출혈 포함)		
위장관계	지은출혈 위장관계 출혈 (직장출혈 포함) 위장통, 복통, 소화불량, 구역, 변비A, 설사, 구토A	구강 건조	
일반적인 증상 및 투여부위	발열A, 말초 부종 전신적인 힘과 에너지 감소 (머리, 무력증 포함)	불면감 (편태상 포함)	국소 부종A
간담도계		간장애	황달
면역계		알레르기성 반응, 알레르기성 피부염	
순상, 증독 및 치료합병증	치료 후 출혈 (수술 후 빈혈, 상처부위 출혈 포함)타박상	상처부위 분비물A	혈관 기능장애B,C
실험실적 수치지		혈중 빌리루빈 증가, 알칼리성 포스파타제 증가A LDH 증가A, 리파아제 증가A, 아밀라제 증가A 전이효소(GGT) 증가A	빌리루빈 포화제 증가 (ALT 증가 여부에 관계 없이)
근골격계 및 결합조직	사지 통증A		근육출혈
신경계	어지러움, 두통	뇌 및 두개 내 출혈, 실신	
산장 및 비호기계	비노생식기계 출혈 (혈소, 월경증다* 포함) 신장계(혈중 크레아티닌 증가, 혈중 요소 증가 포함)A		
호흡계	비출혈 객혈		
피부 및 피하조직	가려움(흔하지 않게 전신성 소양증 포함), 발진, 반상출혈, 피부 및 피하 출혈	두드러기	
혈관계	혈압하 혈통		

A: 하지의 주요 정맥외과 수술 후의 정맥혈전색전증 예방에 관찰됨
B: 55세 미만 여성의 심부정맥혈전색전증 및 폐색전증의 치료와 재발 위험 감소에서 매우 흔하게 관찰됨.
C: 경피중재술 이후의 급성관상동맥증후군의 예방 요법 시 흔하지 않게 관찰됨.

4) 국외 시판후 조사

다음 이상반응들이 이 약의 투여와 관련 되어 보고되었다.

면역계：혈관부종 및 알러지성 부종, 아나필락시스 쇼크를 포함한 아나필락시스 반응

간담도계：담관증후, 간염(간세포손상 포함)

혈액 및 림프계：혈소판감소증, 무작립구증
피부 및 피하조직：스티븐스-존슨증후군/독성피피피사용례, 호산구증 및 전신성상을 동반한 약발반응 (DRESS)

5) 국내 시판 후 조사 결과

- 국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 3,007명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 3.43%(103/3,007, 총 126건)로 보고되었다. 이 중 중대한 이상사례의 발현율은 0.20%(6/3,007명, 10건)로 빈혈 0.07%(2/3,007명, 2건), 관혈통, 발열, 상체불명의 출혈, 수술후혈종, 심근경색증, 출혈성심지자경화, 혈변, 흑색변 각 0.03%(4/3,007명, 1건)로 보고되었다. 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 이상사례는 0.13%(4/3,007명, 총 7건)로 발열, 빈혈, 상체불명의출혈, 수술후혈종, 출혈성심지자경화, 혈변, 흑색변 각 0.03%(1/3,007명, 1건)이 보고되었다. 예상하지 못한 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 0.57%(17/3,007명, 총 18건)로 보고되었으며, 심부정맥혈전증 0.13%(4/3,007명, 4건), 관혈질환, 관혈통, 뇌능상차감, 빈진두염, 심근경색증, 심근병증, 신장요소증각, 열혈종증, 울혈성심부전, 요로감염, 위장상대염, 전식, 폐부종, 흉막삼출 각 0.03%(1/3,007명, 1건)로 조사되었다. 이 중, 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 이상사례 발현율은 0.07%(2/3,007명, 총 2건)로 심부정맥혈전증, 열혈종증 각 0.03%(1/3,007명, 1건)가 보고되었다.
- 재심사 이상사례 분석평가 결과
이 약에 대한 국내 재심사 이상사례 및 자발적 부작용 보고자료를 국내 시판 허가된 모든 의약품에 대상으로 보고된 이상사례 보고자료와 재심사 종료시점에서 통합평가한 결과, 다른 모든 의약품에서 보고된 이상사례에 비해 이 약에서 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례 중 새로 확인된 것들은 다음과 같다. 다만, 이 결과가 해당분과 다음의 이상사례간의 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
• 대사 및 영양계: 당뇨병
• 심장계: 심장재증, 심부전, 심장정지
• 혈관계: 뇌경색
• 호흡계: 기체질환, 전식, 후두염

- 소화기계: 연하곤란, 장운동장애
- 근골격계: 골절, 관절염, 관절병증, 횡단근통
- 비노생식기계: 요로감염, 비노질환, 신결석, 방광암종, 전립선과형성
- 전신 및 투여 부위 이상: 독감유사증후, 약물관련만증, 스티븐스-존슨증후군

5. 일반적 주의

- 중증의 신장애 환자(크레아티닌청소율 30 mL/min 미만)는 리바록사반의 혈중 농도가 유의적으로 상승 (평균 1.6배) 하여 출혈 위험이 높아질 수 있다.
- 임상시험에서 장기간 투여시 리바록사반 투여군은 비타민 K 길항제 투여군에 비해 점막출혈(출혈성, 잇몸, 위장관, 비노생식기 등) 및 빈혈이 더 자주 발생하였다. 이 약 투여시 적절한 임상적인 평가와 함께 헤모글로빈/헤마토크릿 검사를 통해 출혈 유무를 평가하는 것도 좋은 방법이 될 수 있다. 출혈 위험이 있는 환자군(3. 신증투여*참고)에서 출혈의 증후 및 증상과 빈혈에 대해 주의깊게 모니터링해야 한다. 원인이 불명확한 헤모글로빈 또는 혈압의 저하가 있을 경우 출혈부위를 찾아야 한다.
- 이 약을 복용하는 환자에게 출혈성 합병증이 나타난다면, 다음번 복용을 늦추거나 적절한 치료를 중단해야 한다. 이 약은 대략 5 ~ 13시간의 반감기를 가진다. 출혈에 대한 관리는 식다도와 부위에 따라 개별화되어야 한다. 물리적 압박 (예, 중증의 비출혈 경우), 출혈 조절 시술을 포함한 외과적 지혈, 제제대체 및 혈액학적 보충, 혈액 제품 (관련 빈혈 또는 응고장애 따라 농축혈혈구 또는 신선 동결 혈장) 또는 혈소판과 같은 적절한 증상치료가 필요에 따라 사용될 수 있다. 위의 방법으로 출혈이 조절되지 않는 경우, 프로트롬빈 복합 농축액 (Prothrombin complex concentrate, PCC), 활성 프로트롬빈 복합 농축액 (Activate PCC, APCC), 제조한 인자 VIIa와 같은 특정한 procoagulant reversal agent가 고려되어야 한다. 그러나 현재는 이 약을 투여 받은 환자들에게 이러한 제품을 사용한 매우 제한적인 임상경험만 있다.
- 아스피린 단독 혹은 아스피린 및 클로피도그렐과 병용투여하고 있는 급성관상동맥증후군 환자 중 75세 이상의 고령자 또는 체중이 60kg미만인 환자에서 이 약 투여시 주의해야 한다.
- 이 약은 고관절 골절 수술 환자에서의 안전성, 유효성 평가를 위한 중재적 임상시험 수행경험이 없으므로, 이러한 환자에 투여하는 것은 권장되지 않는다. 고관절 골절 수술을 포함한 하지에 관련된 골절 수술 환자에 대한 비-중재 연구에서 임상자료는 제한적이다.
- 신장측(경막외/척수) 마취 또는 요추천자를 받은 환자가 선택된절 발병을 막기 위해 항혈전제투여를 받은 경우, 경막외 혹은 척수 혈종의 위험성이 증가하고 장기적인 마취 증상이 나타날 수 있다. 이러한 위험은 경막외 유지 카테타나, 지혈에 영향을 미치는 약물 사용시 더 증가될 수 있다. 이상성 또는 빈번성 경막외 또는 요추천자 등에 대해 중화할 수 있다. 신장 장애의 징후나 증상(다리의 저림 또는 허약감, 방광 또는 장 기능 장애 등)에 대해 자주 모니터링해야 하고, 이러한 증상이 발전되면 즉각적인 진단과 시도가 필요하다. 의사는 항응고 치료를 받거나 받을 환자에게 신장측 시술을 하기 전에 위험성 대비 유의성에 대해 고려해야 한다.

이 약 투여와 신장측(경막외/척수) 마취 또는 요추천자를 행하는 경우에는 잠재적 출혈 위험을 감소시 키기 위해 이 약의 약동학적 양상을 고려해야 한다. 카테터 삽입 또는 제거, 또는 요추천자를 이 약의 항응고 효과가 낮아졌을 것으로 추정되는 때에 수행하는 것이 바람직하다. 그러나 기계적 환자에서 항응고 효과가 충분히 오래인 정당한 시점으로 알 수 없다.

- 10mg: 이 약 10mg은 최종 투여 후 최소 18시간이 경과된 이후에 경막외 카테타를 제거한다. 카테타를 제거한 후에는 최소한 6시간이 경과된 후에 다음번 투여를 시작한다. 천자 중 위상이 발현한 경우는 최소한 24시간 동안 이 약을 투여하지 않는다.
- 15, 20mg: 이 약 15, 20mg은 신장측(경막외/척수) 마취 또는 요추천자를 받은 환자에서 임상적 투여 경험에 없다. 이 약 15, 20mg은 이 약의 약동학적 특성을 고려하여 최종 투여 후 반감기의 최소 2배 이상(예를 들어 성인환자의 경우 최소 18시간, 고령환자의 경우 최소 26시간)이 경과된 이후에 경막외 카테타를 제거한다. 카테타를 제거한 후에는 최소한 6시간이 경과된 후에 다음번 투여를 시작한다. 천자 중 위상이 발현한 경우는 24시간 동안 이 약을 투여하지 않는다.
- 2.5mg: 이 약 2.5mg은 신장측(경막외/척수) 마취 또는 요추천자를 받은 환자에서 아스피린과 병용 또는 아스피린 및 클로피도그렐과 병용한 임상적 투여 경험이 없다. 이 경우 혈소판 응집 억제제는 해당 침부 문서에 지시된 대로 투약이 중지 되어야 한다.

- 폐양성 위장관 질환을 가진 환자에게는 적절한 예방요법이 고려될 수 있다.
- 침습적 또는 외과적 시술이 요구되는 경우, 이 약 10, 15및 20mg은 의사의 임상적 판단에 근거하여 가능하면 적어도 시술 24시간 전에 2.5mg은 적어도 12시간 전에 중단되어야 한다. 혈소판응집억제제를 병용하는 환자가 수술이 예정되어 있고(elective surgery) 항혈소판 효과가 필요하지 않은 경우 혈소판 응집 억제제는 해당 침부 문서에 지시된 대로 투약이 중지 되어야만 한다. 만약 시술이 지연될 수 있다면, 출혈 위험 증가는 시술의 위급성에 대비하여 평가되어야 한다. 이 약은 침습적 또는 외과적 시술 이후 임상적 상황이 허위하고 적절한 지혈이 이루어진다면 가능한 빨리 재투여되어야 한다.
- 비만관성 심장증후 환자에서 적절한 대체 항응고요법 없이 이 약을 중단한 경우 혈전증의 위험이 증가한다. 이 약을 병용하던 출혈 위험이 아닌 다른 사유로 중단시 다른 항응고제의 투여를 고려해야 한다.
- 임공상징관약을 가진 환자에 대한 안전성-유효성이 확립되어 있지 않다. 따라서, 이러한 환자에게는 투여는 권장되지 않는다. 저혈당와 항 혈소판 요법을 비교한 무작위화적, 대조 임상시험이 따르면, 최근에 대동맥 박막 치환술(TAVR)을 받은환자에게 이 약은 혈전증 예방 목적으로 권장되지 않는다. 상기 임상시험의 리바록사반 투여 군에서 사망이나 혈전색전증 사건, 생명을 위협하거나 장애를 일으킬 수 있는 출혈 또는 주요 출혈의 위험이 상대적으로 높게 관찰되었다.
- 혈액학적으로 불안정한 폐색전증 환자 및 혈전색해제 혹은 폐색전절제술이 필요한 환자에서 안전성-유효성이 확립되지 않았다. 따라서, 이 약은 이러한 환자에서 미분획 헤파린에 대한 대체요법으로 권장되지 않는다.

- 급성관상동맥증후군 환자에서 이 약은 아스피린 단독 또는 아스피린과 클로피도그렐과의 병용투여는 연구되었으나, 다른 항혈소판제(예, 프라쿠르, 타그-트렐라 등)와의 병용투여는 연구되지 않았으므로 이 약과의 병용투여는 권장되지 않는다. (2.5mg 참조)
- 심음동전환(cardioversion)이 필요한 환자에게 이 약 투여를 시작하거나 계속할 수 있다. 이전에 항응고 치료로 받은 적이 없으면, 경식도 심음동전환(transesophageal echocardiogram)하에 적절한 항응고를 위하여 적어도 심음동전환 4시간 이전에 이 약 투여를 시작해야 한다. 모든 환자에 대하여, 심음동전환 이전에 이 약을 처방한다면도 복용중지하지 않아야 한다. 치료 시작시기와 기간을 결정할 때, 심음동전환을 받는 환자의 항응고 치료에 대한 지명한 전조치들의 권고를 고려해야만 한다.
- 시판 후 이 약에 의한 무작위연구가 보고되었다. 환자에게 이러한 중대한 이상반응의 증상(구강장애를 포함한 점막괴양, 괴혈, 실각한 연하곤란(협심증))이 나타나는 경우 의사에게 알리도록 한다. 무작위연구 중으로 의심된 경우에는 추가 조사(혈액 수치 관리) 및 적절한 조치(이 약의 투여 중단, 다른 잠재적인 약물 치료, 환자 모니터링)를 실시해야 한다.
- 신경근성중재술(PCD) 및 스텐트 시술을 받은 비만관성 심장병증 환자에 투여시 안전성을 평가하기 위한 임상시험이 수행되었다. 이러한 환자에서의 유효성 자료는 제한적이다. 뇌졸중, 일과성허혈발작의 병력이 있는 환자에 대해 자료는 없다.

6) 피부반응

스티븐스-존슨증후군/독성피피피사용례를 포함하는 중대한 피부반응이 이 약의 사용과 관련한 시판 후 조사에서 보고되었다(4. 이상반응*참고). 환자의 치료 초기에 이러한 반응의 위험이 가장 높게 나타났다. 대다수의 사례는 치료 후 첫 안에 발생하였다. 심각한 피부 발진(예, 확산, 극심할 및/또는 물집)이나 전막 병변과 함께 과민반응의 다른 징후가 나타난다면 이 약 투여를 중단해야 한다.

- 뇌졸중, 일과성 허혈 발작 또는 두 질환 모두의 병력이 있는 급성관상동맥증후군환자에게 이 약의 투여는 피해야 한다. 소수의 뇌졸중 또는 일과성 허혈 발작의 병력이 있는 급성관상동맥증후군 환자를 대상으로 한 한 환자연구 유효성 자료에 따르면 이러한 환자들에게 치료의 이익이 없을 수 있음을 시사한다.
- 출혈성 또는 혈전성 뇌졸중 병력이 있는 환자 동맥 질환(CAD) 또는 말초 동맥 질환(PAD) 환자를 대상으로 연구되지 않았다. 그러므로 이러한 환자들에게 이 약의 투여를 피해야한다. 1개월 이내 허혈성, 비혈관성 뇌졸중 병력이 있는 관상 동맥 질환(CAD) 또는 말초 동맥 질환(PAD) 환자에 대해서 연구되지 않았으므로 뇌졸중 후 첫 1개월은 이약의 투여를 피해야 한다.
- 항인전항염증증후군으로 진단받은 혈전증 병력의 환자에게 이 약을 포함한 DOACs(Direct acting Oral Anticoagulants)의 사용을 권장하지 않는다. 특히 루루스항응고인자, 항파킨제인인 항제 및 항태태당단백1형항제 모두에 양성인 환자에게 DOACs을 이용한 치료는, 비타민 K 길항제와 비교하였을 때 재대발성 혈전증 발생 위험의 증가와 관련이 있을 수 있다.

6. 상호작용

1) CYP3A4 및 P-gp 억제제

이 약과 강력한 CYP3A4 억제제인 아졸제 항진균제(예, 케토코나졸, 이트라코나졸, 보리코나졸, 포사코나졸)나 HIV 프로테아제 저해제(예, 리토나비르)의 병용투여는 권장되지 않는다. 이러한 약물은 CYP3A4와 P-gp에 대한 강력한 저해제로, 리바록사반의 혈장농도를 임상적으로 유의한 수준(평균 2.6배)으로 증가시켜 출혈위험이 증가될 수 있다. 그러나 아졸제 항진균제인 플루코나졸의 경우 병용투여시 리바록사반의 노출에 미치는 영향이 덜 하므로 이 약과 병용시 주의해서 투여할 수 있다.

① 케토코나졸 또는 리토나비르

이 약을 케토코나졸(400 mg, 1일 1회) 또는 리토나비르(600 mg, 1일 2회)와 병용투여한 경우, 리바록사반의 평균 AUC는 각각 2.6배 및 2.5배, 평균 C_{max}는 각각 1.7배 및 1.6배 증가하였고, 결과적으로 약력학적 효과가 유의하게 증가하여 출혈 위험성이 증가될 수 있다. 따라서 아졸제 항진균제(예, 케토코나졸, 이트라코나졸, 보리코나졸)나 HIV 프로테아제 저해제(예, 리토나비르)로 병용시투여를 받고 있는 환자에 대해 이 약의 투여가 권장되지 않는다. 이러한 약물은 CYP3A4와 P-gp에 대한 강력한 저해제로, 병용투여 시 리바록사반의 혈장 농도를 임상적으로 유의한 수준으로 증가시켜 출혈위험을 증가될 수 있으며 간 및 신장의 청소를 감소시킬 수 있어 전신노출을 유의적으로 증가시킬 수 있다.

② 클레르트로마이신

CYP3A4에 대해 강한 저해효과를 갖고 P-gp에 대해 중증도의 저해효과를 갖는 클레르트로마이신(500 mg, 1일 2회)은 이 약과 평균 AUC를 1.5배, 평균 C_{max}를 1.4배 증가시켰다. 클레르트로마이신과의 상호작용이 대부분의 환자에게는 임상적으로 유의하지 않을 수 있지만, 고위험군 환자에게는 잠재적으로 유의할 수 있다.

③ 에리트로마이신

CYP3A4와 P-gp에 대해 중증도의 저해효과를 갖는 에리트로마이신(500 mg, 1일 3회)의 경우, 이 약의 평균 AUC와 평균 C_{max}를 각각 1.3배 증가시켰다. 에리트로마이신과의 상호작용이 대부분의 환자에게는 임상적으로 유의하지 않을 수 있지만, 고위험군 환자에게는 잠재적으로 유의할 수 있다.

④ 플루코나졸

CYP3A4에 대해 중증도의 저해효과를 갖는 플루코나졸(400 mg, 1일 1회)은 이 약의 평균 AUC를 1.4배, 평균 C_{max}를 1.3배 증가시켰다. 플루코나졸과의 상호작용이 대부분의 환자에게는 임상적

으로 유의하지 않을 수 있지만, 고위험군 환자에게는 잠재적으로 유의할 수 있다.

2) CYP3A4 유도제

이 약과 강력한 CYP3A4 유도제인 리파복신의 병용투여시 평균 AUC가 50% 감소하였고, 약력학적 효과가 이에 상응하게 감소하였다. 리바록사반과 다른 강력한 CYP3A4 유도제(예, 페나토린, 카바마제핀, 페노바비발 또는 St. John's Wort(성요한초))와 병용투여시 이 약의 혈중 농도가 감소될 수 있으므로 주의해서 투여하도록 한다.

3) 항응고제

리바록사반(10 mg, 1일 1회)과 에슈사파린(40 mg, 1일 1회) 병용투여시 응고시험(PT, aPTT)에 대한 부가적인 효과없이 항응고인자 Xa의 활성에 대한 장기적인 효과가 관찰되었다. 에슈사파린은 리바록사반의 약동학에 영향을 미치지 않았다.

다른 항응고제를 병용투여 하는 경우 출혈 위험성이 증가되므로 주의해서 투여하도록 한다.

4) NSAIDs/혈소판 응집 억제제

리바록사반 15 mg과 나프록센 500 mg을 병용투여시, 임상적으로 유의한 출혈시간 지연이 관찰되지 않았으나, 개인에 따라 좀더 현저한 약력학적 반응이 관찰된 장기적인 효과가 관찰되었다. 에슈사파린은 리바록사반과 아세틸살리실산 500 mg과 병용투여시 약동학적 또는 약력학적 상호작용이 관찰되지 않았다.

클로피도그렐(초효율량 300 mg 투여 후, 75 mg 유지용량)과 이 약 15 mg과의 약동학적 상호작용은 관찰되지 않았으나, 혈