

근육경련 및 혈액순환 개선제

마그네타

마그네슘 | 셀레늄 | 코엔자임Q10 함유

일 반 의 약 품
KGMP적격업체

【원료약품 및 그 분량】1캡슐(1,480 mg) 중	
■ 유효성분 : 산화마그네슘(KP)	350 mg
(마그네슘으로서 211.09mg)	
토코페롤아세테이트(KP)	300 mg
(비타민E로서 300IU)	
셀레늄함유건조효모(KP)	92.59 mg
(셀레늄으로서 50ug)	
유비데카레논(KP)	5.00 mg

- 【효능 · 효과】
- 다음 경우의 비타민 E 의 보급
 - 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목결림, 수족저림 · 수족냉증(손발이 차가움)
 - 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

- 【첨가제】
- 착색제(타르색소): 적색40호, 황색5호, 청색1호
 - 공기름, 아자경화유, 황납, 레시틴, 폴리소르베이트80, 숙산산젤라틴, 농글리세린, 산화티탄

- 【용법 · 용량】
- 만 12세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 2캡슐 복용
 - 【성상】 연노란색의 유상내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 3) 심한 증상의 신부전 환자
 - 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
- 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성 대장염 등의 위장질환 환자
 - 5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
 - 6) 신장장애 환자
 - 7) 저단백혈증 환자
 - 8) 임부
 - 9) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
 - 10) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 황색종 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - ① 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐)
 - ② 붉은 반점, 설사, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
 - ③ 피부염, 땀 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 구토

- 2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예정보다 빨리지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 5) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 6) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
 - 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

- 【포장단위】 60캡슐(10캡슐/PTP X 6), 120캡슐(10캡슐/PTP X 12)
- 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관
- 【사용기간】 제조일로부터 24개월
- 【제조원】 코스맥스파마(주) / 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부
- 【판매원】 동화약품(주) / 충청북도 충주시 충주산단1로 167(용탄동)
- 【소비자상담실】 031-8018-0364 (반품 및 교환처)

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 설명서 작성일자(2021년 09월 28일)이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제신청: 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

설명서 문안 작성일 : 2021년 09월 28일