

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcomatosis : 원인을 알 수 없는 전신 염종질환), 신장질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장결석 환자 5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산이 배설되는 상태) 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 4) 소화성궤양, 만성궤양성 대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자 5) 심장·순환기계기능 장애 환자 6) 신장장애 환자 7) 저단백혈증 환자 8) 당뇨병 환자 9) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자 10) 신장결석 병력이 있는 환자 11) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 붉은 변, 붉은 변점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡기 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을

[사용상의 주의사항]

대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 건손상을 일으킬 수 있다. 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈 심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 9) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 10) 우발적으로 과량복용 한 경우 11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다. 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[제조번호], [사용기한](연. 월. 일. 까지)

별도표기

[첨가제]

미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스카멜로오스나트륨, 탭실드 갈색 91B749, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

[포장단위] 30정/병 [성상] 갈색의 타원형 필름코팅정

[제조사] (주)노바엠헬스케어, 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

[제조의뢰자] 신신제약(주),

세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9

소비자상담실 : 02) 2030-1745

www.sinsin.com



신신제약

기력 충전 및 육체에 활력을

신신케어타민 정

VITAMIN D, E, B₁, B₂, B₆, C, 마그네슘, 아연

육체피로, 체력저하, 관절통,
뼈·이의 발육불량, 구내염

일반의약품

30정

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 사용상의 주의사항을 주의 깊게 읽어 주시길 바랍니다.

[유효성분] 1정(543.4mg) 중

벤포티아민(KP) 34.57mg(티아민염산염으로서 25mg), 리보플라빈(KP) 20.0mg, 니코틴산아미드(KP) 20.0mg, 판토텐산칼슘(KP) 20.0mg, 피리독신염산염(KP) 20.0mg, 비오틴(USP) 0.15mg, 폴산(USP) 0.2mg, 시아노코발라민(KP) 0.03mg, 아스코르브산(KP) 150.0mg, 콜레칼시페롤과립(EP) 2.0mg(비타민D로서 200IU), 토코페롤아세테이트2배산(KP) 20.0mg(비타민E로서 10IU), 산화마그네슘(KP) 82.9mg(마그네슘으로서 50mg), 산화아연(KP) 18.67mg(아연으로서 15mg), 셀레늄함유건조효모(KP) 60.0mg(셀레늄으로서 90µg), 크롬함유건조효모(KP) 12.5mg(크롬으로서 25µg)

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 D, E, B₁, B₂, B₆, C의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후병을 앓는 동안이나 회복 후의 체력저하시 - 발육기 - 노년기 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다. 비타민D(콜레칼시페롤)·뼈, 이의 발육불량·구루병의 예방·비타민B₁(벤포티아민)·다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등) 각기·눈의 피로·비타민B₂(리보플라빈)·다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 설염(혀염), 습진, 피부염

2. 아연의 보급

[용법·용량]

만 12세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1~2정 복용

[저장방법]

밀폐용기, 실온보관(1~30℃)