

변비치료제 메이놀정

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 비사코딜(KP) 3 mg
도큐세이트나트륨(USP) 16.75 mg
- 첨가제(타르색소) : 황색4호, 청색1호, 청색2호
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 경질무수규산, 전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 탈코, 탭실드녹색(319G977)

【성 상】 연두색의 원형 장용성 필름코팅정제

【효능·효과】

- 변비
- 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부(배부분)팽만, 장내이상발효, 지질

【용법·용량】

- 만15세이상 : 1회 1~2정, 1일 3회 식후에 복용
- 복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회(처음복용)는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
① 급성 복부(배부분)질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
② 장폐색(장자막힘) 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.
제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
① 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
② 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
③ 다른 약물을 복용하고 있는 사람
④ 나트륨 제한식이를 하고 있는 사람
⑤ 직장(곧창자, 직장)의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람
⑥ 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로, 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
① 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우

- 2) 이 약을 복용함으로써 복부(배부분)불쾌감, 경련이 일어날 경우
- 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다.
- 3) 복용 시 정제를 씹지 말 것.
- 4) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안된다. 만약 매일 변비가 이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 500정/병

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【제조사】 ㈜바스칸바이오제약 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품 부작용 발생 시 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 피해구제를 신청 할 수 있습니다.
- ※ 소비자상담전화: 031-692-2900
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.

작성일 : 2022. 01. 07. (Rev.0)

(주)바스칸바이오제약
BAS-KHAN BIO Pharma Inc.