※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오. 전문의약품

당뇨병 치료제

다파하나정 5밀리그램, 10밀리그램

(다파글리플로진프로판디올수화물)

다파하나정 5밀리그램, 10밀리그램

(다파글리플로진프로판디올수화물)

첨부문서 고시 제정 : 1주 8 8

■ 효능·효과
(다파하나정5밀리그램)
다파글리플로진으로서 5밀리그램
(다파하나정10밀리그램)
다파글리플로진으로서 10밀리그램

■ 용법·용량
(다파하나정5밀리그램)
1. 제2형 당뇨병 : 1일 1회 다파글리플로진으로서 5밀리그램을 경구투여한다.
2. 만성 콩팥병 : 1일 1회 다파글리플로진으로서 10밀리그램을 경구투여한다.
(다파하나정10밀리그램)
1. 제2형 당뇨병 : 1일 1회 다파글리플로진으로서 10밀리그램을 경구투여한다.
2. 만성 콩팥병 : 1일 1회 다파글리플로진으로서 10밀리그램을 경구투여한다.

■ 사용상의 주의사항
1. 다음 환자는 투여하지 말 것
1) 이 약의 성분 전부 또는 일부에 과민반응의 병력이 있는 환자
2) 제1형 당뇨병 환자 또는 당뇨병성 케톤산증 환자
3) 투석 중인 환자
4) 중등도 이상 신장애(eGFR 45 mL/min/1.73 m² 미만) 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
1) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈압을 낮추는 작용이 있으므로 혈압이 낮은 환자
2) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈액 중 케톤체를 증가시키는 작용이 있으므로 케톤증이 있는 환자
3) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈액 중 케톤체를 증가시키는 작용이 있으므로 케톤증이 있는 환자
4) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈액 중 케톤체를 증가시키는 작용이 있으므로 케톤증이 있는 환자
5) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈액 중 케톤체를 증가시키는 작용이 있으므로 케톤증이 있는 환자
6) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈액 중 케톤체를 증가시키는 작용이 있으므로 케톤증이 있는 환자
7) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈액 중 케톤체를 증가시키는 작용이 있으므로 케톤증이 있는 환자
8) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈액 중 케톤체를 증가시키는 작용이 있으므로 케톤증이 있는 환자
9) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈액 중 케톤체를 증가시키는 작용이 있으므로 케톤증이 있는 환자
10) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈액 중 케톤체를 증가시키는 작용이 있으므로 케톤증이 있는 환자
11) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈액 중 케톤체를 증가시키는 작용이 있으므로 케톤증이 있는 환자
12) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈액 중 케톤체를 증가시키는 작용이 있으므로 케톤증이 있는 환자
13) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈액 중 케톤체를 증가시키는 작용이 있으므로 케톤증이 있는 환자
14) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈액 중 케톤체를 증가시키는 작용이 있으므로 케톤증이 있는 환자
15) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈액 중 케톤체를 증가시키는 작용이 있으므로 케톤증이 있는 환자
16) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈액 중 케톤체를 증가시키는 작용이 있으므로 케톤증이 있는 환자
17) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈액 중 케톤체를 증가시키는 작용이 있으므로 케톤증이 있는 환자
18) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈액 중 케톤체를 증가시키는 작용이 있으므로 케톤증이 있는 환자
19) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈액 중 케톤체를 증가시키는 작용이 있으므로 케톤증이 있는 환자
20) 이 약은 혈당 강하 작용과 함께 혈액 중 케톤체를 증가시키는 작용이 있으므로 케톤증이 있는 환자

3. 이상반응
1) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것
(1) 중대한 이상반응
(2) 기타 이상반응
2) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것
(1) 중대한 이상반응
(2) 기타 이상반응
3) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것
(1) 중대한 이상반응
(2) 기타 이상반응
4) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것
(1) 중대한 이상반응
(2) 기타 이상반응
5) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것
(1) 중대한 이상반응
(2) 기타 이상반응
6) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것
(1) 중대한 이상반응
(2) 기타 이상반응
7) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것
(1) 중대한 이상반응
(2) 기타 이상반응
8) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것
(1) 중대한 이상반응
(2) 기타 이상반응
9) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것
(1) 중대한 이상반응
(2) 기타 이상반응
10) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것
(1) 중대한 이상반응
(2) 기타 이상반응

4. 일반적 주의
1) 다음 환자에는 투여하지 말 것
2) 다음 환자에는 신중히 투여할 것
3) 다음 환자에는 투여하지 말 것
4) 다음 환자에는 투여하지 말 것
5) 다음 환자에는 투여하지 말 것
6) 다음 환자에는 투여하지 말 것
7) 다음 환자에는 투여하지 말 것
8) 다음 환자에는 투여하지 말 것
9) 다음 환자에는 투여하지 말 것
10) 다음 환자에는 투여하지 말 것

5. 상호작용
1) 다음 약물과 병용하지 말 것
2) 다음 약물과 병용하지 말 것
3) 다음 약물과 병용하지 말 것
4) 다음 약물과 병용하지 말 것
5) 다음 약물과 병용하지 말 것
6) 다음 약물과 병용하지 말 것
7) 다음 약물과 병용하지 말 것
8) 다음 약물과 병용하지 말 것
9) 다음 약물과 병용하지 말 것
10) 다음 약물과 병용하지 말 것

6. 부작용
1) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것
2) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것
3) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것
4) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것
5) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것
6) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것
7) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것
8) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것
9) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것
10) 다음 이상반응이 나타나는 경우 투여를 중단하고 적절한 조치를 취할 것

7. 소아에 대한 투여
1) 다음 환자에는 투여하지 말 것
2) 다음 환자에는 투여하지 말 것
3) 다음 환자에는 투여하지 말 것
4) 다음 환자에는 투여하지 말 것
5) 다음 환자에는 투여하지 말 것
6) 다음 환자에는 투여하지 말 것
7) 다음 환자에는 투여하지 말 것
8) 다음 환자에는 투여하지 말 것
9) 다음 환자에는 투여하지 말 것
10) 다음 환자에는 투여하지 말 것

8. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 다음 환자에는 투여하지 말 것
2) 다음 환자에는 투여하지 말 것
3) 다음 환자에는 투여하지 말 것
4) 다음 환자에는 투여하지 말 것
5) 다음 환자에는 투여하지 말 것
6) 다음 환자에는 투여하지 말 것
7) 다음 환자에는 투여하지 말 것
8) 다음 환자에는 투여하지 말 것
9) 다음 환자에는 투여하지 말 것
10) 다음 환자에는 투여하지 말 것

9. 적용상의 주의
1) 다음 환자에는 투여하지 말 것
2) 다음 환자에는 투여하지 말 것
3) 다음 환자에는 투여하지 말 것
4) 다음 환자에는 투여하지 말 것
5) 다음 환자에는 투여하지 말 것
6) 다음 환자에는 투여하지 말 것
7) 다음 환자에는 투여하지 말 것
8) 다음 환자에는 투여하지 말 것
9) 다음 환자에는 투여하지 말 것
10) 다음 환자에는 투여하지 말 것

10. 보관 및 취급상의 주의
1) 다음 환자에는 투여하지 말 것
2) 다음 환자에는 투여하지 말 것
3) 다음 환자에는 투여하지 말 것
4) 다음 환자에는 투여하지 말 것
5) 다음 환자에는 투여하지 말 것
6) 다음 환자에는 투여하지 말 것
7) 다음 환자에는 투여하지 말 것
8) 다음 환자에는 투여하지 말 것
9) 다음 환자에는 투여하지 말 것
10) 다음 환자에는 투여하지 말 것

11. 기타 참고사항
1) 다음 환자에는 투여하지 말 것
2) 다음 환자에는 투여하지 말 것
3) 다음 환자에는 투여하지 말 것
4) 다음 환자에는 투여하지 말 것
5) 다음 환자에는 투여하지 말 것
6) 다음 환자에는 투여하지 말 것
7) 다음 환자에는 투여하지 말 것
8) 다음 환자에는 투여하지 말 것
9) 다음 환자에는 투여하지 말 것
10) 다음 환자에는 투여하지 말 것

전문의약품

2210-00

APROGEN
에이프로젠제약㈜
경기도 성남시 분당구 판교로 338, 에이프로젠제약㈜ (삼평동)
제조업자 에이프로젠제약㈜
경기도 성남시 분당구 판교로 338, 에이프로젠제약㈜ (삼평동)