

마그온 MAX.B

맥스비 (연일캡슐)

마그네슘에 비타민+감마오리자놀+유비데카레논이 포함된 말초혈액순환개선제

마그온 맥스비(MAX B)는 마그네슘, 비타민B₁, 비타민B₂, 비타민B₆, 비타민B₁₂(시아노코발라민) 및 유비데카레논, 감마오리자놀, 비타민D를 포함한 제품으로 현대인에게 고갈되기 쉬운 마그네슘과 비타민을 보충해 줍니다.

특 장 점

고단위 비타민B,E군과 마그네슘, 유비데카레논이 복합된 근육경련 및 말초혈액순환개선제입니다.
비타민D를 포함하여 갱년기 증상 개선에도 도움을 줍니다.

*표준제조기준 제1장 비타민 및 미네랄

효능·효과



혈행장애개선



근육경련개선



피로회복



통증개선
(신경통·근육통·관절통)

원료약품 및 그 분량 - 1캡슐 중 -

■ 유효성분 : 산화마그네슘(KP) 350.0mg (마그네슘으로서211.09mg) 토코페롤아세테이트(KP) 450.0mg (비타민E로서 450IU) 벤포티아민(KP) 50.0mg (티아민염산염으로서 36.15mg)	피리독신염산염(KP) 50.0mg 리보플라빈(KP) 25.0mg 니코틴아미드(KP) 10.0mg 시아노코발라민(KP) 0.5mg (시아노코발라민으로서 500μg) γ-오리자놀(KP) 5.0mg 우르소데옥시콜산(JP) 5.0mg	■ 첨가제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 청색1호 ■ 동물유래성분(돼지,가축) : 숙산산젤라틴 ■ 기타 첨가제 : 공기름, 황납, 레시틴, 폴리소르베이트80, 농글리세린, 산화티탄, 정제수
--	--	---

효능·효과

- 다음경우의 비타민 E, B₁, B₂, B₆의 보급
- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
· 말초혈행장애 및 갱년기 시 다음 증상의 완화 : 어깨목걸림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
· 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요·허리통, 어깨걸림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
· 각기 · 눈의피로
- 마그네슘 결핍으로 인한 근육경련

용법·용량 만 12세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

성 상 황색의 유상 내용물을 함유한 적갈색의 장방형 연일캡슐

마그온맥스비

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자분 2) 만 12개월 미만의 젖먹이 3) 심한 증상의 신부전 환자분
4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자분 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자분
- 다음 환자분에게는 신중히 투여하십시오.
1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 등 체장(이차)염 등 지방대사 이상 환자분 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자분
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자분 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 3) 심장순환기계기능 장애 환자분
4) 신장(콩팥)장애 환자분 5) 저단백혈증 환자분 6) 임부
7) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자분에게는 신중히 투여하십시오.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
· 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 물은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
2) 이 약의 투여에 의하여 생리기 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘성 소인)이 있는 환자분이 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘증)의 위험이 증가될 수 있습니다.
4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
5) 폴산이 부족한 환자분에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상 (glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
8) 항알도스테론제, 트리암테린과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
9) 우발적으로 과량복용 한 경우 10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 일반적 주의
1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자분에게 이 약을 투여할 때 혈당지정치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자분이 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오. 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용후에는 피하십시오.

저장상의 주의사항



1 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.



2 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.



3 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 포장단위 10캡슐/피티피((10캡슐/PTP)X1), 60캡슐/피티피((10캡슐/PTP)X6), 120캡슐/피티피((60캡슐/10캡슐/PTP)X6)X2
사용기간 제조일로부터 24개월

- ※ 내부 포장에 파손되어 있으면 복용하지 마십시오.
※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은
공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- 제조자 : 알피바이오(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-7 제조의뢰자 : (주)대웅제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14
부작용보고 및 피해구제신청 : 한국약품안전관리원 (14-3330, 1644-6223)



(주)대웅제약
경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14

※ 이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.

작성 연월일 : 2022.01.27

H00