

당뇨병 치료제

포시글립엠정10/100mg

(다파글리플로진시트르산 / 시타글립틴염산염수화물)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 다파글리플로진시트르산(미분화)(별규) ... 14.7mg(다파글리플로진 10mg)
시타글립틴염산염수화물(별규) ... 113.4mg(시타글립틴으로서 100mg)
- 첨가제(동물유래성분) : 무수유당(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 무수인산수소칼슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 스테아릴 푸마르산나트륨, 오파드라이노란색(03B620011), 카르나우바납, 콜로이드성이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 크로스포비돈

【성상】 노란색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】 이 약은 시타글립틴과 다파글리플로진의 병용투여가 적합한 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여한다.

【용법·용량】 이 약은 시타글립틴 100 mg과 다파글리플로진 10 mg을 투여하는 환자에게 식사와 관계없이 1일 1회 1정을 투여할 수 있다. 정제는 통째로 삼켜야 한다.

특수 집단

신장장애환자: 이 약의 유효성 및 안전성은 신기능에 따라 다르며, 이 약 투여 전 및 투여 후 주기적으로 신장기능을 평가하는 것이 권장된다.

- 추정 사구체 여과율[estimated glomerular filtration rate(eGFR)]이 45 mL/min/1.73m² 이상인 경우 용량 조절은 필요하지 않다.

- 추정 사구체 여과율(eGFR)이 45 mL/min/1.73 m² 미만인 경우에는 이 약을 투여하지 않는다.

간장애환자: 경증 또는 중등도의 간장애 환자에 대한 용량 조절은 필요하지 않다. 중증의 간장애 환자에 대하여 이 약의 사용은 권장되지 않는다.