포누비아 정 10/100mg

다파글리프로진시트르산·시타글립틴인산염수화물

전문의약품

[성분·함량] 1정 1껍질 중
- **유효성분 :** 다파글리프로진시트르산(메트하넥세이트) 14.7mg(다파글리플로진으로서 10mg), 시타글립틴인산염수화물(베타) 113.4mg(시타글립틴으로서 100mg)
- **첨가제등등(global class) :** 무수유당(간접적 소의 우유유래)
- **첨가제 :** 무수인산수소칼슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산이그네슘, 스테아릴푸마르산나트륨, 오파드라이드라벨(OPADRY200011), 카르나우바납, 콜로이드성이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 크로스포비돈

[성상] 노란색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과] 이 약은 시타글립틴과 다파글리플로진의 병용투여가 적합한 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여한다.

[용법·용량] 이 약은 시타글립틴 100 mg과 다파글리플로진 10 mg을 투여하는 환자에게 식사와 관계없이 1일 1회 1정을 투여할 수 있다. 정제는 통째로 삼켜야 한다.

특수 집단

신장애환자: 이 약의 유효성 및 안전성은 신기능에 따라 다르며, 이 약 투여 전 및 투여 후 주기적으로 신장기능을 평가하는 것이 권장된다.
- 추정 사구체 여과율(estimated glomerular filtration rate(eGFR))이 45 mL/min/1.73㎡ 이상인 경우 용량 조절은 필요하지 않다.
- 추정 사구체 여과율(eGFR)이 45 mL/min/1.73 ㎡ 미만인 경우에는 이 약을 투여하지 않는다.

간장애환자: 경증 또는 중등도의 간장애 환자에 대한 용량 조절은 필요하지 않다. 중증의 간장애 환자에 대하여 이 약의 사용은 권장되지 않는다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

1) 시타글립틴

(1) 과민반응: 시판 후 시타글립틴을 투여한 환자에서 중증의 과민반응이 보고되었으며, 이 반응은 아나필락시스 쇼크, 혈관부종 및 스티븐스-존슨증후군을 포함한 박리성 피부질환을 포함한다. 이것은 발병일 기준 3개월 이내에 발생한 환자들에서 가장 빈번하게 보고되었으며 일부는 1회 투여 후에 보고되었다. 이것은 발병일 기준 1년 이내에 시타글립틴을 투여한 환자들에서 가장 빈번하게 보고되었다. 대부분의 환자들은 시타글립틴을 투여하기 전에 과민반응의 병력을 가진 환자에 대해 다파글리플로진과 투여를 시작하기 전 세심한 상태 및 시장 기능에 대한 평가가 필요하며, 투여를 시작한 후 제한없이 증상 및 징후와 신기능에 대해 모니터링 한다.

혈당 조절에 대한 다파글리플로진의 유효성은 신장 기능에 따라 다르다. 중등도의 신장애가 있는 환자에서 혈당 조절 우호성이 감소하여 eGFR 45mL/min/1.73㎡ 미만인 제2형 당뇨환자에서 혈압조절 목적만으로 다파글리플로진을 투여하는 것은 권장되지 않는다. 중등도의 신장애 환자 에서 다파글리플로진을 투여한 피험자들은 위약을 투여한 피험자들에 비해 크레아티닌, 인, 부갑상샘 호르몬(PTH) 상승 및 저혈압의 이상반응을 나타내는 빈도가 더 높았다.

다파글리플로진은 eGFR 25mL/min/1.73㎡ 미만인 환자에게 투여를 시작한 경험이 제한적이다.

eGFR 25mL/min/1.73㎡미만인 만성 심부전 환자 및 만성 신장병 환자에서 다파글리플로진의 투여를 시작하는 것은 권장되지 않는다.

2) 시타글립틴

(1) 신장애환자 : 시타글립틴은 신장으로 배설된다. 정상 신기능을 가진 환자에서와 유사한 혈중농도에 도달하기 위해서 사구체여과율(eGFR) (4 mL/min/1.73㎡을 가진 환자 및 혈액투석 또는 복막투석을 요하는 말기신장에(ESRD)환자에서는 저용량이 권장된다.

4. 이상반응

1) 다파글리플로진

(1) 안전성 프로파일의 요약: 제2형 당뇨 환자에 대한 임상 연구에서 15,000명 이상의 환자가 다파글리플로진을 투여받았다.

다파글리플로진 10mg을 투여한 2,360명 및 위약을 투여한 2,295명이 포함된 13건의 단기 (최장 24주간) 위약 대조 시험에 대한 사전 정의된 통합 분석을 통해 안전성 및 내약성이 평가가 수행된 바 있다.

제2형 당뇨병 환자에서 다파글리플로진의 실질적에 영향을 평가하기 위한 임상시험 (DECLARE)에서는 8,574명에게 다파글리플로진 10 mg, 8,569명에게 위약이 투여되었으며 노출 기간의 중앙값은 48개월이었다. 총 30,622인-년 (patient-years)의 다파글리플로진 노출이 있었다.

임상 연구 전체에 걸쳐 가장 흔하게 보고된 이상반응은 생식기 감염이었다.

적십실 수축기능이 저하된 만성 심부전 환자에서 다파글리플로진의 실질적에 영향을 평가하기 위한 임상시험 (DAPA-HF)에서는 2,368명에게 다파글리플로진 10 mg, 2,368명에게 위약이 투여되었으며 노출 기간의 중앙값은 18개월이었다. 시험 대상자 집단에는 제2형 당뇨병이 있거나, 당뇨병이 없는, eGFR 30 mL/min/1.73㎡ 이상의 환자들이 포함되었다.

만성신장병 환자에서 다파글리플로진의 신장 영향을 평가하기 위한 임상시험 (DAPA-CKD)에서는 2,148명에게 다파글리플로진 10 mg, 2,149명에게 위약이 투여되었으며 노출 기간의 중앙값은 27개월이었다. 시험 대상자 집단에는 제2형 당뇨병이 있거나 당뇨병이 없는, eGFR 25 mL/min/1.73㎡ 이상 75 mL/min/1.73㎡ 이하의 환자들이 포함되었다. eGFR이 25 mL/min/1.73㎡ 미만인 환자는 제2형 당뇨병 환자와 유사한 투여가 지속되었다.

다파글리플로진의 안전성 프로파일은 연구의 대상 호능호과 전반에 걸쳐 일관되게 나타났다. 당뇨병성 케톤산증은 당뇨병 환자에서만 관찰되었다.

(2) 이상반응 목록: 위약 대조 임상 시험에서 이러한 이상반응이 관찰되었다. 용량과 관련된 이상반응은 없었다. 이래에 기재된 이상반응은 빈도 및 기관계 (SOC)에 따라 분류하였다. 빈도 빈도는 다음과 같이 정의되었다: 매우 흔하게(≥ 1/10), 흔하게(≥ 1/100 ~ (1/10), 흔하지 않게(≥ 1/1,000 ~ (1/100), 드물게(≥ 1/10,000 ~ (1/1,000), 매우 드물게(1/10,000), 빈도불명(이용 가능한 자료를 통해 평가할 수 없음).

표 1 위약 대조 시험에서의 이상반응[a]

기관계	매우 흔하게	흔하게	흔하지 않게	드물게	매우 드물게
감염	–	외음부염, 귀두염 및 관련 생식기 감염[b], 요로 감염[b]	진균감염[b]	–	회음부 괴저[c], 요로 괴저[c]
대사 및 영양	저혈당 (설포닐우레아 또는 인슐린과 함께 사용할 때)[b]	–	체액량 감소[b, c], 구갈[c]	당뇨병성 케톤산증 (제2형 당뇨병 환자인 경우)[b]	–
신경계	–	현기증	–	–	–
위장관 이상	–	–	변비[b], 구강건조[c]	–	–
근골격계 및 결합조직	–	요통	–	–	–
신경 및 비뇨기계	–	배뇨통, 다뇨[c]	야간뇨[c]	–	–
생식기계 및 유방	–	–	외음부 가려움증[b], 생식기 가려움증[b]	–	–
실험실적 수치	–	혜마토크릿 상승[c] 최초 치료 시 신장 크레아티닌 상승[b], 이미티 청소율 감소[b] 이상지질검사	치료 초기 혈중 크레아티닌 상승[b], 혈중 요산 상승[b], 체중 감소[c]	–	–

[a] 이 표는 혈당 구제에 관계없이, 24주차(단기간)까지의 자료를 나타낸 것이다.

[b] 추가 정보는 아래 섹션에는 단락을 참고한다.

[c] 외음부질염, 귀두염 및 관련 생식기 감염은 사전 정의된 선호 용어로서 다음을 포함한다: 외음질 진균감염, 질염, 귀두염, 생식기 진균감염, 외음질 칸디다증, 외음질염, 칸디다 귀두염, 생식기 칸디다증, 생식기 감염, 남성 생식기 감염, 음경 감염, 외음염, 세균성 질염, 음문 농양.

[d] 요로감염은 다음의 용어들을 포함하며, 대비으로 보고된 순서는 대략과 같다: 요로감염, 방광염, 대장균요로감염, 비노생식기감염, 신우신염, 방광삼각염, 요도염, 신장감염, 전립선염.

[e] 체액량 감소는 사전 정의된 선호 용어로서 다음을 포함한다: 탈수, 저혈압증, 저혈압.

[f] 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 한 심혈관계 영향 평가 임상시험 (DECLARE)으로부터 보고된 것이다. 빈도는 연간 발생률에 기반한다.

[g] 다뇨는 다음의 선호 용어를 포함한다: 빈뇨, 다뇨, 뇨 배출량 증가.

[h] 헤마토크릿의 베이스라인으로부터의 평균 변화는 다파글리플로진 10mg에서 2.30%, 위약군에서 0.33%였다. 헤이토글로빈 ≥13% 155%의 변화는 다파글리플로진 10mg에서 1.3%, 위약군에서 0.4%로 보고되었다.

[i] 다파글리플로진 10mg과 위약을 비교한 메타-분석(이으부터의 평균 백분율 변화는 다음과 같다: 총 콜레스테롤 2.5% vs 0.0%; HDL 콜레스테롤 6.0% vs 2.7%; LDL 콜레스테롤 2.9% vs −1.0% 중성지방 −2.7% vs −0.7%.

[j] 피험자의 2% 이상에서 보고되었으며, 다파글리플로진 10mg을 투여한 군에서 위약군에 비해 적어도 3명 더 많은 피험자에서 1% 이상 더 높은 빈도로 보고되었다.

[k] 연구자의 의해 연관된 것으로(연관되어 있을 가능성이 있는 경우 포함) 보고되었으며, 피험자의 0.2% 이상에서 보고되었으며, 다파글리플로진 10mg을 투여한 군에서 위약군에 비해서 적어도 3명 더 많은 피험자에서 0.1% 이상 더 높은 빈도로 보고되었다.

(3) 특정 이상반응에 대한 설명

- **외음부질염, 귀두염 및 관련 생식기 감염:** 임상시험 12건으로부터의 안전성 통합 자료에 따르면 외음부질염, 귀두염 및 관련 생식기 감염은 다파글리플로진 10mg 및 위약을 투여한 피험자의 각각 5.9% 와 0.9%에서 보고되었다. 대부분의 감염은 경증 내지 중등도였고, 피험자들은 표준의 표준 치료에 반응하였으며, 다파글리플로진 투여 중단율 이하로 경우는 드물었다. 이러한 감염들은 여성에서 더 흔하였으며(다파글리플로진 및 위약군에서 각각 8.4%, 1.2%), 과거 병력이 있는 피험자들은 재발성 감염을 나타낼 가능성이 더 높았다.
- **당뇨병성 케톤산증:** DECLARE 임상시험에서 (다파글리플로진 노출기간 중앙값 48개월)에서 당뇨병성 케톤산증 사례는 다파글리플로진 10mg을 투여한 환자군에서 2명, 위약군에서 0명 보고되었다. 발생 사례은 연구 기간 전체에 고르게 분포되었다. 다파글리플로진군에서 당뇨병성 케톤산증 사례가 발생한 2명중 2명은 사례가 발생한 시점에 인슐린을 병용하고 있었다. 당뇨병성 케톤산증의 우발 요인은 제2형 당뇨병 환자잔단에서 예상된 바와 같이 나타났다 (5. 일반적 주의) 다파글리플로진 (3) 케톤산증 항 참조).

DAPA-HF 임상시험에서, 당뇨병성 케톤산증 사례는 다파글리플로진 군에서 제2형 당뇨병 환자 3명이 보고되었으며 위약군에서는 보고되지 않았다.

DAPA-CKD 임상시험에서, 당뇨병성 케톤산증 사례는 다파글리플로진 군에서는 보고되지 않았고, 위약군에서 제 2형 당뇨병 환자 2명이 보고되었다.

- **요로 감염:** 임상시험 12건으로부터의 안전성 통합 자료에 따르면 요로 감염은 다파글리플로진 10mg군에서 위약군에 비해 더 빈번하게 보고되었다 (각각 4.7% vs 3.5%). 대부분의 감염은 경증 내지 중등도였고, 피험자들은 최초의 표준 치료에 반응하였으며, 다파글리플로진 투여 중단율 이가한 경우는 드물었다. 이러한 감염들은 여성에서 더 흔하였고, 과거 병력이 있는 피험자들은 재발성 감염을 나타낼 가능성이 더 높았다.
- **저혈압:** 당뇨병 환자에 대한 임상시험에서 저혈압의 빈도는 각 시험에 사용된 기저 요법의 종류에 따라 좌우되었다.

다파글리플로진의 단독 투여, 메트포르민 혹은 시타글립틴(메트포르민 단독 혹은 병용)에 대한 추가 병용 연구에서 경미한 저혈당 에피소드의 빈도는 투약 102주까지 위약을 포함한 투여군 간에 유사하였다(5%). 다파글리플로진과 식사글립틴의 병용요법을 평가한 1696명의 안전성 정보를 종합한 분석에서 24주에서 전반적인 저혈당 발생률이 낮았다 (모든 군에서 ≤1.8%).

모든 시험들에서, 주요한 저혈당 사건은 흔하지 않았고, 다파글리플로진 투여군과 위약군 간에 등등하였다. 생보부수에서 추가 병용 연구 및 안슐린 추가 병용 연구에서 저혈당 발생률이 더 높았다.

글리메피리드 추가 병용 연구에서 24 주와 48 주차에, 경미한 저혈당 에피소드가 보고된 비율은 다파글리플로진 10mg 및 위약을 투여 시 각각 1.3%와 0.8%에서 보고되었다. 심각한 저혈당 사건은 보고되지 않았다.

신장과 관련된 이상반응을 보인 환자에 대한 향후 평가에서, 대부분 환자에서 혈청크레아티닌 변동가 기저수준으로부터 ≤ 0.5 mg/dL으로 관찰되었다. 중기된 크레아티닌은 일반적으로 투여 기간 동안 일시적으로 나타나거나 투여중단 후 회복되었다.

고령자 및 신장애 환자 (eGFR 60 mL/min/1.73㎡미만)를 포함한 DECLARE 임상시험에서 다파글리플로진군과 위약군 모두 시간 경과에 따라 eGFR이 감소하였다. 1년 경과 후 평균 eGFR이 다파글리플로진군에서 약간 낮았으며, 4년이 경과된 후에는 위약군 대비 다파글리플로진군의 평균 eGFR이 약간 높았다.

DAPA-HF 임상시험에서 다파글리플로진군과 위약군 모두 시간 경과에 따라 eGFR이 감소하였다. 평균 eGFR의 변화 (4일차) 간에는 다파글리플로진군에서 -4.0mL/min/1.73㎡, 위약군에서 -0.8 mL/min/1.73㎡였다. 28개월에 eGFR의 기저치 대비 변화는 다파글리플로진군 -7.4 mL/min/1.73㎡, 위약군 -8.6 mL/min/1.73㎡이었다.

- **혈당 감소:** 심부전 환자 대상으로 한 심혈관계 영향 평가 임상시험 (DECLARE)으로부터 보고된 것이다. 빈도는 연간 발생률에 기반한다.

DAPA-CKD 임상시험에서 제2형 당뇨병 환자에서 다파글리플로진 10 mg 투여군과 위약 투여군 간에 혈당 조절 우호성의 차이는 없었다.

제2형 당뇨병 환자 17,160명 대상, 노출 기간 중앙값 48개월의 DECLARE 임상시험에서 푸르니에 괴저는 총 6건 보고되었고, 이 중 다파글리플로진군 1건, 위약군 5건이었다.

(2) 최근부 괴저 (푸르니에 괴저)

시판 후 조사에서 다파글리플로진을 포함한 SGLT2 저해제 투여 환자에 대해 푸르니에 괴저의 사례가 보고된 바 있다 (5. 일반적 주의 1) 다파글리플로진, (2) 황음 괴저 참조).

제2형 당뇨병 환자 17,160명 대상, 노출 기간 중앙값 48개월의 DECLARE 임상시험에서 푸르니에 괴저는 총 6건 보고되었고, 이 중 다파글리플로진군 1건, 위약군 5건이었다.

(3) 회음부 괴저 (푸르니에 괴저)

시판 후 조사에서 다파글리플로진을 포함한 SGLT2 저해제 투여 환자에 대해 푸르니에 괴저의 사례가 보고된 바 있다 (5. 일반적 주의 1) 다파글리플로진, (2) 황음 괴저 참조).

제2형 당뇨병 환자 17,160명 대상, 노출 기간 중앙값 48개월의 DECLARE 임상시험에서 푸르니에 괴저는 총 6건 보고되었고, 이 중 다파글리플로진군 1건, 위약군 5건이었다.

2) 시타글립틴

(1) 임상시험

① 임상시험은 광범위하고 다양한 조건 하에서 실시되므로 임상시험에서 관찰된 이상반응 발생률은 다른 약물의 임상시험에서의 비율과 직접적으로 비교될 수 없으며, 실제 시장환경 하에서 관찰된 비율을 반영할 수 없다.

시타글립틴의 임상시험에서 시타글립틴을 단독요법 또는 병용요법(메트포르민 또는 피오글리타존 또는 로시글리타존 및 메트포르민)으로 투여한 경우 이상반응 및 저혈당의 발생빈도는 위약에서 보고된 것과 유사하였다.

글리메피리드 또는 글리메피리드 및 메트포르민 병용요법시 시타글립틴 투여군의 이상반응 발생빈도가 위약군보다 높았다 (표 4). 이는 시타글립틴 투여군에서 저혈당 발생빈도가 높았던 것에 일부 기인한다. 이상반응에 의한 치료중단은 위약군과 유사하였다.

18주 및 24주간 진행된 2건의 위약대조 단독요법 연구에 대일 시타글립틴 100 mg 및 200 mg 위약을 투여한 군이 포함되었다. 5건의 위약대조 추가 병용요법 연구는 각각 메트포르민, 피오글리타존, 로시글리타존 및 메트포르민 글리메피리드 (+메트포르민), 또는 인슐린 (+메트포르민 의 안전성 용량에 시타글립틴 100 mg 또는 위약을 매일 병용투여하였다.

이 임상시험들에서 저혈당을 제외하고 인과관계 평가된 관계없이 시타글립틴 100 mg을 98주간 매일 복용한 환자 중 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 이상반응은 표 2와 같다. 저혈당의 발생빈도는 표 4과 같다.

표 2. 시타글립틴 단독요법 또는 병용요법(메모글리타존, 또는 로시글리타존 및 메트포르민, 또는 글리메피리드 (±메트포르민))의 위약대조 임상시험: 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 저혈당을 제외한 이상반응[1]

이상반응	환자수 (%)	
	단독요법 (18 주~ 24주)	위약 (363명)
	시타글립틴 100 mg (443명)	
비인두염	23 (5.2)	12 (3.3)
피오글리타존과의 병용요법(24주)	시타글립틴 100 mg + 피오글리타존 (175명)	위약 + 피오글리타존 (178명)
상기도감염	11 (6.3)	6 (3.4)
두통	9 (5.1)	7 (3.9)
로시글리타존 및 메트포르민과의 병용요법 (18주)	시타글립틴 100 mg + 로시글리타존 + 메트포르민 (181명)	위약 + 로시글리타존 + 메트포르민 (97명)
상기도감염	10 (5.5)	5 (5.2)
비인두염	11 (6.1)	4 (4.1)
글리메피리드 (±메트포르민)와의 병용요법 (24주)	시타글립틴 100 mg + 글리메피리드(± 메트포르민) (222명)	위약 + 글리메피리드 (± 메트포르민) (269명)
비인두염	14 (6.3)	10 (4.6)
두통	13 (5.9)	5 (2.3)

[1] ITT (Intent-to treat) 피험자군

24주간 시타글립틴과 메트포르민을 추가 병용투여한 환자에서 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 이상반응은 없었다.

24주간 시타글립틴과 안슐린 용량의 인슐린 (±메트포르민)을 추가 병용투여한 환자에서 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 저혈당을 제외한 이상반응은 없었다 (시험군은 표 E 참조). 또 다른 24주간 인슐린 강화 기간 (±메트포르민) 동안 시타글립틴을 추가 병용투여한 환자에서 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 이상반응은 설사였다(이 중 5.2%, 위약 3.3%)

54주간 시타글립틴과 로시글리타존 및 메트포르민을 추가 병용투여한 환자에서 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 이상반응은 상기도감염 (시타글립틴 15.3%, 위약 6.2%), 비인두염 (11.0%, 3.9%), 말초부종 (8.3%, 5.2%) 및 두통 (5.5%, 4.1%) 였다.

기존의 단독요법 임상시험, 메트포르민 추가 병용요법 임상시험 및 피오글리타존 추가 병용요법 임상시험의 종합분석 결과, 시타글립틴을 투여한 환자에서 특정 위장관 이상반응의 빈도를 알고 싶다. 복통(시타글립틴 100 mg 2.3%, 위약 2.1%), 구역(시타글립틴 100 mg 1.4%, 위약 0.8%), 설사(시타글립틴 100 mg 3.0%, 위약 2.3%)

이상반응	환자수 (%)			
	위약 (176명)	시타글립틴 100 mg (191명)	메트포르민 500 또는 1000 mg 1일 2회[1] (364명)	시타글립틴 50 mg 1일 2회 + 메트포르민 500 또는 1000 mg 1일 2회[1] (372명)
상기도감염	9 (5.1)	8 (4.5)	19 (5.2)	23 (6.2)
두통	5 (2.8)	2 (1.1)	14 (3.8)	22 (5.9)

[1] ITT (Intent-to treat) 피험자군

[2] 메트포르민 제형은 고용량 투여한 환자에서 위장관 이상반응의 빈도를 줄이기 위해 서방형 제형으로 투여되었다.

표 3. 시타글립틴과 메트포르민의 초기병용요법: 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 시타글립틴 단독투여, 메트포르민 단독투여, 위약보다 빈번히 보고된 이상반응

이상반응	환자수 (%)			
	위약 (176명)	시타글립틴 100 mg (191명)	메트포르민 500 또는 1000 mg 1일 2회[1] (364명)	시타글립틴 50 mg 1일 2회 + 메트포르민 500 또는 1000 mg 1일 2회[1] (372명)
설사	9 (5.1)	8 (4.5)	19 (5.2)	23 (6.2)
두통	5 (2.8)	2 (1.1)	14 (3.8)	22 (5.9)

[1] ITT (Intent-to treat) 피험자군

[2] 메트포르민 제형은 고용량 투여한 환자에서 위장관 이상반응의 빈도를 줄이기 위해 서방형 제형으로 투여되었다.

2) 시타글립틴

(1) 임상시험

① 임상시험은 광범위하고 다양한 조건 하에서 실시되므로 임상시험에서 관찰된 이상반응 발생률은 다른 약물의 임상시험에서의 비율과 직접적으로 비교될 수 없으며, 실제 시장환경 하에서 관찰된 비율을 반영할 수 없다.

시타글립틴의 임상시험에서 시타글립틴을 단독요법 또는 병용요법(메트포르민 또는 피오글리타존 또는 로시글리타존 및 메트포르민)으로 투여한 경우 이상반응 및 저혈당의 발생빈도는 위약에서 보고된 것과 유사하였다. 이상반응에 의한 치료중단은 위약군과 유사하였다.

글리메피리드 또는 글리메피리드 및 메트포르민 병용요법시 시타글립틴 투여군의 이상반응 발생빈도가 위약군보다 높았다 (표 4). 이는 시타글립틴 투여군에서 저혈당 발생빈도가 높았던 것에 일부 기인한다. 이상반응에 의한 치료중단은 위약군과 유사하였다.

18주 및 24주간 진행된 2건의 위약대조 단독요법 연구에 대일 시타글립틴 100 mg 및 200 mg 위약을 투여한 군이 포함되었다. 5건의 위약대조 추가 병용요법 연구는 각각 메트포르민, 피오글리타존, 로시글리타존 및 메트포르민 글리메피리드 (±메트포르민), 또는 인슐린 (±메트포르민 의 안전한 용량에 시타글립틴 100 mg 또는 위약을 매일 병용투여하였다.

이 임상시험들에서 저혈당을 제외하고 인과관계 평가와 관계없이 시타글립틴 100 mg을 98주간 매일 복용한 환자 중 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 이상반응은 표 2와 같다. 저혈당의 발생빈도는 표 4과 같다.

표 2. 시타글립틴 단독요법 또는 병용요법(메모글리타존, 또는 로시글리타존 및 메트포르민, 또는 글리메피리드 (±메트포르민))의 위약대조 임상시험: 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 저혈당을 제외한 이상반응[1]

이상반응	환자수 (%)	
	단독요법 (18 또는 24주)	위약 (363명)
	시타글립틴 100 mg (443명)	
비인두염	23 (5.2)	12 (3.3)
피오글리타존과의 병용요법(24주)	시타글립틴 100 mg + 피오글리타존 (175명)	위약 + 피오글리타존 (178명)
상기도감염	11 (6.3)	6 (3.4)
두통	9 (5.1)	7 (3.9)
로시글리타존 및 메트포르민과의 병용요법 (18주)	시타글립틴 100 mg + 로시글리타존 + 메트포르민 (181명)	위약 + 로시글리타존 + 메트포르민 (97명)
상기도감염	10 (5.5)	5 (5.2)
비인두염	11 (6.1)	4 (4.1)
글리메피리드 (±메트포르민)와의 병용요법 (24주)	시타글립틴 100 mg + 글리메피리드(± 메트포르민) (222명)	위약 + 글리메피리드 (± 메트포르민) (269명)
비인두염	14 (6.3)	10 (4.6)
두통	13 (5.9)	5 (2.3)

[1] ITT (Intent-to treat) 피험자군

24주간 시타글립틴과 메트포르민을 추가 병용투여한 환자에서 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 이상반응은 없었다.

24주간 시타글립틴과 안슐린 용량의 인슐린 (±메트포르민)을 추가 병용투여한 환자에서 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 이상반응은 없었다 (시험군은 표 E 참조). 또 다른 24주간 인슐린 강화 기간 (±메트포르민) 동안 시타글립틴을 추가 병용투여한 환자에서 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 이상반응은 설사였다(이 중 5.2%, 위약 3.3%)

54주간 시타글립틴과 로시글리타존 및 메트포르민을 추가 병용투여한 환자에서 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 이상반응은 상기도감염 (시타글립틴 15.3%, 위약 6.2%), 비인두염 (11.0%, 3.9%), 말초부종 (8.3%, 5.2%) 및 두통 (5.5%, 4.1%) 였다.

기존의 단독요법 임상시험, 메트포르민 추가 병용요법 임상시험 및 피오글리타존 추가 병용요법 임상시험의 종합분석 결과, 시타글립틴을 투여한 환자에서 특정 위장관 이상반응의 빈도를 알고 싶다. 복통(시타글립틴 100 mg 2.3%, 위약 2.1%), 구역(시타글립틴 100 mg 1.4%, 위약 0.8%), 설사(시타글립틴 100 mg 3.0%, 위약 2.3%)

이상반응	환자수 (%)			
	위약 (176명)	시타글립틴 100 mg (191명)	메트포르민 500 또는 1000 mg 1일 2회[1] (364명)	시타글립틴 50 mg 1일 2회 + 메트포르민 500 또는 1000 mg 1일 2회[1] (372명)
설사	9 (5.1)	8 (4.5)	19 (5.2)	23 (6.2)
두통	5 (2.8)	2 (1.1)	14 (3.8)	22 (5.9)

[1] ITT (Intent-to treat) 피험자군

[2] 메트포르민 제형은 고용량 투여한 환자에서 위장관 이상반응의 빈도를 줄이기 위해 서방형 제형으로 투여되었다.

표 3. 시타글립틴과 메트포르민의 초기병용요법: 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 시타글립틴 단독투여, 메트포르민 단독투여, 위약보다 빈번히 보고된 이상반응

이상반응	환자수 (%)			
	위약 (176명)	시타글립틴 100 mg (191명)	메트포르민 500 또는 1000 mg 1일 2회[1] (364명)	시타글립틴 50 mg 1일 2회 + 메트포르민 500 또는 1000 mg 1일 2회[1] (372명)
설사	9 (5.1)	8 (4.5)	19 (5.2)	23 (6.2)
두통	5 (2.8)	2 (1.1)	14 (3.8)	22 (5.9)

[1] ITT (Intent-to treat) 피험자군

[2] 메트포르민 제형은 고용량 투여한 환자에서 위장관 이상반응의 빈도를 줄이기 위해 서방형 제형으로 투여되었다.

2) 시타글립틴

(1) 임상시험

① 임상시험은 광범위하고 다양한 조건 하에서 실시되므로 임상시험에서 관찰된 이상반응 발생률은 다른 약물의 임상시험에서의 비율과 직접적으로 비교될 수 없으며, 실제 시장환경 하에서 관찰된 비율을 반영할 수 없다.

시타글립틴의 임상시험에서 시타글립틴을 단독요법 또는 병용요법(메트포르민 또는 피오글리타존 또는 로시글리타존 및 메트포르민)으로 투여한 경우 이상반응 및 저혈당의 발생빈도는 위약에서 보고된 것과 유사하였다. 이상반응에 의한 치료중단은 위약군과 유사하였다.

글리메피리드 또는 글리메피리드 및 메트포르민 병용요법시 시타글립틴 투여군의 이상반응 발생빈도가 위약군보다 높았다 (표 4). 이는 시타글립틴 투여군에서 저혈당 발생빈도가 높았던 것에 일부 기인한다. 이상반응에 의한 치료중단은 위약군과 유사하였다.

18주 및 24주간 진행된 2건의 위약대조 단독요법 연구에 대일 시타글립틴 100 mg 및 200 mg 위약을 투여한 군이 포함되었다. 5건의 위약대조 추가 병용요법 연구는 각각 메트포르민, 피오글리타존, 로시글리타존 및 메트포르민 글리메피리드 (±메트포르민), 또는 인슐린 (±메트포르민 의 안전한 용량에 시타글립틴 100 mg 또는 위약을 매일 병용투여하였다.

이 임상시험들에서 저혈당을 제외하고 인과관계 평가와 관계없이 시타글립틴 100 mg을 98주간 매일 복용한 환자 중 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 이상반응은 표 2와 같다. 저혈당의 발생빈도는 표 4과 같다.

표 2. 시타글립틴 단독요법 또는 병용요법(메모글리타존, 또는 로시글리타존 및 메트포르민, 또는 글리메피리드 (±메트포르민))의 위약대조 임상시험: 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 저혈당을 제외한 이상반응[1]

이상반응	환자수 (%)	
	단독요법 (18 또는 24주)	위약 (363명)
	시타글립틴 100 mg (443명)	
비인두염	23 (5.2)	12 (3.3)
피오글리타존과의 병용요법(24주)	시타글립틴 100 mg + 피오글리타존 (175명)	위약 + 피오글리타존 (178명)
상기도감염	11 (6.3)	6 (3.4)
두통	9 (5.1)	7 (3.9)
로시글리타존 및 메트포르민과의 병용요법 (18주)	시타글립틴 100 mg + 로시글리타존 + 메트포르민 (181명)	위약 + 로시글리타존 + 메트포르민 (97명)
상기도감염	10 (5.5)	5 (5.2)
비인두염	11 (6.1)	4 (4.1)
글리메피리드 (±메트포르민)와의 병용요법 (24주)	시타글립틴 100 mg + 글리메피리드(± 메트포르민) (222명)	위약 + 글리메피리드 (± 메트포르민) (269명)
비인두염	14 (6.3)	10 (4.6)
두통	13 (5.9)	5 (2.3)

[1] ITT (Intent-to treat) 피험자군

24주간 시타글립틴과 메트포르민을 추가 병용투여한 환자에서 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 이상반응은 없었다.

24주간 시타글립틴과 안슐린 용량의 인슐린 (±메트포르민)을 추가 병용투여한 환자에서 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 이상반응은 없었다 (시험군은 표 E 참조). 또 다른 24주간 인슐린 강화 기간 (±메트포르민) 동안 시타글립틴을 추가 병용투여한 환자에서 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 이상반응은 설사였다(이 중 5.2%, 위약 3.3%)

54주간 시타글립틴과 로시글리타존 및 메트포르민을 추가 병용투여한 환자에서 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 이상반응은 상기도감염 (시타글립틴 15.3%, 위약 6.2%), 비인두염 (11.0%, 3.9%), 말초부종 (8.3%, 5.2%) 및 두통 (5.5%, 4.1%) 였다.

기존의 단독요법 임상시험, 메트포르민 추가 병용요법 임상시험 및 피오글리타존 추가 병용요법 임상시험의 종합분석 결과, 시타글립틴을 투여한 환자에서 특정 위장관 이상반응의 빈도를 알고 싶다. 복통(시타글립틴 100 mg 2.3%, 위약 2.1%), 구역(시타글립틴 100 mg 1.4%, 위약 0.8%), 설사(시타글립틴 100 mg 3.0%, 위약 2.3%)

이상반응	환자수 (%)			
	위약 (176명)	시타글립틴 100 mg (191명)	메트포르민 500 또는 1000 mg 1일 2회[1] (364명)	시타글립틴 50 mg 1일 2회 + 메트포르민 500 또는 1000 mg 1일 2회[1] (372명)
설사	9 (5.1)	8 (4.5)	19 (5.2)	23 (6.2)
두통	5 (2.8)	2 (1.1)	14 (3.8)	22 (5.9)

[1] ITT (Intent-to treat) 피험자군

[2] 메트포르민 제형은 고용량 투여한 환자에서 위장관 이상반응의 빈도를 줄이기 위해 서방형 제형으로 투여되었다.

표 3. 시타글립틴과 메트포르민의 초기병용요법: 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 시타글립틴 단독투여, 메트포르민 단독투여, 위약보다 빈번히 보고된 이상반응

이상반응	환자수 (%)			
	위약 (176명)	시타글립틴 100 mg (191명)	메트포르민 500 또는 1000 mg 1일 2회[1] (364명)	시타글립틴 50 mg 1일 2회 + 메트포르민 500 또는 1000 mg 1일 2회[1] (372명)
설사	9 (5.1)	8 (4.5)	19 (5.2)	23 (6.2)
두통	5 (2.8)	2