

고함량 콘드로이틴 600mg + 활성비타민B 복합제

조인브이플러스®

【유효성분】

콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	600mg
푸르셀티아민(KP)	60mg
니코틴산아미드(KP)	60mg
피리독신염산염(KP)	25mg
판토텐산칼슘(KP)	15mg
리보플라빈부티레이트(KP)	6mg
감마-오리자놀(KP)	5mg
시아노코발라민1000배산(KP) (시아노코발라민(으)로서 20마이크로그램)	20mg
이노시톨(KP)	20mg
콜린타르타르산염(USP)	20mg

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6의 보급

- 1) 육체피로, 임신·수유기, 병중 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 2) 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방, 각기, 눈의 피로

2. 다음 증상의 완화

신경통, 근육, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】 만 8세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 4) 심장 · 순환기계기능 장애 환자 5) 신장장애 환자 6) 저단백혈증 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감, 변비, 설사, 홍반, 두드러기, 습진, 발진, 반구진성 발진, 가려움, 부종, 부종 · 수분저류(신부전 또는 심부전 환자)

2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.

3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.

4) 고함량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

7) 우발적으로 과량복용 한 경우

8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여하십시오 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다. 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【성상】 적갈색의 장방형 필름코팅정

【사용기한】 제조일로부터 36개월

【소비자상담실】 080-023-1897

【첨가제】 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 경질무수규산, 탭실드갈색(99B703), 전분글리콜산나트륨

【동물유래성분】 콘드로이틴설페이트나트륨(기원:소, 사용부위:연골)

【제조자】 성이바이오(주) / 강원도 원주시 지정면 지래울로 184 1층 일부, 3층

【판매자】 동화약품(주) 충청북도 충주시 충주산단1로 167(용탄동)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어보시고 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하십시오.

※ 부작용 신고 및 피해 구제 상담 : 1644-6223