

항산화제 함유 고함량 기능성 활성비타민

브이비타100®

일반의약품

【유효성분】1정 중

벤포티아민(비타민엽산염으로서 97.6 mg)(KP).....	135 mg
니코폴라빈(KP).....	50 mg
이노틴산아미드(KP).....	100 mg
판토텐산칼슘(KP).....	100 mg
파리독산염산염(KP).....	100 mg
폴산(KP).....	200 µg
시아노코발라민(KP).....	300 µg
이노시톨(KP).....	100 mg
콜린타르타르산염(별규).....	100 mg
D-비오틴(USP).....	100 µg
토코페롤아세테이트 2배산(비타민E로서 10 I.U.)(KP).....	20 mg
농축콜레칼시페롤 산(비타민D3로서 1000 I.U.)(EP).....	10 mg
산화아연(아연으로서 15mg)(KP).....	18.75 mg
우르소데옥시콜산(KP).....	10 mg
셀레늄함유조조호(셀레늄으로서 27 µg)(KP).....	50 mg

【효능·효과】

○ 다음 경우의 비타민 D, E, B₁, B₂, B₆의 보급

- 1) 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 발육기, 노년기
- 2) 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기, -노의피로, -배, 이의 발육불량, -구루병의 예방

○ 아연의 보급

【용법·용량】

만 8세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장결석 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 안산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 비타민 D는 모유로 분비되어 산생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- 5) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 6) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 7) 신장장애 환자
- 8) 저단백혈증 환자

9) 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 붉은 변, 피부염, 땀 · 호흡기 억제, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리기 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 파리독신을 1일 500 mg-2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 8) 항알도스테론제, 트리암테네과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

9) 우발적으로 과량복용 한 경우

- 10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정제된 용법 · 용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여하십시오.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 4) 녹차, 홍차 등 탄산을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】제조일로부터 36개월

【포장단위】60정/병, 120정/상자(60정/병×2)

【성상】적갈색의 장방형 필름코팅정

【첨가제】저지완도히드록시프로필셀룰로오스, 크로스포비돈, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 경질무수규산, 전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스, 토탈소달칼슘(99B703)

【제조자】SUNGY 성이바이오(주) / 강원특별자치도 원주시 지정면 지래로로 184 1층 일부, 3층 Tel: 02-3413-3458

【판매자】경보제약 경보제약 (주) 경보제약

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변색, 오명, 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어보시고 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하십시오.

부작용 발생 시 피해 구제 상담 : 14-3330

부작용 신고 및 피해 구제 상담 : 1644-6223