

센타민프로정



【원료약품 및 분량】1정 중

• 유효성분	
레티놀아세테이트과립(비타민A로서 1000IU)(EP)	2mg
비스벳타이민(티아민염산염으로서 4.4mg)(KP)	5mg
푸르셀린아민(KP)	5mg
벤토타이민(티아민염산염으로서 10.8mg)(KP)	15mg
리보플라빈(KP)	12mg
니코틴산아미드(KP)	10mg
판토탄산칼슘(KP)	10mg
피라독신염산염(KP)	12.15mg
비오틴(USP)	0.045mg
폴산(KP)	0.4mg
시아노코발라민1000배산(시아노코발라민으로서 30μg)(KP)	30mg
아스코르브산(KP)	50mg
클레칼치페롤충분발(비타민D로서 1000IU)(EP)(동물유래성분 : 양, 양모)	10mg
토코페롤아세테이트2배산(비타민E로서 30IU)(KP)	60mg
친강탄산칼슘(칼슘으로서 100.1mg)(KP)	250mg
염화칼륨(칼륨으로서 10.0mg)(KP)	19.068mg
산화마그네슘(마그네슘으로서 50.0mg)(KP)	82.92mg
황산철이구리수화물(구리로서 0.64mg)(USP)	2.5mg
황산망간수화물(망간으로서 2.0mg)(USP)	6.15mg
셀레늄함유건조효모(셀레늄으로서 5.0μg)(KP)	9.23mg
산화아연(아연으로서 15.0mg)(KP)	18.67mg
감마오리자놀(KP)	5mg
우르스테옥시콜산(KP)	2mg
유비퀴나논(KP)	2mg
이노시톨(KP)	5mg
콜린타르타르산염(USP)	10mg
로알렐리(10-히드록시-2-데세노산으로서 0.4mg)(생구)	10mg
황기(KP)	5mg
작약(KP)	10mg
당귀(KP)	10mg

● 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스카멜로오스나트륨, 오파드라이 빨간색(200F650003), 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

【효능·효과】

1. 다음경우의 비타민 A, D, E, B₁, B₂, B₆, C의 보급

• 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 중) - 발육기 - 노년기 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능은 다음과 같다. • 뼈, 이의 발육불량 • 구루병의 예방 • 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

2. 여성의 보급

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고

(1) 입부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A결핍증 환자는 제외).

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유크증증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분 에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 고칼륨혈증 환자 5) 율선병 6) 신장(콩팥) 결석환자 7) 심한 중상의 신(콩팥)부전 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파
4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
1) 만 1세 미만의 젖먹이 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이 4) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 오줌에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 5) 입부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미국산, 유아 ① 외국에서 임신한 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두들신것을 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다. ② 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 6) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성/특정 부위에 나타나는(대장염 등의 위장질환 환자 7) 심장·순환기계기능 장애 환자 8) 신장(콩팥)장애 환자 9) 저단백혈증 환자 10) 간성배당체를 투여 중인 환자 11) 담낭(쓸개)관련 질환, 간질환 환자 12) 알칼리성, 소화성궤양 환자 13) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자 14) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자 15) 입부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 설사, 위부(상복부)불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은변, 구내염(입안염), 저혈압, 얼굴달아오름, 심장박동불규칙, 피부발진, 상복부 통증, 혼수, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 고칼륨혈증, 가스상, 위장통증, 피부염, 땀·호흡기 악취, 탈모, 조골증, 위장관장애, 소화장애, 폐부종 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 5) 피라독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능저하 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 6) 폴산이 부족한 환자 에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고아드름 혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다. 10) 장기간 고용량의 비타민A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐기기를 지닌 여성의 골다공증(뼈경직증) 위험을 높일 수 있다. 11) 항알도스테론제, 트리암테네드 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 12) 우발적으로 과량복용 한 경우 13) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것. 3) 복용시 의사, 한의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 4) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다. 5) 각종 요산(비)감시에서 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 6) 요소변을 황색으로 변화하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다. 7) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 【성상】 적갈색의 타원형 필름코팅정

【유효기간】 제조일로부터 36개월 【표장단위】 100정/병 【소비자상담실】 080-260-0033

【제조원】 (유)한동제약 / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301 1~3층, 5층, 봉동로 705

【판매원】 (주)녹십자 / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 586

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약리물안전관리원(1644-6223)

※ 자세한 사항은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.